

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 4 trang)

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ tên thí sinh:Số báo danh:

Mã đề thi 103

PHẦN I. (4,5 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18.
Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. Đúng mỗi câu được 0,25đ

Câu 1: Thành phần cấu trúc của một nucleotide trong phân tử DNA là

- A. đường deoxyribose; phosphate, nitrogenous base.
- B. đường ribose; phosphate, nitrogenous base.
- C. adenine, uracil, guanine, cytosine.
- D. adenine, thymine, guanine, cytosine.

Câu 2: Nguyên tố vi lượng trong cơ thể sống không có đặc điểm nào sau đây?

- A. Tham gia vào cấu trúc bắt buộc của hệ enzyme trong tế bào
- B. Chiếm tỉ lệ nhỏ hơn 0,01% khối lượng chất sống của cơ thể
- C. Là những nguyên tố có trong tự nhiên
- D. Chỉ cần cho thực vật ở giai đoạn sinh trưởng

Câu 3: Sơ đồ dưới đây thể hiện mã di truyền.

		Second Base				
		U	C	A	G	
First Base	U	UUU } Phe UUC } UUA } Leu UUG }	UCU } UCC } Ser UCA } UCG }	UAU } Tyr UAC } UAA } STOP UAG }	UGU } Cys UGC } UGA } STOP UGG } Trp	U C A G
	C	CUU } CUC } Leu CUA } CUG }	CCU } CCC } Pro CCA } CCG }	CAU } His CAC } CAA } Gln CAG }	CGU } CGC } Arg CGA } CGG }	U C A G
	A	AUU } AUC } Ile AUA } AUG } Met or Start	ACU } ACC } Thr ACA } ACG }	AAU } Asn AAC } AAA } Lys AAG }	AGU } Ser AGC } AGA } Arg AGG }	U C A G
	G	GUU } GUC } Val GUA } GUG }	GCU } GCC } Ala GCA } GCG }	GAU } Asp GAC } GAA } Glu GAG }	GGU } GGC } Gly GGA } GGG }	U C A G

Nhận định nào sau đây là đúng về đặc điểm của mã di truyền?

- A. Mỗi codon có thể mã hoá cho nhiều amino acid.
- B. Sợi mRNA mã hóa protein sẽ luôn chứa các codon không mã hóa amino acid.
- C. Codon AUG không mã hóa amino acid.
- D. Các codon gồm nhiều base khác nhau có thể mã hoá cho cùng một amino acid.

Câu 4: Loại đường là thành phần chính cấu tạo nên thành tế bào thực vật là

- A. tinh bột
- B. glycogen
- C. chitin
- D. cellulose

Câu 5: Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố đa lượng?

- A. Fe
- B. Cu
- C. Zn
- D. N

Câu 6: Cấp độ tổ chức sống cơ bản nhất cấu tạo nên các cơ thể sinh vật là

- A. nguyên tử
- B. cơ thể
- C. tế bào
- D. phân tử

Câu 7: Liên kết được hình thành giữa nguyên tử hydrogen của phân tử nước này với nguyên tử oxygen của phân tử nước bên cạnh là

- A. liên kết peptide
- B. liên kết cộng hoá trị
- C. liên kết phosphodiester
- D. liên kết hydrogen

Câu 8: Quá trình nhân đôi DNA không có thành phần nào sau đây tham gia?

- A. Enzyme ligase
- B. Amino acid
- C. DNA polimerase
- D. Các nucleotide tự do

Câu 9: Có một phân tử DNA có khối lượng bằng 75.10^4 đơn vị cacbon và tỉ lệ $\frac{A}{G} = \frac{3}{2}$ tự nhân đôi 3 lần.

Số lượng từng loại nucleotide môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi nói trên là

- A. G = C = 3500; A = T = 5250.
- B. G = C = 4000; A = T = 6000.
- C. G = C = 1500; A = T = 2250.
- D. G = C = 3250; A = T = 5500.

Câu 10: Ý nào **không đúng** khi nói về vai trò của phân tử nước?

- A. Là thành phần cấu tạo nên tế bào.
- B. Cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống.
- C. Là môi trường của các phản ứng sinh hóa.
- D. Là dung môi hoà tan nhiều chất cần thiết.

Câu 11: Nguyên tố có vai trò đặc biệt quan trọng trong tế bào, tạo nên sự đa dạng của các hợp chất hữu cơ là

- A. Oxygen
- B. Hydrogen
- C. Carbon
- D. Nitrogen

Câu 12: Một trong những nguyên tắc được thực hiện trong quá trình nhân đôi DNA là

- A. Tổng hợp chiều 3' → 5'
- B. Bổ sung A-G; T-C
- C. Bán bảo toàn
- D. Bảo toàn

Câu 13: Đường đôi Maltose được cấu tạo từ 2 phân tử đường đơn là

- A. Glucose + Fructose.
- B. Glucose + Galactose.
- C. Glucose + Glucose.
- D. Fructose + Fructose.

Câu 14: Sản phẩm có thể có của quá trình phiên mã DNA là gì?

- A. mRNA và rRNA.
- B. Chỉ có mRNA.
- C. mRNA, tRNA và rRNA.
- D. mRNA và tRNA.

Câu 15: DNA là phân tử sinh học nằm trong cấu trúc nào của tế bào?

- A. Màng tế bào
- B. Nhân tế bào
- C. Bộ máy gôngi
- D. Lưới nội chất

Câu 16: Nội dung nào sau đây **không đúng** khi nói về học thuyết tế bào?

- A. Tế bào được sinh ra từ sự phân chia các tế bào có trước
- B. Mọi tế bào đều có cấu trúc gồm màng sinh chất, tế bào chất và nhân
- C. Tất cả các sinh vật đều được cấu tạo từ một hoặc nhiều tế bào
- D. Tế bào là đơn vị nhỏ nhất cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật

Câu 17: Nước chiếm bao nhiêu phần trăm khối lượng cơ thể con người

- A. 80%
- B. 60%
- C. 50%
- D. 70%

Câu 18: Nhận định nào sau đây **đúng** về tRNA?

- A. Thành phần chính cấu trúc nên ribosome.
- B. Chỉ có cấu trúc mạch đơn.
- C. Mang bộ ba đối mã khớp với bộ ba mã hoá (codon) trên mARN.
- D. Có đầu 5' liên kết với amino acid.


PHẦN II. (4,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. Trong một câu: đúng 1 ý được 0,1đ; đúng 2 ý được 0,25đ; đúng 3 ý được 0,5đ; đúng 4 ý được 1,0đ

Câu 1: Khi nói về quá trình nhân đôi DNA, các kết luận dưới đây là đúng hay sai?

- a) Trên mỗi phân tử DNA của sinh vật nhân sơ chỉ có một điểm khởi đầu nhân đôi DNA.
- b) Sự nhân đôi của DNA ti thể diễn ra độc lập với sự nhân đôi của DNA trong nhân tế bào.
- c) Tính theo chiều tháo xoắn, ở mạch khuôn có chiều 3' - 5' thì mạch mới được tổng hợp gián đoạn.

d) Enzyme DNA-polimerase làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử DNA và kéo dài mạch mới.

Câu 2: Dưới đây là sơ đồ khái quát cấu trúc một gene ở sinh vật nhân sơ (a) và sinh vật nhân thực (b). Các nhận định sau đây là đúng hay sai?



a) Dựa vào cấu trúc vùng mã hóa, các gene được chia thành gene không phân mảnh và gene phân mảnh.

b) Gene phân mảnh là gene có vùng mã hóa gồm các trình tự được dịch mã (exon) xen kẽ các đoạn không được dịch mã (intron).

c) Một gene có cấu trúc gồm vùng điều hòa, vùng mã hóa và vùng kết thúc.

d) Gene phân mảnh có ở sinh vật nhân sơ và một số ít vi sinh vật cổ.

Câu 3: Một gene có 1500 cặp nucleotide và số nucleotide loại G chiếm 20% tổng số nucleotide của gen. Mạch 1 của gene có 300 nucleotide loại T và số nucleotide loại C chiếm 25% tổng số nucleotide của mạch.

a) Mạch 2 của gene có $\frac{A}{G} = \frac{4}{5}$

b) Mạch 2 của gene có $\frac{A+C}{T+G} = \frac{7}{13}$

c) Mạch 1 của gene có $\frac{T+C}{A+G} = \frac{11}{9}$

d) Mạch 1 của gene có $\frac{A}{G} = \frac{8}{3}$

Câu 4: Từ 3 phân tử DNA được đánh dấu N^{15} ở cả 2 mạch đơn tiến hành quá trình nhân đôi trong môi trường chỉ có N^{14} , tổng hợp được 96 phân tử DNA mạch kép. Các nhận định sau đây là đúng hay sai?

a) Có tất cả 96 phân tử DNA chứa N^{14} .

b) Có 3 phân tử DNA con có chứa N^{15} .

c) Có tất cả 186 mạch đơn chứa N^{14} .

d) Có 6 phân tử DNA chứa cả N^{14} và N^{15} .

PHẦN III. (1,5 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Đúng 1 câu được 0,5đ

Câu 1: Một phân tử DNA có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử DNA này có tỉ lệ $\frac{A+T}{G+C} = \frac{1}{4}$ thì tỉ lệ nucleotide loại A của phân tử DNA này là bao nhiêu phần trăm?

Câu 2: Trên một mạch của gene có 150A và 120T. Gene nói trên có 20%G. Số nucleotide loại C là bao nhiêu?

Câu 3: Một đoạn gene có trình tự nucleotide trên một chuỗi polynucleotide như sau:



Tính số liên kết hydrogen của đoạn gene trên?

Câu 4: Nếu nuôi cấy một tế bào *E. coli* có một phân tử DNA ở vùng nhân chỉ chứa N^{15} phóng xạ chưa nhân đôi trong môi trường chỉ có N^{14} , quá trình phân chia của vi khuẩn tạo ra 8 tế bào con. Có bao nhiêu phân tử DNA ở vùng nhân của các *E. coli* có chứa N^{15} phóng xạ được tạo ra trong quá trình trên?

Câu 5: Một gene dài 425nm và có tổng số nucleotide loại A và nucleotide loại T chiếm 40% tổng số nucleotide của gene. Mạch 1 của gene có 220 nucleotide loại T và số nucleotide loại C chiếm 20%

tổng số nucleotide của mạch. Theo lí thuyết, mạch 2 của gene có tổng số nucleotide loại C chiếm bao nhiêu phần trăm?

Câu 6: Có 8 phân tử DNA tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 112 mạch polynucleotide mới lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của mỗi phân tử DNA trên là bao nhiêu?

----- **HẾT** -----

- *Thí sinh không được sử dụng tài liệu;*
- *Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.*