



Chương


Bài 1. VECTO & CÁC PHÉP TOÁN TRONG KHÔNG GIAN



Luyện tập

A. Câu hỏi - Trả lời trắc nghiệm

» Câu 1. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$.



Vectơ nào sau đây cùng phương với $\vec{BC}$?

- A. $\vec{DC}$ B. $\vec{DA}$ C. $\vec{BB'}$ D. $\vec{C'C}$

👉 Lời giải

Chọn B

Vì $BC \parallel DA$ nên $\vec{BC}$, $\vec{DA}$ là hai vectơ cùng phương.

» Câu 2. Trong các vectơ sau, vectơ nào sau đây có điểm đầu là A, điểm cuối là B?

- A. $\vec{AA}$ B. $\vec{BA}$ C. $\vec{AB}$ D. $\vec{BB}$

👉 Lời giải

Chọn C

Vectơ nào có điểm đầu A, điểm cuối B là $\vec{AB}$

» Câu 3. Trong không gian cho 3 điểm phân biệt A, B, C. Vectơ nào trong các vectơ sau đây là vectơ - không?


- A. $\vec{BB}$ B. $\vec{BA}$ C. $\vec{AB}$ D. $\vec{CA}$

👉 Lời giải

Chọn A

Vì vectơ - không là vectơ có điểm đầu điểm cuối trùng nhau nên $\vec{BB} = \vec{0}$.

» Câu 4. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$.





Vector $\vec{BA}$ bằng với vector nào sau đây?

A. $\vec{A'B'}$

B. $\vec{CD}$

C. $\vec{BC}$


D. $\vec{AB}$

Lời giải

Chọn B

Vì $\vec{BA}$, $\vec{CD}$ là hai vector cùng hướng và $BA = CD$ nên $\vec{BA}$, $\vec{CD}$ là hai vector bằng nhau

» Câu 5. Cho hình chóp $S.ABC$. Tìm vector tổng của hai vector $\vec{SA}$ và $\vec{AB}$?



A. $\vec{BS}$

B. $\vec{BA}$

C. $\vec{SB}$


D. $\vec{SC}$

Lời giải

Chọn C

Theo quy tắc 3 điểm ta có, $\vec{SA} + \vec{AB} = \vec{SB}$

» Câu 6. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tìm vector tổng của hai vector $\vec{AD}$ và $\vec{AB}$.



A. $\vec{DB}$


B. $\vec{BD}$

C. $\vec{AC}$

D. $\vec{CA}$


Lời giải

Chọn C



Theo quy tắc hình bình hành ta có, $\vec{AD} + \vec{AB} = \vec{AC}$

» Câu 7. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?



- A. $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'} = \vec{AC'}$.
 B. $\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AA'} = \vec{AD}$.
 C. $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AC} = \vec{AC'}$.
 D. $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AC'} = \vec{AC}$.

👉 **Lời giải**

Chọn A

Theo quy tắc hình hộp ta có : $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'} = \vec{AC'}$.

» Câu 8. Cho hình chóp $S.ABC$. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?


- A. $\vec{SA} - \vec{AB} = \vec{SB}$.
 B. $\vec{SA} - \vec{SB} = \vec{AB}$.
 C. $\vec{SA} - \vec{SB} = \vec{BA}$.
 D. $\vec{SA} - \vec{SB} = \vec{SC}$.

👉 **Lời giải**

Chọn C

Theo quy tắc hiệu ta có: $\vec{SA} - \vec{SB} = \vec{BA}$.

» Câu 9. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?



- A. $\vec{AB} + \vec{A'D'} = \vec{AC}$.
 B. $\vec{AB} + \vec{A'D'} = \vec{BD}$.
 C. $\vec{AB} + \vec{A'D'} = \vec{AC'}$.
 D. $\vec{AB} + \vec{A'D'} = \vec{CA}$.

👉 **Lời giải**

Chọn A

$\vec{AB} + \vec{A'D'} = \vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$ (quy tắc hình bình hành).

» Câu 10. Cho hình chóp $SABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O . Tính tổng

$\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} + \vec{SD}$.

- A. $2\vec{SO}$.
 B. $4\vec{SO}$.
 C. $3\vec{SO}$.
 D. $\vec{0}$.

👉 **Lời giải**

Chọn B

Vì O là trung điểm của AC, BD nên $\vec{SA} + \vec{SC} = 2\vec{SO}$, $\vec{SB} + \vec{SD} = 2\vec{SO}$.

Do đó $\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} + \vec{SD} = 4\vec{SO}$.

» Câu 11. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC . Tổng

$\vec{AB} + \vec{DC}$ bằng

- A. $\vec{0}$.
 B. $2\vec{AD}$.
 C. $2\vec{NM}$.
 D. $2\vec{MN}$.

👉 **Lời giải**




Chọn C

Ta có:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NB} + \overrightarrow{DM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NC} = (\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{DM}) + 2\overrightarrow{MN} + (\overrightarrow{NB} + \overrightarrow{NC}) = 2\overrightarrow{MN}$$

(vì M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC nên $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{DM} = 0, \overrightarrow{NB} + \overrightarrow{NC} = 0$).

» Câu 12. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tính tổng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{A'C'}$.



A. $2\overrightarrow{AA'}$

B. 0

C. $2\overrightarrow{AC}$

D. $2\overrightarrow{C'A'}$

👉 **Lời giải**

Chọn C

Theo quy tắc hình bình hành ta có, $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}$.
 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{A'C'} = 2\overrightarrow{AC}$.

» Câu 13. Cho khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Khi đó, góc giữa vectơ $\overrightarrow{AB}$ và vectơ $\overrightarrow{AD}$ là:

A. 90°


B. 60°

C. 45°

D. 30°

👉 **Lời giải**

Chọn A



Ta có $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = \angle DAB$

Ta thấy $AB \perp AD \Rightarrow \angle DAB = 90^\circ$. Vậy $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = 90^\circ$

» Câu 14. Cho lăng trụ đứng $ABCA'B'C'$. Đáy là tam giác ABC vuông tại B . Khi đó góc giữa vectơ $\overrightarrow{BA}$ và vectơ $\overrightarrow{B'C'}$ bằng bao nhiêu?

A. 45°


B. 120°

C. 90°

D. 30°

👉 **Lời giải**

Chọn C



Ta có $\overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{BC}$

Do đó $\left(\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{B'C'} \right) = \left(\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BC} \right) = \angle ABC$

Mà tam giác ABC vuông tại B . Nên $\angle ABC = 90^\circ \Rightarrow \left(\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{B'C'} \right) = 90^\circ$

» Câu 15. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Khi đó, vectơ bằng vectơ $\overrightarrow{AB}$ là vectơ nào dưới đây?

A. $\overrightarrow{D'C'}$


B. $\overrightarrow{BA}$

C. $\overrightarrow{CD}$

D. $\overrightarrow{BA'}$

👉 **Lời giải**

Chọn A



Do $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp chữ nhật nên $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{D'C'}$

Và $\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{D'C'}$ cùng phương, cùng chiều

Từ đó $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{D'C'}$

» Câu 16. Cho hình lăng trụ tam giác $ABCA'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}, \overrightarrow{AB} = \vec{b}, \overrightarrow{AC} = \vec{c}, \overrightarrow{BC} = \vec{d}$. Trong các biểu thức vectơ sau đây, biểu thức nào **đúng**?

A. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{d}$


B. $\vec{a} = \vec{b} + \vec{c}$

C. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$

D. $\vec{b} - \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$

👉 **Lời giải**

Chọn D



Ta thấy: $\vec{b} - \vec{c} + \vec{d} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BC} = \vec{0}$.

» Câu 17. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vectơ: $\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{D'D} - \overrightarrow{B'D'} = k\overrightarrow{BB'}$

A. $k=4$

B. $k=1$


C. $k=0$

D. $k=2$

👉 **Lời giải**



Chọn B



Đặt $\vec{VT} = \vec{BD} - \vec{D'D} - \vec{BD'} = \vec{BD} + \vec{DD'} + \vec{D'B'} = \vec{BD'} + \vec{D'B'} = \vec{BB'}$
 Vậy $k=1$

» **Câu 18.** Cho tứ diện $ABCD$, gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD ; Đẳng thức nào **sai**?

A. $\vec{IJ} = \frac{1}{2}(\vec{AC} + \vec{BD})$


B. $\vec{IJ} = \frac{1}{2}(\vec{AD} + \vec{BC})$

C. $\vec{IJ} = \frac{1}{2}(\vec{DC} + \vec{AD} + \vec{BD})$

D. $\vec{IJ} = \frac{1}{2}(\vec{DC} + \vec{AD} + \vec{BD})$

👉 **Lời giải**

Chọn D



Ta có: $\vec{IJ} = \vec{IA} + \vec{AJ}$
 $= -\frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{2}(\vec{AC} + \vec{AD})$
 $= \frac{1}{2}(\vec{BC} + \vec{AD}) = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{BD} + \vec{CD} + \vec{DC} + \vec{BC}) = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{CD} + 2\vec{BC})$

$\vec{IJ} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{CD})$

Vậy đẳng thức **sai** là

» **Câu 19.** Cho hình hộp $ABCD.EFGH$. Gọi O là trung điểm CH . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. $\vec{BO} = \frac{1}{2}\vec{BA} + \vec{BC} + \frac{1}{2}\vec{BF}$


B. $\vec{BO} = \vec{BA} + \frac{1}{2}\vec{BC} + \frac{1}{2}\vec{BF}$

C. $\vec{BO} = \frac{1}{2}\vec{BA} + \frac{1}{2}\vec{BC} + \frac{1}{2}\vec{BF}$

D. $\vec{BO} = \vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BF}$


👉 **Lời giải**

Chọn A



Ta có
$$\vec{BO} = \frac{1}{2}(\vec{BC} + \vec{BH}) = \frac{1}{2}(\vec{BC} + \vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BF}) = \frac{1}{2}\vec{BA} + \vec{BC} + \frac{1}{2}\vec{BF}$$

» Câu 20. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào sau đây là sai?



A. $(\vec{AB}; \vec{A'D'}) = 90^\circ$


B. $(\vec{AB}; \vec{A'C'}) = 45^\circ$

C. $(\vec{AC}; \vec{BD'}) = 90^\circ$

D. $(\vec{A'A}; \vec{CB'}) = 45^\circ$

Lời giải

Chọn D



$(\vec{AB}; \vec{A'D'}) = (\vec{AB}; \vec{AD}) = \angle BAD = 90^\circ$

$(\vec{AB}; \vec{A'C'}) = (\vec{AB}; \vec{AC}) = \angle BAC = 45^\circ$

$(\vec{AC}; \vec{BD'}) = (\vec{AC}; \vec{BD}) = 90^\circ$

$(\vec{A'A}; \vec{CB'}) = (\vec{C'C}; \vec{CB'}) = (\vec{CE}; \vec{CB'}) = 135^\circ$

trong đó E là điểm đối xứng với C' qua C .

» Câu 21. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a . Tính góc

A. $(\vec{AB}, \vec{CD}) = 60^\circ$


B. $(\vec{AB}, \vec{CD}) = 90^\circ$

C. $(\vec{AB}, \vec{CD}) = 120^\circ$

D. $(\vec{AB}, \vec{CD}) = 180^\circ$

Lời giải

Chọn B



Gọi M là trung điểm CD .

$$\vec{AB} \cdot \vec{CD} = (\vec{AM} + \vec{MB}) \cdot \vec{CD} = \vec{AM} \cdot \vec{CD} + \vec{MB} \cdot \vec{CD}$$

Khi đó,

Do tam giác ACD đều nên $AM \perp CD \Rightarrow \vec{AM} \cdot \vec{CD} = 0$

Và tam giác BCD đều nên $BM \perp CD \Rightarrow \vec{BM} \cdot \vec{CD} = 0$

$$\vec{AB} \cdot \vec{CD} = (\vec{AM} + \vec{MB}) \cdot \vec{CD} = \vec{AM} \cdot \vec{CD} + \vec{MB} \cdot \vec{CD} = 0 \Rightarrow \vec{AB} \perp \vec{CD}$$

Vậy

$$(\vec{AB}, \vec{CD}) = 90^\circ$$

Kết luận

» **Câu 22.** Theo định luật II Newton: Gia tốc của một vật có cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật: $\vec{F} = m\vec{a}$, trong đó $\vec{a}$ là vectơ gia tốc (m/s^2), $\vec{F}$ là vectơ lực (N) tác dụng lên vật, $m(\text{kg})$ là khối lượng của vật. Muốn truyền cho quả bóng có khối lượng $0,5 \text{ kg}$ một gia tốc 20 m/s^2 thì cần một lực đã có độ lớn là bao nhiêu?



A. $100(\text{N})$

B. $20(\text{N})$

C. $25(\text{N})$

D. $10(\text{N})$

👉 **Lời giải**

Chọn D


$$\vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow |\vec{F}| = m|\vec{a}| = 0,5 \cdot 20 = 10(\text{N})$$

Ta có

Vậy muốn truyền cho quả bóng có khối lượng $0,5 \text{ kg}$ một gia tốc 20 m/s^2 thì cần một lực đã có độ lớn là $10(\text{N})$.



» **Câu 23.** Cho hình hộp đứng $ABCD.A'B'C'D'$, trong đó mặt đáy là hình bình hành với $\angle DAB = 120^\circ$. Biết độ dài các cạnh $AB = 25\text{cm}$, $AD = 12\text{cm}$ và $AA' = 12\text{cm}$. Tính $|\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'}|$.



A. $12(\text{cm})$

B. $\sqrt{469}(\text{cm})$

C. $\sqrt{613}(\text{cm})$

D. $25(\text{cm})$

» **Lời giải**

Chọn C

Theo quy tắc hình hộp, ta có $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'} = \vec{AC'}$,

Vậy $|\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'}| = |\vec{AC'}| = AC'$

Với $AC' = \sqrt{AC^2 + AA'^2}$

Trong đó: $AA' = 12(\text{cm})$

Do tổng hai góc kề của một hình bình hành là 180° nên ta có góc $\angle ABC = 60^\circ$

Áp dụng định lý cosin trong tam giác ABC , ta có

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos \angle ABC = 25^2 + 12^2 - 2 \cdot 25 \cdot 12 \cdot \cos 60^\circ = 469.$$


$$\text{Vậy } AC' = \sqrt{AC^2 + AA'^2} = \sqrt{469 + 144} = \sqrt{613}(\text{cm}).$$

» **Câu 24.** Một em nhỏ cân nặng $m = 25(\text{kg})$ trượt trên cầu trượt dài $3,5(\text{m})$ (như trong hình dưới đây). Biết rằng, cầu trượt có góc nghiêng so với phương nằm ngang là 30° . Trong các khẳng định sau, có bao nhiêu khẳng định đúng?

» Với gia tốc rơi tự do $\vec{g}$ có độ lớn là $g = 9,8(\text{m/s}^2)$ thì độ lớn của trọng lực $\vec{P} = m\vec{g}$ tác dụng lên em nhỏ có độ lớn là $245(\text{N})$.

» Góc giữa độ dịch chuyển $\vec{d}$ so với trọng lực $\vec{P}$ là 30° .

» Công $A(\text{J})$ sinh bởi một lực $\vec{F}$ có độ dịch chuyển $\vec{d}$ được tính bởi công thức $A = |\vec{F}| \cdot |\vec{d}| \cdot \cos(\vec{F}; \vec{d})$ thì công sinh bởi trọng lực $\vec{P}$ khi em nhỏ trượt hết chiều dài cầu trượt là $428,75(\text{J})$.



A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 0.

Lời giải

Chọn A

» Với gia tốc rơi tự do g có độ lớn là $g = 9,8 (\text{m/s}^2)$ thì độ lớn của trọng lực $\vec{P} = m\vec{g}$ tác dụng lên em nhỏ có độ lớn là $|\vec{P}| = m|g| = 25 \cdot 9,8 = 245 (\text{N})$.

» Em nhỏ trượt từ điểm A tới điểm B nên khi đó góc giữa độ dịch chuyển $\vec{d}$ so với trọng lực $\vec{P}$ là $(\vec{d}, \vec{P}) = (\vec{AB}, \vec{P}) = 60^\circ$.


» Ta có độ lớn của trọng lực $\vec{P} = m\vec{g}$ tác dụng lên em nhỏ có độ lớn là $|\vec{P}| = m|g| = 25 \cdot 9,8 = 245 (\text{N})$ nên công sinh bởi trọng lực $\vec{P}$ khi em nhỏ trượt hết chiều dài cầu trượt là $A = |\vec{P}| \cdot |\vec{d}| \cdot \cos(\vec{P}, \vec{d}) = 245 \cdot 3,5 \cdot \cos 60^\circ = 428,75 (\text{J})$.

B. Câu hỏi - Trả lời Đúng/sai

» Câu 25. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 2, AD = 3, A'A = 4$.

	Mệnh đề	Đúng g	Sai
(a)	Vector $\vec{BA'}$ bằng vector $\vec{CD'}$.		
(b)	$ \vec{BA'} = \vec{A'D} = \vec{DB} $		
(c)	Số các vector khác $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp là A_8^2 .		
(d)	Độ dài của vector $\vec{BD'}$ bằng $3\sqrt{3}$.		

Lời giải





(a) Vector $\overrightarrow{BA'}$ bằng vector $\overrightarrow{CD'}$.

Vector $\overrightarrow{BA'}$ bằng vector $\overrightarrow{CD'}$ vì chúng cùng hướng và cùng độ dài.

» Chọn ĐÚNG.

(b) $|\overrightarrow{BA'}| = |\overrightarrow{AD'}| = |\overrightarrow{DB}|$.

Ta có $|\overrightarrow{BA'}| = BA' = \sqrt{BA^2 + BB'^2} = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20}$

$|\overrightarrow{BD}| = BD = \sqrt{BC^2 + BA^2} = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$ nên $|\overrightarrow{BA'}| \neq |\overrightarrow{DB}|$ và

» Chọn SAI.

(c) Số các vector khác $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp là A_8^2 .

Số các vector khác $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp là A_8^2 .

» Chọn ĐÚNG.


(d) Độ dài của vector $\overrightarrow{BD'}$ bằng $3\sqrt{3}$.

Độ dài của vector $\overrightarrow{BD'}$ bằng $3\sqrt{3}$.

Ta có $|\overrightarrow{BD'}| = \sqrt{BA^2 + BC^2 + BB'^2} = \sqrt{4 + 9 + 16} = \sqrt{29}$.

» Chọn SAI.

» Câu 26. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.



	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{A'D'} + \overrightarrow{B'B} = \overrightarrow{A'C}$		
(b)	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{B'A}$		
(c)	$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{D'B}$		
(d)	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{DC}$		

👉 Lời giải

(a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{A'D'} + \overrightarrow{B'B} = \overrightarrow{A'C}$.

» Chọn ĐÚNG.

(b) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{B'A}$.

Ta có: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AB'}$.


» Chọn SAI.



(c) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{D'B}$
 $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{D'B}$
 » Chọn ĐÚNG.

(d) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{DC}$
 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CD}$
 » Chọn SAI.

» Câu 27. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi M là trung điểm của BB' và G là trọng tâm tam giác ABC .



	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\overrightarrow{BM} = \frac{1}{2} \overrightarrow{BB'}$		
(b)	$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{BB'}$		
(c)	$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AB'}$		
(d)	$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$		

👉 Lời giải

(a) $\overrightarrow{BM} = \frac{1}{2} \overrightarrow{BB'}$
 » Chọn ĐÚNG.


(b) $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{BB'}$
 $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{BB'}$

» Chọn SAI.
 (c) $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AB'}$

$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AB'}$
 » Chọn ĐÚNG.

(d) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$
 $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$
 » Chọn ĐÚNG.

» Câu 28. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Khi đó



	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD'}$ bằng nhau		
(b)	Hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{CB'}$ đối nhau		
(c)	Hai vectơ $\overrightarrow{AB'}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương với nhau		
(d)	Có 3 vectơ khác vectơ $\vec{0}$ bằng vectơ $\overrightarrow{BC}$		

Lời giải

(a) Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD'}$ bằng nhau.

Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD'}$ ngược hướng và có độ dài bằng nhau.

$\Rightarrow \overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD'}$ đối nhau.

» Chọn SAI.

(b) Hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{CB'}$ đối nhau.

Ta có vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{CB'}$ cùng độ dài và ngược hướng nhau

$\Rightarrow \overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{CB'}$ đối nhau.

» Chọn ĐÚNG.

(c) Hai vectơ $\overrightarrow{AB'}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương với nhau.

Ta có AB' không song song với AC nên hai vectơ $\overrightarrow{AB'}$ và $\overrightarrow{AC}$ không cùng phương với nhau.


» Chọn SAI.

(d) Có 3 vectơ khác vectơ $\vec{0}$ bằng vectơ $\overrightarrow{BC}$.

Ta có các vectơ khác $\vec{0}$ bằng với vectơ $\overrightarrow{BC}$ là $\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AD'}, \overrightarrow{BC'}$

» Chọn ĐÚNG.

» Câu 29. Cho hình chóp tứ giác đều $SABCD$ có O là tâm của đáy $ABCD$, cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng $2a$ (tham khảo hình bên).



	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{CB}$ là 0° .		
(b)	Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{BD}$ và $\overrightarrow{BO}$ là 180° .		
(c)	Cosin của góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{CS}$ bằng $\frac{1}{4}$.		
(d)	Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AO}$ và $\overrightarrow{SD}$ bằng 60° .		

👉 **Lời giải**

(a) Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{CB}$ là 0° .

Hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{CB}$ là hai vectơ ngược hướng nên góc giữa chúng bằng 180° .

» **Chọn SAI.**

(b) Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{BD}$ và $\overrightarrow{BO}$ là 180° .

Hai vectơ $\overrightarrow{BD}$ và $\overrightarrow{BO}$ là hai vectơ cùng hướng nên góc giữa chúng là 0° .

» **Chọn SAI.**

(c) Cosin của góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{CS}$ bằng $\frac{1}{4}$.

$$g(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{CS}) = (\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CS}) = \angle SCD.$$

Áp dụng định lý cosin cho tam giác SCD có

$$\cos \angle SCD = \frac{SC^2 + CD^2 - SD^2}{2SC \cdot CD} = \frac{(2a)^2 + a^2 - (2a)^2}{2 \cdot 2a \cdot a} = \frac{1}{4}$$

» **Chọn ĐÚNG.**


(d) Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AO}$ và $\overrightarrow{SD}$ bằng 60° .

$$\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{SD} = -\overrightarrow{OA} \cdot (\overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OS}) = -\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OS} = 0$$

Ta có $\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{SD} = 0$ nên góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AO}$ và $\overrightarrow{SD}$ bằng 90° .

» **Chọn SAI.**

» **Câu 30.** Cho tứ diện đều $SABC$ có tất cả các cạnh bằng a , M là trung điểm của cạnh BC .



	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\vec{SA} \cdot \vec{SB} = \vec{SB} \cdot \vec{SC} = \vec{SA} \cdot \vec{SC}$		
(b)	$\vec{AM} = -\vec{SA} + \frac{1}{2}\vec{SB} + \frac{1}{2}\vec{SC}$		
(c)	Góc giữa $\vec{SA}$ và $\vec{BC}$ bằng 90°		
(d)	$\vec{AM} \cdot \vec{SC} = 0$		

Lời giải

(a) $\vec{SA} \cdot \vec{SB} = \vec{SB} \cdot \vec{SC} = \vec{SA} \cdot \vec{SC}$.

Ta có $\vec{SA} \cdot \vec{SB} = \vec{SA} \cdot \vec{SB} \cdot \cos \angle ASB = a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = \frac{a^2}{2}$.

Tương tự, $\vec{SB} \cdot \vec{SC} = \frac{a^2}{2}$; $\vec{SA} \cdot \vec{SC} = \frac{a^2}{2}$ nên $\vec{SA} \cdot \vec{SB} = \vec{SB} \cdot \vec{SC} = \vec{SA} \cdot \vec{SC}$.

» **Chọn ĐÚNG.**

(b) $\vec{AM} = -\vec{SA} + \frac{1}{2}\vec{SB} + \frac{1}{2}\vec{SC}$

Ta có: $\vec{AM} = \vec{SM} - \vec{SA} = -\vec{SA} + \frac{1}{2}\vec{SB} + \frac{1}{2}\vec{SC}$.

» **Chọn ĐÚNG.**

(c) Góc giữa $\vec{SA}$ và $\vec{BC}$ bằng 90° .

Góc giữa $\vec{SA}$ và $\vec{BC}$ bằng 90° .

Ta có $\vec{SC} \cdot \vec{SA} = \vec{SB} \cdot \vec{SA} = a^2 \cdot \cos 60^\circ = \frac{a^2}{2}$.

Suy ra $\vec{BC} \cdot \vec{SA} = (\vec{SC} - \vec{SB}) \cdot \vec{SA} = \vec{SC} \cdot \vec{SA} - \vec{SB} \cdot \vec{SA} = 0$

nên góc giữa $\vec{SA}$ và $\vec{BC}$ bằng 90° .

» **Chọn ĐÚNG.**

(d) $\vec{AM} \cdot \vec{SC} = 0$.


Ta có $\vec{AM} \cdot \vec{SC} = \left(-\vec{SA} + \frac{1}{2}\vec{SB} + \frac{1}{2}\vec{SC} \right) \cdot \vec{SC} = -\vec{SA} \cdot \vec{SC} + \frac{1}{2}\vec{SB} \cdot \vec{SC} + \frac{1}{2}\vec{SC} \cdot \vec{SC}$

$= -\frac{a^2}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{a^2}{2} + \frac{1}{2}a^2 = \frac{a^2}{4}$.

» **Chọn SAI.**



» **Câu 31.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $ABCD$ là hình vuông cạnh a và $AA' = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. Gọi O là giao điểm của AC và BD .



	Mệnh đề	Đúng g	Sai
(a)	$(\vec{AC}, \vec{CA'}) = (\vec{AC}, \vec{CA'})$		
(b)	Gọi $\vec{u} = \vec{AB} + \vec{AD}$, $\vec{v} = \vec{B'C'}$. Ta có $(\vec{u}; \vec{v}) = 60^\circ$.		
(c)	Gọi $\vec{x} = \vec{BA} + \vec{BC}$, $\vec{y} = \vec{A'C'}$. Ta có $(\vec{x}; \vec{y}) = 90^\circ$.		
(d)	$(\vec{OA'}, \vec{OC'}) = 90^\circ$		

👉 **Lời giải**

(a) $(\vec{AC}, \vec{CA'}) = (\vec{AC}, \vec{CA'})$

$(\vec{AC}, \vec{CA'}) = (\vec{AC}, \vec{CA'})$

Ta có $AC \parallel CA' \Rightarrow (\vec{AC}, \vec{CA'}) = 0^\circ$

$\vec{AC}, \vec{CA'}$ là hai vector ngược hướng nên $\Rightarrow (\vec{AC}, \vec{CA'}) = 180^\circ$

» **Chọn SAI.**

(b) Gọi $\vec{u} = \vec{AB} + \vec{AD}$, $\vec{v} = \vec{B'C'}$. Ta có $(\vec{u}; \vec{v}) = 60^\circ$

Ta có $\vec{u} = \vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$, $\vec{v} = \vec{B'C'}$ $\Rightarrow (\vec{u}; \vec{v}) = (\vec{AC}, \vec{B'C'}) = (\vec{AC}, \vec{AD}) = \angle CAD = 45^\circ$


» **Chọn SAI.**

(c) Gọi $\vec{x} = \vec{BA} + \vec{BC}$, $\vec{y} = \vec{A'C'}$. Ta có $(\vec{x}; \vec{y}) = 90^\circ$

Ta có $\vec{x} = \vec{BA} + \vec{BC} = \vec{BD}$, $\vec{y} = \vec{A'C'} = \vec{AC}$ suy ra $(\vec{x}; \vec{y}) = (\vec{AC}, \vec{BD}) = 90^\circ$

» **Chọn ĐÚNG.**

(d) $(\vec{OA'}, \vec{OC'}) = 90^\circ$




$$(OA')^2 = (OC')^2 = AO^2 + (AA')^2 = \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{5a^2}{4} \neq (A'C')^2 = 2a^2$$

Ta có

Suy ra tam giác $OA'C'$ không thể vuông tại O .

» **Chọn SAI.**

» **Câu 32.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Gọi O, O' lần lượt là tâm của hình vuông $ABCD$ và $A'B'C'D'$.



	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\vec{AB} \cdot \vec{DC'} = \frac{a^2}{2}$		
(b)	$\vec{AB} \cdot \vec{BD'} = -\frac{a^2}{2}$		
(c)	$ \vec{D'A'} + \vec{C'C} + \vec{AB} = a\sqrt{3}$		
(d)	$ \vec{OA'} + \vec{OB'} + \vec{OC'} + \vec{OD'} = 4a$		

» **Lời giải**

(a) $\vec{AB} \cdot \vec{DC'} = \frac{a^2}{2}$

$$\vec{AB} \cdot \vec{DC'} = \vec{AB} \cdot \vec{AB} = |\vec{AB}| \cdot |\vec{AB}| \cos(\vec{AB}, \vec{AB}) = a \cdot a \cdot \sqrt{2} \cdot \cos 45^\circ = a^2$$

Ta có

» **Chọn SAI.**

(b) $\vec{AB} \cdot \vec{BD'} = -\frac{a^2}{2}$

$$(\vec{AB}, \vec{BD'}) = 180^\circ - \angle ABD' = 120^\circ$$

Ta có , suy ra

$$\vec{AB} \cdot \vec{BD'} = |\vec{AB}| \cdot |\vec{BD'}| \cos 120^\circ = (a\sqrt{2}) \cdot (a\sqrt{2}) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -a^2$$

» **Chọn SAI.**




(c) $\left| \overrightarrow{D'A'} + \overrightarrow{C'C} + \overrightarrow{AB} \right| = a\sqrt{3}$

Ta có $\overrightarrow{D'A'} + \overrightarrow{C'C} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{D'A'} + \overrightarrow{D'D} + \overrightarrow{D'C'} = \overrightarrow{D'B}$

Suy ra $\left| \overrightarrow{D'A'} + \overrightarrow{C'C} + \overrightarrow{AB} \right| = \left| \overrightarrow{D'B} \right| = BD' = a\sqrt{3}$

» **Chọn ĐÚNG.**

(d) $\left| \overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OC'} + \overrightarrow{OD'} \right| = 4a$



Ta có $\overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OC'} + \overrightarrow{OD'} = (\overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OC'}) + (\overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OD'}) = 2\overrightarrow{OO'} + 2\overrightarrow{OO'} = 4\overrightarrow{OO'}$

Suy ra $\left| \overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OC'} + \overrightarrow{OD'} \right| = 4\left| \overrightarrow{OO'} \right| = 4a$


» **Chọn ĐÚNG.**

C. Câu hỏi - Trả lời ngắn

» **Câu 33.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, từ các đỉnh của hình hộp đã cho, có bao nhiêu vectơ đối (khác vectơ không) của vectơ $\overrightarrow{AB}$?

👉 **Lời giải**

✓ **Trả lời: 4**




Ta có các vectơ đối của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là $\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{BA'}, \overrightarrow{CD'}$.
Vậy số vectơ đối là 4 vectơ.

» **Câu 34.** Cho tứ diện $ABCD$, gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Biết rằng $\overrightarrow{MN} = a\overrightarrow{AB} + b\overrightarrow{AC} + c\overrightarrow{AD}$. Giá trị của biểu thức $a + b + c$ bằng:

👉 **Lời giải**

✓ **Trả lời: 1,5**




$$\begin{aligned} \overrightarrow{MN} &= \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CD} \\ \text{Ta có:} \quad &= -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}(-\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } a+b+c = \frac{3}{2} = 1,5$$

» **Câu 35.** Cho hình lập phương $ABCD A'B'C'D'$. Giá trị tan của góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AD'}$ và $\overrightarrow{A'C'}$ bằng (làm tròn tới hàng phần nghìn).

👉 **Lời giải**

✓ **Trả lời: 1,732**



$$\text{Ta có } (\overrightarrow{AD'}, \overrightarrow{A'C'}) = (\overrightarrow{AD'}, \overrightarrow{AC}) = \angle DAC = 60^\circ \text{ (do tam giác } DACD' \text{ đều).}$$

$$\text{Vậy } \tan 60^\circ = \sqrt{3} \approx 1,732$$

» **Câu 36.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a}$ và $\vec{b}$ tạo với nhau một góc 120° , đồng thời $|\vec{a}|=2$ và $|\vec{b}|=5$. Đặt $\vec{u}=k\vec{a}-\vec{b}$ và $\vec{v}=\vec{a}+2\vec{b}$. Để $\vec{u} \perp \vec{v}$ thì giá trị của k là

👉 **Lời giải**

✓ **Trả lời: -4,5**

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos 120^\circ = 2 \cdot 5 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -5$$

$$\text{Ta có:}$$

$$\text{Để } \vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow (k\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} + 2\vec{b}) = 0$$

$$\Leftrightarrow k|\vec{a}|^2 + (2k-1)\vec{a} \cdot \vec{b} - 2|\vec{b}|^2 = 0 \Leftrightarrow -6k - 45 = 0 \Leftrightarrow k = -\frac{9}{2} = -4,5$$

» **Câu 37.** Cho ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ không đồng phẳng. Xét $\vec{x} = 2\vec{a} - \vec{b} - \vec{c}$, $\vec{y} = -\vec{a} + 2\vec{b} + \vec{c}$, $\vec{z} = \vec{a} + 4\vec{b} + m\vec{c}$. Giá trị của m để các vectơ $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$ đồng phẳng bằng?

👉 **Lời giải**

✓ **Trả lời: 1**



Do $\vec{y}; \vec{z}$ không cùng phương, để các vector $\vec{x}; \vec{y}; \vec{z}$ đồng phẳng
 $\Leftrightarrow$ tồn tại $a, b \in \mathbb{R} : \vec{x} = a\vec{y} + b\vec{z} \Leftrightarrow 2\vec{a} - \vec{b} - \vec{c} = a(-\vec{a} + 2\vec{b} + \vec{c}) + b(\vec{a} + 4\vec{b} + m\vec{c})$


$$\Leftrightarrow \begin{cases} -a + b = 2 \\ 2a + 4b = -1 \\ a + mb = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{3}{2} \\ b = \frac{1}{2} \\ m = 1 \end{cases}$$

Vậy $m = 1$

» **Câu 38.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ như hình vẽ. Đặt một vật tại đỉnh A , khi đó tác động vào vật bởi những lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ có giá lần lượt nằm trên các cạnh AB, AD, AA' và $|\vec{F}_1| = 2N, |\vec{F}_2| = 3N, |\vec{F}_3| = 4N$. Hãy xác định độ lớn của hợp lực $\vec{F}$ tác động lên vật (làm tròn đến hàng phần nghìn).

👉 **Lời giải**

✓ **Trả lời: 5,385**



Ta có $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3$


Theo quy tắc hình hộp ta có: $\vec{F}$ có giá là nằm trên cạnh AC'

Do $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp chữ nhật nên $|\vec{F}| = \sqrt{|\vec{F}_1|^2 + |\vec{F}_2|^2 + |\vec{F}_3|^2} = \sqrt{29} \approx 5,385N$

» **Câu 39.** Cho tứ diện $ABCD$. Đặt $\vec{AB} = \vec{a}, \vec{AC} = \vec{b}, \vec{AD} = \vec{c}$ gọi G là trọng tâm của tam giác BCD . Tìm giá trị thích hợp của k thỏa đẳng thức vector $\vec{AG} = k(\vec{c} + \vec{b} + \vec{a})$. (làm tròn tới hàng phần nghìn).

👉 **Lời giải**

✓ **Trả lời: 0,333**





Gọi M là trung điểm BC .


$$\begin{aligned}\vec{AG} &= \vec{AB} + \vec{BG} = \vec{a} + \frac{2}{3}\vec{BM} = \vec{a} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}(\vec{BC} + \vec{BD}) \\ &= \vec{a} + \frac{1}{3}(\vec{AC} - \vec{AB} + \vec{AD} - \vec{AB}) = \vec{a} + \frac{1}{3}(-2\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) = \frac{1}{3}(\vec{c} + \vec{b} + \vec{a})\end{aligned}$$

Vậy $k = \frac{1}{3} \sim 0,333$

» **Câu 40.** Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Tìm giá trị thích hợp của k thỏa đẳng thức vector: $\vec{DA} + \vec{DB} + \vec{DC} = k\vec{DG}$?

🔗 **Lời giải**

✓ **Trả lời: 3**




$$\vec{DA} + \vec{DB} + \vec{DC} = \vec{DG} + \vec{GA} + \vec{DG} + \vec{GB} + \vec{DG} + \vec{GC} = 3\vec{DG}$$

Vậy $k = 3$.

» **Câu 41.** Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SC$ và $\angle ASB = \angle BSC = \angle CSA$. Hãy xác định góc giữa cặp vector $\vec{SC}$ và $\vec{AB}$?

🔗 **Lời giải**

✓ **Trả lời: 90**



$$\vec{SC} \cdot \vec{AB} = \vec{SC} \cdot (\vec{SB} - \vec{SA}) = \vec{SC} \cdot \vec{SB} - \vec{SC} \cdot \vec{SA}$$

Ta có:

$$= \vec{SC} \cdot \vec{SB} \cos \angle BSC - \vec{SC} \cdot \vec{SA} \cos \angle ASC = 0 \quad (\text{Vì } SA = SB = SC \text{ và } \angle BSC = \angle ASC)$$


$$(\vec{SC}, \vec{AB}) = 90^\circ$$

Do đó:

» **Câu 42.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông $ABCD$ cạnh bằng a và các cạnh bên đều bằng a . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và SD . Số đo của góc $(\vec{MN}, \vec{SC})$ bằng:

🔗 **Lời giải**

✓ **Trả lời: 90**



Ta có: $AC = a\sqrt{2}$

$$\Rightarrow AC^2 = 2a^2 = SA^2 + SC^2$$

$\Rightarrow \triangle SAC$ vuông tại S .

Suy ra $\vec{SA} \cdot \vec{SC} = 0$

$$\vec{NM} \cdot \vec{SC} = \frac{1}{2} \vec{SA} \cdot \vec{SC} = 0 \Rightarrow (\vec{NM}, \vec{SC}) = 90^\circ$$


Khi đó:

$$\Rightarrow (\vec{MN}, \vec{SC}) = 90^\circ$$

» **Câu 43.** Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB$ và $CA = CB$. Tính số đo của góc giữa hai đường thẳng chéo nhau SC và AB .

Lời giải

✓ **Trả lời: 90**



$$\vec{SC} \cdot \vec{AB} = -\vec{CS} \cdot (\vec{CB} - \vec{CA}) = \vec{CS} \cdot \vec{CA} - \vec{CS} \cdot \vec{CB}$$

Xét

$$= \vec{CS} \cdot \vec{CA} \cdot \cos \angle SCA - \vec{CS} \cdot \vec{CB} \cdot \cos \angle SCB$$

$$= \vec{CS} \cdot \vec{CA} \cdot \frac{SC^2 + CA^2 - SA^2}{2SC \cdot CA} - \vec{CS} \cdot \vec{CB} \cdot \frac{SC^2 + CB^2 - SB^2}{2SC \cdot CB}$$

$$= \frac{SC^2 + CA^2 - SA^2}{2} - \frac{SC^2 + CB^2 - SB^2}{2} = 0 \quad (\text{do } SA = SB \text{ và } CA = CB)$$


Vậy góc giữa hai đường thẳng chéo nhau SC và AB bằng 90° .

» **Câu 44.** Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt có dạng hình hộp

chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được buộc vào móc E của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp EA, EB, EC, ED có độ dài bằng nhau và cùng tạo với




mặt phẳng $(ABCD)$ một góc bằng 60° . Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng.



Tính trọng lượng của chiếc xe ô tô (làm tròn đến hàng đơn vị), biết rằng các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ đều có cường độ là $4700N$ và trọng lượng của khung sắt là $3000N$.

Lời giải

✓ Trả lời: 13281



Gọi A_1, B_1, C_1, D_1 lần lượt là các điểm sao cho $\vec{EA}_1 = \vec{F}_1, \vec{EB}_1 = \vec{F}_2, \vec{EC}_1 = \vec{F}_3, \vec{ED}_1 = \vec{F}_4$.

Vì $\vec{EA}, \vec{EB}, \vec{EC}, \vec{ED}$ có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc bằng 60° nên $\vec{EA}_1, \vec{EB}_1, \vec{EC}_1, \vec{ED}_1$ có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(A_1B_1C_1D_1)$ một góc bằng 60° .

Vì $ABCD$ là hình chữ nhật nên $A_1B_1C_1D_1$ cũng là hình chữ nhật.

Gọi O là tâm của hình chữ nhật $A_1B_1C_1D_1$. Ta suy ra $\vec{EO} \perp (A_1B_1C_1D_1)$.

Do đó góc giữa đường thẳng EA_1 và mặt phẳng $(A_1B_1C_1D_1)$ bằng góc $\angle EA_1O$ suy ra $\angle EA_1O = 60^\circ$.

Ta có $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}_3| = |\vec{F}_4| = 4700N$ nên $EA_1 = EB_1 = EC_1 = ED_1 = 4700N$.

Tam giác EOA_1 vuông tại O nên $EO = EA_1 \cdot \sin \angle EA_1O = 4700 \cdot \sin 60^\circ = 2350\sqrt{3}$.

Ta có: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = \vec{EA}_1 + \vec{EB}_1 + \vec{EC}_1 + \vec{ED}_1 = 4\vec{EO} + \vec{OA}_1 + \vec{OC}_1 + \vec{OB}_1 + \vec{OD}_1 = 4\vec{EO}$.



Vì chiếc khung sắt chứa xe ô tô ở vị trí cân bằng nên $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = \vec{P}$, với $\vec{P}$ là trọng lực tác dụng lên khung sắt chứa xe ô tô.

Suy ra trọng lượng của khung sắt chứa chiếc xe ô tô là:


$$|\vec{P}| = 4|\vec{EO}| = 4.2350\sqrt{3} = 9400\sqrt{3}N$$

Vì trọng lượng của khung sắt là $3000N$ nên trọng lượng của chiếc xe ô tô là: $9400\sqrt{3} - 3000 \approx 13281N$.

» **Câu 45.** Cho tứ diện $ABCD$ có $AB=AC=AD$ và $\angle BAC = \angle BAD = 60^\circ, \angle CAD = 90^\circ$. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của AB và CD . Hãy xác định góc giữa cặp vectơ $\vec{IJ}$ và $\vec{CD}$.

🔗 **Lời giải**

✓ **Trả lời: 90**



$$\vec{IJ} = \vec{IA} + \vec{AD} + \vec{DJ} \quad (1)$$

$$\vec{IJ} = \vec{IB} + \vec{BC} + \vec{CJ} \quad (2)$$

Lấy (1)+(2) ta được:

$$2\vec{IJ} = (\vec{IA} + \vec{IB}) + (\vec{AD} + \vec{BC}) + (\vec{DJ} + \vec{CJ}) = \vec{AD} + \vec{BC}$$

$$\vec{IJ} = \frac{1}{2}(\vec{AD} + \vec{BC}) = \frac{1}{2}(\vec{AD} + \vec{AC} - \vec{AB})$$

Hay

$$\vec{IJ} \cdot \vec{CD} = \frac{1}{2}(\vec{AD} + \vec{AC} - \vec{AB}) \cdot (\vec{AD} - \vec{AC})$$

$$= \frac{1}{2}AD^2 - \frac{1}{2}AD \cdot AC + \frac{1}{2}AC \cdot AD - \frac{1}{2}AC^2 - \frac{1}{2}AB \cdot AD + \frac{1}{2}AB \cdot AC$$

$$= -\frac{1}{2}AB \cdot AD \cdot \cos 60^\circ + \frac{1}{2}AB \cdot AC \cdot \cos 60^\circ = 0$$

$$\vec{IJ} \perp \vec{CD} \Rightarrow (\vec{IJ}, \vec{CD}) = 90^\circ$$

Vậy