



Chương


Bài 3. ỨNG DỤNG HÌNH HỌC CỦA TÍCH



Luyện tập

A. Câu hỏi - Trả lời trắc nghiệm

» Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = 0$, $x = -2$ và $x = 3$ (như hình vẽ). Mệnh đề nào dưới đây đúng?



A. $S = - \int_{-2}^1 f(x) dx - \int_1^3 f(x) dx.$

B. $S = \int_{-2}^1 f(x) dx - \int_1^3 f(x) dx.$

C. $S = - \int_{-2}^1 f(x) dx + \int_1^3 f(x) dx.$

D. $S = \int_{-2}^1 f(x) dx + \int_1^3 f(x) dx.$


👉 Lời giải

Chọn B

$$S = \int_{-2}^3 |f(x)| dx = \int_{-2}^1 |f(x)| dx + \int_1^3 |f(x)| dx = \int_{-2}^1 f(x) dx - \int_1^3 f(x) dx.$$

Ta có

» Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Gọi D là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $(C): y = f(x)$, trục hoành, hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ (như hình vẽ dưới đây).





Giả sử S_D là diện tích hình phẳng D . Chọn công thức đúng trong các phương án A, B, C, D cho dưới đây?

A. $S_D = \int_a^0 f(x)dx + \int_0^b f(x)dx$

B. $S_D = -\int_a^0 f(x)dx + \int_0^b f(x)dx$

C. $S_D = \int_a^0 f(x)dx - \int_0^b f(x)dx$

D. $S_D = -\int_a^0 f(x)dx - \int_0^b f(x)dx$

👉 **Lời giải**

Chọn B


+ Nhìn đồ thị ta thấy:

- Đồ thị (C) cắt trục hoành tại $O(0;0)$
- Trên đoạn $[a;0]$, đồ thị (C) ở dưới trục hoành nên $|f(x)| = -f(x)$
- Trên đoạn $[0;b]$, đồ thị (C) ở trên trục hoành nên $|f(x)| = f(x)$

$$S_D = \int_a^b |f(x)|dx = \int_a^0 |f(x)|dx + \int_0^b |f(x)|dx = -\int_a^0 f(x)dx + \int_0^b f(x)dx$$

+ Do đó:

» **Câu 3.** Diện tích của hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=a$, $x=b$ ($a < b$) tính theo công thức nào dưới đây?



A. $S = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$

B. $S = \int_a^b f(x)dx$

C. $S = -\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$

D. $S = \left| \int_a^b f(x)dx \right|$

👉 **Lời giải**


Chọn C

Diện tích của hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=a$, $x=b$ là:

$$S = \int_a^b |f(x)|dx = \int_a^c |f(x)|dx + \int_c^b |f(x)|dx = -\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

» **Câu 4.** Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=f(x)$, trục hoành và

hai đường thẳng $x=-3$, $x=2$. Đặt $a = \int_{-3}^1 f(x)dx$, $b = \int_1^2 f(x)dx$.



Mệnh đề nào sau đây là **đúng**.

A. $S=a+b$

B. $S=a-b$

C. $S=-a-b$

D. $S=b-a$


👉 **Lời giải**

Chọn D

$$S = \int_{-3}^2 |f(x)| dx = \int_{-3}^1 |f(x)| dx + \int_1^2 |f(x)| dx = - \int_{-3}^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx = -a+b$$

Ta có

» **Câu 5.** Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$ có đồ thị như hình bên và $c \in [a; b]$. Gọi S là diện tích của hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$ và các đường thẳng $y=0$, $x=a$, $x=b$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?



A. $S = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$

B. $S = \int_a^c f(x) dx - \int_c^b f(x) dx$

C. $S = \int_a^b |f(x)| dx$

D. $S = \int_a^c f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$

👉 **Lời giải**

Chọn A

Ta có:

$$S = \int_a^b |f(x)| dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b [-f(x)] dx = \int_a^c f(x) dx - \int_c^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$$

» **Câu 6.** Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\sqrt[3]{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x=1$, $x=8$ là

A. $\frac{45}{2}$

B. $\frac{45}{4}$

C. $\frac{45}{7}$

D. $\frac{45}{8}$

👉 **Lời giải**

Chọn A

Ta có $\sqrt[3]{x} \geq 0$ trên đoạn $[1; 8]$ nên

$$S = \int_1^8 \sqrt[3]{x} dx = \int_1^8 \sqrt[3]{x} dx = \frac{3}{4} x^{\frac{4}{3}} \Big|_1^8 = \frac{45}{4}$$



» **Câu 7.** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = (x - 2)^2 - 1$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1, x = 2$ bằng

- A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{3}{2}$. D. $\frac{7}{3}$.

👉 **Lời giải**

Chọn B

$$S = \int_1^2 |(x - 2)^2 - 1| dx = \int_1^2 |x^2 - 4x + 3| dx = \int_1^2 (x^2 - 4x + 3) dx = \frac{2}{3}$$

Ta có:

» **Câu 8.** Tính diện tích S hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2 + 1, x = -1, x = 2$ và trục hoành.

- A. $S = 16$. B. $S = 6$. C. $S = \frac{13}{6}$. D. $S = 13$.

👉 **Lời giải**

Chọn B

$$S = \int_{-1}^2 |x^2 + 1| dx = \int_{-1}^2 (x^2 + 1) dx = 6$$

Ta có:

» **Câu 9.** Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2^x, y = 1, x = 0, x = 2$. Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

- A. $S = \int_0^2 |2^x - 1| dx$. B. $S = \int_0^2 |1 - 2^x| dx$. C. $S = \int_0^2 (1 - 2^x) dx$. D. $S = \int_0^2 (2^x - 1) dx$.

👉 **Lời giải**

Chọn C

Xét $x \in [0; 2]$, ta có $2^x > 2^0 \Leftrightarrow 2^x > 1$ nên $|2^x - 1| = 2^x - 1$.

$$S = \int_0^2 |2^x - 1| dx = \int_0^2 (2^x - 1) dx = \int_0^2 (2^x - 1) dx$$

Diện tích hình phẳng cần tính là

» **Câu 10.** Hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 4 + 2x - x^2, y = x^2, x = -1, x = 2$ có diện tích là

- A. 9 đvdt. B. 12 đvdt. C. 15 đvdt. D. 6 đvdt.

👉 **Lời giải**

Chọn A

$$Ta \text{ có: } 4 + 2x - x^2 = x^2 \Leftrightarrow -2x^2 + 2x + 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 2 \end{cases}$$

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 4 + 2x - x^2, y = x^2, x = -1, x = 2$ là

$$S = \int_{-1}^2 |4 + 2x - x^2 - x^2| dx = \int_{-1}^2 (4 + 2x - 2x^2) dx = \left(4x + x^2 - \frac{2x^3}{3} \right) \Big|_{-1}^2 = 9 \text{ (đvdt)}.$$

» **Câu 11.** Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = x^2 + 1$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0, x = 3$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục



hoành có thể tích V bằng

- A. $V = 12p$. B. $V = \frac{348p}{5}$. C. $V = 32p$. D. $V = 9p$.
- 👉 **Lời giải**

Chọn B

$$V = p \int_0^3 (x^2 + 1)^2 dx = \frac{348p}{5}$$

» **Câu 12.** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \cos x$, trục tung, trục hoành và đường thẳng $x = p$ bằng

- A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
- 👉 **Lời giải**

Chọn C

Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = \cos x$ và trục hoành là nghiệm phương trình

$$\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{p}{2} + kp. \text{ Xét trên } [0; p] \text{ suy ra } x = \frac{p}{2}$$

$$S = \int_0^{\frac{p}{2}} \cos x dx - \int_{\frac{p}{2}}^p \cos x dx = 2$$

Diện tích hình phẳng cần tính là

» **Câu 13.** Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2$, trục hoành Ox , các đường thẳng $x = 1$, $x = 2$ là

- A. $S = 8$. B. $S = \frac{7}{3}$. C. $S = \frac{8}{3}$. D. $S = 7$.
- 👉 **Lời giải**

Chọn B

$$S = \int_1^2 |x^2| dx = \int_1^2 x^2 dx = \left. \frac{x^3}{3} \right|_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$$

Diện tích hình phẳng là

» **Câu 14.** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f(0) < 0 < (-1)$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = 0$, $x = -1$ và $x = 1$. Xét các mệnh đề sau

- (1) $S = \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^1 |f(x)| dx$. (2) $S = \int_{-1}^1 |f(x)| dx$.
- (3) $S = \int_{-1}^1 f(x) dx$. (4) $S = \left| \int_{-1}^1 f(x) dx \right|$.

Số mệnh đề đúng là

- A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.
- 👉 **Lời giải**

Chọn B



Ta có diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=f(x)$, $y=0$, $x=-1$ và

$$x=1 \text{ là } S = \int_{-1}^1 |f(x)| dx \text{ nên (2) đúng.}$$

Do $f(0) < 0 < (-1)$ nên $S = \int_{-1}^1 f(x) dx$ sai.

Tương tự $S = \left| \int_{-1}^1 f(x) dx \right|$ sai và $S = \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^1 |f(x)| dx$ sai.

» **Câu 15.** Khối chỏm cầu có bán kính $R=3$ và chiều cao $h=1$ sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi cung tròn có phương trình $y=\sqrt{9-x^2}$, trục hoành và hai đường thẳng $x=2$, $x=3$ xung quanh trục Ox . Tính thể tích khối chỏm cầu này.

A. $\frac{8p}{3}$.

B. $2p$.

C. $\frac{10p}{3}$.

D. p .


👉 **Lời giải**

Chọn A

$$V = p \int_2^3 (9-x^2) dx = p \left(9x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_2^3 = \frac{8p}{3}.$$

Ta có thể tích khối chỏm cầu là

» **Câu 16.** Cho tam giác vuông OAB có cạnh $OA=a$ nằm trên trục Ox và $\angle AOB = \frac{p}{3}$.



Gọi b là khối tròn xoay sinh ra khi quay miền tam giác OAB xung quanh trục Ox .

A. $3pa^3$.

B. pa^3 .

C. $\frac{pa^3}{3}$.

D. $\frac{pa^3}{9}$.

👉 **Lời giải**

Chọn B

Do OB đi qua gốc tọa độ và tạo với Ox một góc $\frac{p}{3}$ nên $OB: y = \tan \frac{p}{3} x = \sqrt{3}x$.

$$V = p \int_0^a (\sqrt{3}x)^2 dx = p \int_0^a 3x^2 dx = px^3 \Big|_0^a = pa^3 \quad (\text{đvtt}).$$

» **Câu 17.** Gọi S_1 , S_2 lần lượt là diện tích hình vuông cạnh bằng 1 và diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x^2+1$, $y=0$, $x=-1$, $x=2$. Khẳng định nào sau đây đúng?



A. $S_1 = S_2$.

B. $S_1 > S_2$.

C. $2S_1 = S_2$.

D. $6S_1 = S_2$.

👉 **Lời giải**

Chọn D

$$\begin{cases} S_1 = 1 \\ S_2 = \int_{-1}^2 |x^2 + 1 - 0| dx = 6 \Rightarrow 6S_1 = S_2 \end{cases}$$

Ta có

» **Câu 18.** Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2 + x - 2$, $y = 2x + 4$, $x = 1$ và $x = 4$. Cho diện tích hình phẳng (H) bằng $\frac{a}{b}$ (đvdt), với $a, b \in \mathbb{N}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Giá trị $T = a + b$ bằng:

A. $T = 67$.

B. $T = 25$.

C. $T = 76$.

D. $T = 23$.

👉 **Lời giải**

Chọn A

Ta có diện tích hình phẳng (H) bằng $S = \int_1^4 |(x^2 + x - 2) - (2x + 4)| dx = \int_1^4 |x^2 - x - 6| dx$.

Phương trình $x^2 - x - 6 = 0$ có nghiệm $x = -2$ (loại), $x = 3$ (nhận).

$$S = \left| \int_1^3 (x^2 - x - 6) dx \right| + \left| \int_3^4 (x^2 - x - 6) dx \right| = \frac{22}{3} + \frac{17}{6} = \frac{61}{6}$$

Suy ra


Do đó $a = 61$ và $b = 6$.

Vậy $T = a + b = 67$.

» **Câu 19.** Cho tam giác vuông OAB có cạnh $OA = a$ nằm trên trục Ox và

$$\angle AOB = \alpha \left(0 < \alpha \leq \frac{\pi}{4} \right).$$

Gọi b là khối tròn xoay sinh ra khi quay miền tam giác OAB xung quanh trục Ox . Tính thể tích V của b theo a và α .



A. $\frac{\rho \tan^2 \alpha \cdot a^3}{3}$.

B. $\frac{3\rho \tan^2 \alpha \cdot a^3}{2}$.

C. $\frac{\rho \sin^2 \alpha \cdot a^3}{3}$.

D. $\frac{2\rho \cos^2 \alpha \cdot a^3}{3}$.

👉 **Lời giải**


Chọn A

Do OB đi qua gốc tọa độ và tạo với Ox một góc α nên $OB: y = x \cdot \tan \alpha$.

Khi đó, thể tích của khối b là:

$$V = \rho \int_0^a (x \cdot \tan \alpha)^2 dx = \rho \tan^2 \alpha \int_0^a x^2 dx = \frac{\rho \tan^2 \alpha \cdot x^3}{3} \Big|_0^a = \frac{\rho \tan^2 \alpha \cdot a^3}{3} \quad (\text{đvtt}).$$

» **Câu 20.** Cho một mô hình $3D$ mô phỏng một đường hầm như hình vẽ bên.



Chiều dài của đường hầm mô hình là 5cm, mặt phẳng vuông góc với mặt đáy của đường hầm tạo được thiết diện là một hình parabol, thiết diện có độ dài cạnh đáy gấp đôi chiều cao. Tính thể tích không gian bên trong đường hầm mô

hình, biết chiều cao của mỗi thiết diện parabol cho bởi công thức $y = 3 - \frac{2}{5}x$ (đơn vị là cm), với x là khoảng cách tính từ lối vào lớn hơn của đường hầm mô hình. Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.

A. 29.

B. 30.


C. 28.

D. 31.

👉 **Lời giải**

Chọn A

Xét một thiết diện parabol có chiều cao là h và độ dài đáy $2h$ và chọn hệ trục Oxy như hình vẽ bên



Parabol (P) có phương trình $(P): y = ax^2 + h, (a < 0)$

Có $B(h; 0) \in (P) \Leftrightarrow 0 = ah^2 + h \Leftrightarrow a = -\frac{1}{h} (do h > 0)$

Diện tích S của thiết diện: $S = \int_{-h}^h \left(-\frac{1}{h}x^2 + h \right) dx = \frac{4h^2}{3}$, kết hợp chiều cao $h = 3 - \frac{2}{5}x$

$$S(x) = \frac{4}{3} \left(3 - \frac{2}{5}x \right)^2$$

Ta được diện tích thiết diện là

Thể tích không gian bên trong của đường hầm mô hình:

$$V = \int_0^5 S(x) dx = \int_0^5 \frac{4}{3} \left(3 - \frac{2}{5}x \right)^2 dx \approx 28,888$$

$$V \approx 29 \text{ (cm}^3\text{)}$$

Vậy

» **Câu 21.** Các nhà kinh tế sử dụng đường cong Lorenz để minh họa sự phân phối thu nhập trong một quốc gia. Gọi x là đại diện cho phần trăm số gia đình trong một quốc gia và y là phần trăm tổng thu nhập, mô hình $y = x^x$ sẽ đại diện cho một quốc gia mà các gia đình có thu nhập như nhau. Đường cong Lorenz $y = f(x)$, biểu thị sự phân phối thu nhập thực tế. Diện tích giữa hai mô hình này, với $0 \leq x \leq 100$, biểu thị “sự bất bình đẳng về thu nhập” của một quốc gia.



Năm 2009, đường cong Lorenz của Hoa Kỳ có thể được mô hình hóa bởi hàm số

$$y = (0,00061x^2 + 0,0224x + 1,666)^2, 0 \leq x \leq 100$$

Trong đó x được tính từ các gia đình nghèo nhất đến giàu có nhất. Sự bất bình đẳng về thu nhập của Hoa Kỳ vào năm 2009 có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 7922,9.

B. 2922,9.

C. 2085,5.

D. 2077,1.

👉 **Lời giải**


Chọn C

Sự bất bình đẳng về thu nhập của Hoa Kỳ vào năm 2009 là diện tích hình phẳng S giới hạn bởi hai đồ thị:

$$\begin{cases} y = x \\ y = (0,00061x^2 + 0,0224x + 1,666)^2 \\ x = 0; x = 100 \end{cases} \Rightarrow S = \int_0^{100} \left| (0,00061x^2 + 0,0224x + 1,666)^2 - x \right| dx$$

Sử dụng máy tính cầm tay, ta được $S \approx 2085,5$.

» **Câu 22.** Cho một cái cốc thủy tinh hình trụ bán kính đáy là 6 cm, chiều cao là 10 cm đang đựng một lượng nước. Tính thể tích lượng nước trong cốc, biết khi nghiêng cốc nước vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì ở đáy mực nước trùng với đường kính đáy?



A. 240 cm³.

B. 250 cm³.


C. 245 cm³.

D. 249 cm³.

👉 **Lời giải**

Chọn A

Cốc hình trụ có bán kính $R = 6$ cm, chiều cao $h = 10$ cm. Gán hệ trục tọa độ như hình vẽ bên





Một mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm x ($-6 \leq x \leq 6$) cắt vật thể theo thiết diện có diện tích là $S(x)$.

Ta thấy thiết diện đó là một tam giác ABC vuông tại B như trong hình vẽ.

$$\text{Ta có } S(x) = S_{ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot BC = \frac{1}{2} BC^2 \tan a = \frac{1}{2} (R^2 - x^2) \frac{h}{R} = \frac{5(36 - x^2)}{6}.$$

$$V = \int_{-6}^6 S(x) dx = \int_{-6}^6 \frac{5(36 - x^2)}{6} dx = 240 \text{ cm}^3.$$

Vậy thể tích lượng nước trong cốc là

b) Tìm a sao cho thể tích V lớn nhất.

Xét hàm số $y = \tan a$ với $0 < a \leq \frac{p}{4}$.


Ta có: $y' = \frac{1}{\cos^2 a} > 0, \forall a \in \left(0; \frac{p}{4}\right]$ nên hàm số $y = \tan a$ đồng biến trên $\left(0; \frac{p}{4}\right]$.

$$\text{Khi đó, } y = \tan a \leq \tan \frac{p}{4} = 1, \forall a \in \left(0; \frac{p}{4}\right] \Rightarrow V = \frac{p \tan^2 a a^3}{3} \leq \frac{p a^3}{3}.$$

Đẳng thức xảy ra khi $\tan a = 1$ hay $a = \frac{p}{4}$.

B. Câu hỏi - Trả lời Đúng/sai

» **Câu 23.** Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a; d]$ và có đồ thị như hình vẽ. Biết đồ thị $f(x)$ cắt trục hoành tại 4 điểm a, b, c, d , đồng thời tạo với trục hoành và 2 đường thẳng $x = a, x = d$ thành một hình phẳng (H) gồm 3 phần có diện tích lần lượt là S_1, S_2, S_3 như hình vẽ.



Xét tính đúng, sai của 4 mệnh đề sau:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$S_1 = \int_a^b f(x) dx$		
(b)	$S_2 = - \int_c^b f(x) dx$		
(c)	$S_3 = - \int_c^d f(x) dx$		
(d)	$S_{(H)} = \int_a^b f(x) dx - \int_b^c f(x) dx + \int_c^d f(x) dx$		



Lời giải

(a) $S_1 = \int_a^b f(x)dx$

Dựa vào hình vẽ, ta có:

» **Chọn ĐÚNG.**

(b) $S_2 = - \int_c^b f(x)dx$

Dựa vào hình vẽ, ta có:

» **Chọn SAI.**

$$S_2 = \int_c^b |f(x)|dx = - \int_c^b f(x)dx \quad (\text{do } f(x) \leq 0, x \in [b; c]).$$

(c) $S_3 = - \int_c^d f(x)dx$

Dựa vào hình vẽ, ta có:

» **Chọn SAI.**

$$S_3 = \int_c^d |f(x)|dx = \int_c^d f(x)dx \quad (\text{do } f(x) \geq 0, x \in [c; d]).$$

(d) $S_{(H)} = \int_a^b f(x)dx - \int_b^c f(x)dx + \int_c^d f(x)dx$

Dựa vào hình vẽ, ta có:

» **Chọn ĐÚNG.**

$$S_{(H)} = \int_a^d |f(x)|dx = \int_a^b f(x)dx - \int_b^c f(x)dx + \int_c^d f(x)dx$$

» **Câu 24.** Cho hai hàm số $f(x) = -x^2 + 4$ và $g(x) = x - 1$. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Diện tích hình phẳng (H_1) tạo bởi $f(x), Ox$ và hai đường thẳng $x = -3, x = 3$ là $S_{(H_1)} = \int_{-3}^3 f(x) dx = \frac{46}{3}$		
(b)	Diện tích hình phẳng (H_2) tạo bởi $f(x), Ox$ và hai đường thẳng $x = -2, x = 2$ là $S_{(H_2)} = \int_{-2}^2 f(x)dx = \frac{32}{3}$		
(c)	Diện tích hình phẳng (H_3) tạo bởi $g(x), Ox$ và hai đường thẳng $x = -3, x = 3$ là $S_{(H_3)} = \left \int_{-3}^1 g(x)dx + \int_1^3 g(x)dx \right = 6$		
(d)	Diện tích hình phẳng (H_4) tạo bởi $g(x), Ox$ và hai đường thẳng $x = -3, x = 3$ là $S_{(H_4)} = - \int_{-3}^1 g(x)dx + \int_1^3 g(x)dx = 10$		



Lời giải

(a) Diện tích hình phẳng (H_1) tạo bởi $f(x), Ox$ và hai đường thẳng $x = -3, x = 3$ là

$$S_{(H_1)} = \int_{-3}^3 |f(x)| dx = \frac{46}{3}$$

Ta có:

$$S_{(H_1)} = \int_{-3}^3 |f(x)| dx = \frac{46}{3}$$

» **Chọn ĐÚNG.**

(b) Diện tích hình phẳng (H_2) tạo bởi $f(x), Ox$ và hai đường thẳng $x = -2, x = 2$ là

$$S_{(H_2)} = \int_{-2}^2 f(x) dx = \frac{32}{3}$$

Ta có:

$$S_{(H_2)} = \int_{-2}^2 |f(x)| dx = \int_{-2}^2 f(x) dx = \frac{32}{3} \quad (\text{do } f(x) \geq 0, x \in [-2; 2])$$

» **Chọn ĐÚNG.**

(c) Diện tích hình phẳng (H_3) tạo bởi $g(x), Ox$ và hai đường thẳng $x = -3, x = 3$ là

$$S_{(H_3)} = \left| \int_{-3}^1 g(x) dx + \int_1^3 g(x) dx \right| = 6$$

Ta có:

$$S_{(H_3)} = \int_{-3}^3 |g(x)| dx = - \int_{-3}^1 g(x) dx + \int_1^3 g(x) dx = 10 \quad (\text{do } g(x) \leq 0, x \in [-3; 1] \text{ và } g(x) \geq 0, x \in [1; 3])$$

» **Chọn SAI.**

(d) Diện tích hình phẳng (H_4) tạo bởi $g(x), Ox$ và hai đường thẳng $x = -3, x = 3$ là


$$S_{(H_4)} = - \int_{-3}^1 g(x) dx + \int_1^3 g(x) dx = 10$$

Ta có:

$$S_{(H_4)} = \int_{-3}^3 |g(x)| dx = - \int_{-3}^1 g(x) dx + \int_1^3 g(x) dx = 10 \quad (\text{do } g(x) \leq 0, x \in [-3; 1] \text{ và } g(x) \geq 0, x \in [1; 3])$$

» **Chọn ĐÚNG.**

» **Câu 25.** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[-3; 3]$ có đồ thị như hình vẽ, Biết rằng $f(x)$ tạo với trục hoành và 2 đường thẳng $x = -3, x = 3$ một hình phẳng (H) gồm 2 phần có diện tích lần lượt là S_1, S_2 .



Xét tính đúng, sai của 4 mệnh đề sau:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$S_{(H)} = \int_{-3}^3 f(x) dx$		
(b)	$S_2 = \left \int_2^3 (-2x+4) dx \right = 1$		
(c)	$S_1 = \int_{-3}^{-1} (x+3) dx + \int_{-1}^1 2 dx + \int_1^2 (-2x+4) dx$		
(d)	$S_{(H)} = S_1 - \int_2^3 (-2x+4) dx$		

🔗 **Lời giải**

Xét hàm số $y = f(x)$, ta có:

$$f(x) = \begin{cases} x+3, & x \in [-3; -1] \\ 2, & x \in [-1; 1] \\ -2x+4, & x \in [1; 3] \end{cases}$$

(a) $S_{(H)} = \int_{-3}^3 f(x) dx$

Ta có: $S_{(H)} = \int_{-3}^3 |f(x)| dx$

» **Chọn SAI.**

(b) $S_2 = \left| \int_2^3 (-2x+4) dx \right| = 1$

Do $f(x) = -2x+4 \leq 0, x \in [2; 3]$ nên $S_2 = \int_2^3 |-2x+4| dx = \left| \int_2^3 (-2x+4) dx \right| = 1$

» **Chọn ĐÚNG.**

(c) $S_1 = \int_{-3}^{-1} (x+3) dx + \int_{-1}^1 2 dx + \int_1^2 (-2x+4) dx$

$S_1 = \int_{-3}^2 |f(x)| dx = \int_{-3}^{-1} (x+3) dx + \int_{-1}^1 2 dx + \int_1^2 (-2x+4) dx$

Dựa vào hình vẽ, ta có:



» **Chọn ĐÚNG.**


(d) $S_{(H)} = S_1 - \int_2^3 (-2x+4)dx$

$$S_{(H)} = \int_{-3}^3 f(x)dx = S_1 + S_2 = S_1 - \int_2^3 (-2x+4)dx$$

Ta có:


» **Chọn ĐÚNG.**

» **Câu 26.** Cho khối chóp đều có đáy là hình vuông cạnh L và chiều cao là h . Chọn trục Ox sao cho gốc O trùng với đỉnh của khối chóp và trục đi qua tâm của đáy. (như hình dưới).



	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Đáy của khối chóp nằm trên mặt phẳng song song với Ox .		
(b)	Mỗi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ bằng x ($0 \leq x \leq h$), cắt khối chóp theo mặt cắt là hình vuông cạnh a .		
(c)	Diện tích mặt cắt là $S(x) = \frac{L}{h}x^2$.		
(d)	Thể tích của khối chóp là $V = \frac{1}{3}L^2h$.		

» **Lời giải**



(a) Đáy của khối chóp nằm trên mặt phẳng song song với Ox .

Đáy của khối chóp nằm trên mặt phẳng vuông góc với Ox tại $x=h$.

» **Chọn SAI.**

(b) Mỗi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ bằng x ($0 \leq x \leq h$), cắt khối chóp theo mặt cắt là hình vuông cạnh a .



Mỗi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ bằng x ($0 \leq x \leq h$), cắt khối chóp theo mặt cắt là hình vuông có cạnh là a .

» **Chọn ĐÚNG.**

(c) Diện tích mặt cắt là $S(x) = \frac{L}{h} x^2$.

Theo định lí Tha-les, ta có $\frac{x}{h} = \frac{a}{L}$, suy ra $a = \frac{L}{h} x$.

Do đó, diện tích của mặt cắt này là $S(x) = \frac{L^2}{h^2} x^2$.


» **Chọn SAI.**

(d) Thể tích của khối chóp là $V = \frac{1}{3} L^2 h$.

Thể tích của khối chóp này là $V = \int_0^h S(x) dx = \int_0^h \frac{L^2}{h^2} x^2 dx = \frac{L^2}{h^2} \frac{x^3}{3} \Big|_0^h = \frac{1}{3} L^2 h$.

» **Chọn ĐÚNG.**

» **Câu 27.** Cho đồ thị hàm số $y = e^x$ và hình được tô màu như dưới.



	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hình phẳng được tô màu giới hạn bởi 3 đường		
(b)	Diện tích hình phẳng được tính bởi công thức $S = \int_{-1}^1 (e^x)^2 dx$		
(c)	Diện tích hình phẳng $S = e - \frac{1}{e}$		
(d)	Thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng đó quanh trục Ox là $V = \frac{1}{2} \pi \left(e^2 - \frac{1}{e} \right)$		

» **Lời giải**

(a) Hình phẳng được tô màu giới hạn bởi 3 đường.

Hình phẳng đó giới hạn bởi bốn đường $y = e^x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -1$, $x = 1$.

» **Chọn SAI.**



$$S = \int_{-1}^1 (e^x)^2 dx$$

(b) Diện tích hình phẳng được tính bởi công thức

$$S = \int_{-1}^1 |e^x| dx = \int_{-1}^1 e^x dx$$

Ta có diện tích hình phẳng

» **Chọn SAI.**

(c) Diện tích hình phẳng $S = e - \frac{1}{e}$.

$$S = \int_{-1}^1 e^x dx = e^x \Big|_{-1}^1 = e - \frac{1}{e}$$

Ta có diện tích hình phẳng

» **Chọn ĐÚNG.**


(d) Thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng đó quanh trục Ox là $V = \frac{1}{2}p \left(e^2 - \frac{1}{e^2} \right)$.

Ta có thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng đó quanh trục Ox là

$$V = p \int_{-1}^1 (e^x)^2 dx = p \int_{-1}^1 e^{2x} dx = p \left(\frac{1}{2} e^{2x} \Big|_{-1}^1 \right) = \frac{1}{2} p \left(e^2 - \frac{1}{e^2} \right)$$

» **Chọn ĐÚNG.**

» **Câu 28.** Cho đồ thị hàm số $y = x^2 - 3x + 2$ và $y = x - 1$ và $S_1; S_2$ là phần diện tích phần được tô như trong hình dưới.



	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 3x + 2$ và $y = x - 1$ là $\int_0^3 (-x^2 + 4x - 3) dx$		
(b)	$S_1 = \frac{4}{3}$		
(c)	$S_1 = S_2$		
(d)	Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 3x + 2$; $y = x - 1$; $x = 0$; $x = 3$ là $\int_0^3 (-x^2 + 4x - 3) dx = 1$		



Lời giải

(a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 3x + 2$ và $y = x - 1$ là

$$\int_0^3 (-x^2 + 4x - 3) dx$$

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 3x + 2$ và $y = x - 1$ là

$$\int_1^3 (x - 1 - (x^2 - 3x + 2)) dx = \int_1^3 (-x^2 + 4x - 3) dx$$

» **Chọn SAI.**

(b) $S_1 = \frac{4}{3}$.

$$S_1 = \int_0^1 (x^2 - 3x + 2 - (x - 1)) dx = \int_0^1 (x^2 - 4x + 3) dx = \left(\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3} - 2 + 3 = \frac{4}{3}$$

» **Chọn ĐÚNG.**

(c) $S_1 = S_2$.

$$S_2 = \int_1^3 (x - 1 - (x^2 - 3x + 2)) dx = \int_1^3 (-x^2 + 4x - 3) dx = \left(-\frac{x^3}{3} + 2x^2 - 3x \right) \Big|_1^3$$

$$= -9 + 18 - 9 - \left(-\frac{1}{3} + 2 - 3 \right) = \frac{4}{3}$$

Vậy $S_1 = S_2$.

» **Chọn ĐÚNG.**

(d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 3x + 2$, $y = x - 1$, $x = 0$, $x = 3$

là $\int_0^3 (-x^2 + 4x - 3) dx = 1$.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 3x + 2$, $y = x - 1$, $x = 0$,

$x = 3$ là $\int_0^3 (-x^2 + 4x - 3) dx = S_1 + S_2 = \frac{8}{3}$.

» **Chọn SAI.**

» **Câu 29.** Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = -\sin x$, $y = 1$, $x = a$ ($0 \leq a \leq p$), $x = p$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Nếu $a = p$ thì diện tích của (H) bằng 0.		
(b)	Nếu $a = 0$ thì diện tích của (H) bằng $p + 2$.		
(c)	Nếu diện tích của hình (H) là $S = p - a + \frac{3}{2}$ thì $\frac{p}{a}$ là số nguyên chia hết cho 9.		



(d)

Nếu diện tích của hình (H) là S' thì $\int_a^p \sin x dx = S' - p - a$.

» **Lời giải**

(a) Nếu $a=p$ thì diện tích của (H) bằng 0.

Nếu $a=p$ thì diện tích của (H) bằng $\int_p^p |1 + \sin x| dx = 0$.

» **Chọn ĐÚNG.**

(b) Nếu $a=0$ thì diện tích của (H) bằng $p+2$.
b) Đúng.

Nếu $a=0$ thì diện tích của (H) bằng
 $\int_0^p |1 + \sin x| dx = \int_0^p (1 + \sin x) dx = (x - \cos x) \Big|_0^p = p + 2$.

» **Chọn ĐÚNG.**

(c) Nếu diện tích của hình (H) là $S = p - a + \frac{3}{2}$ thì $\frac{p}{a}$ là số nguyên chia hết cho 9.

Diện tích của hình (H) là

$$S = \int_a^p |1 + \sin x| dx = \int_a^p (1 + \sin x) dx = (x - \cos x) \Big|_a^p = p + 1 - a + \cos a$$

Theo đề, ta có:

$$p + 1 - a + \cos a = p - a + \frac{3}{2} \Leftrightarrow \cos a = \frac{1}{2} \Leftrightarrow a = \frac{p}{3} \text{ (vì } 0 \leq a \leq p \text{)}.$$

$$\frac{p}{a} = \frac{p}{\frac{p}{3}} = 3$$

Do đó, $\frac{p}{a} = 3$ và không chia hết cho 9.

» **Chọn SAI.**

(d) Nếu diện tích của hình (H) là S' thì $\int_a^p \sin x dx = S' - p - a$.

Diện tích của hình (H) là:

$$\begin{aligned} S' &= \int_a^p |1 + \sin x| dx = \int_a^p (1 + \sin x) dx = x \Big|_a^p + \int_a^p \sin x dx = p - a + \int_a^p \sin x dx \\ &\Rightarrow \int_a^p \sin x dx = S' - p + a \end{aligned}$$

» **Chọn SAI.**

» **Câu 30.** Trong mặt phẳng Oxy , cho hàm số $y = x + \sqrt{x}$ và $y = x + x^2$.

	Mệnh đề	Đúng g	Sai
(a)	Hoành độ giao điểm của đồ thị hai hàm số trên là $x=0$ hoặc $x=-1$		



(b)	Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số trên và $x=0, x=1$ được tính theo công thức $S = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx$		
(c)	Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số trên và $x=0, x=1$ được tính theo công thức $S = \int_0^1 (x+x^2) dx - \int_0^1 (x+\sqrt{x}) dx$		
(d)	Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số trên và $x=0, x=1$ bằng $\frac{1}{3}$ đvdt		

Lời giải

(a) Hoành độ giao điểm của đồ thị hai hàm số trên là $x=0$ hoặc $x=-1$.

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số trên là

$$x + \sqrt{x} = x + x^2 \Leftrightarrow x = x^4 \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ x=1 \end{cases}$$

» **Chọn SAI.**

(b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số trên và $x=0, x=1$ được tính

theo công thức $S = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx$.

Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường $y = x + \sqrt{x}, y = x + x^2, x=0, x=1$ là:

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 |(x + \sqrt{x}) - (x + x^2)| dx \\ &= \int_0^1 |\sqrt{x} - x^2| dx = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx \end{aligned}$$

» **Chọn ĐÚNG.**

(c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số trên và $x=0, x=1$ được tính

theo công thức $S = \int_0^1 (x + x^2) dx - \int_0^1 (x + \sqrt{x}) dx$.

Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường $y = x + \sqrt{x}, y = x + x^2, x=0, x=1$ là:

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 |(x + \sqrt{x}) - (x + x^2)| dx \\ &= \int_0^1 [(x + \sqrt{x}) - (x + x^2)] dx \quad (\text{vì } x + \sqrt{x} \geq x + x^2 \forall x \in [0; 1]) \\ &= \int_0^1 (x + \sqrt{x}) dx - \int_0^1 (x + x^2) dx \end{aligned}$$

» **Chọn SAI.**



(d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số trên và $x=0$, $x=1$ bằng $\frac{1}{3}$ đvdt.

Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường $y=x+\sqrt{x}$, $y=x+x^2$, $x=0$, $x=1$ là

$$S = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \left(\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \text{ đvdt.}$$

» **Chọn SAI.**

» **Câu 31.** Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y=x^2+3$, $y=0$, $x=0$, $x=2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Công thức tính diện tích hình phẳng (H) là: $S_{(H)} = \int_0^2 (x^2 + 3) dx$.		
(b)	Diện tích hình phẳng (H) bằng $\frac{26}{3}$.		
(c)	Công thức tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng (H) xung quanh trục Ox là: $V = \int_0^2 (x^2 + 3)^2 dx$.		
(d)	Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng (H) xung quanh trục Ox bằng $\frac{202}{5}$.		

» **Lời giải**

(a) Công thức tính diện tích hình phẳng (H) là: $S_{(H)} = \int_0^2 (x^2 + 3) dx$.

Công thức tính diện tích hình phẳng (H) là: $S_{(H)} = \int_0^2 (x^2 + 3) dx$.

» **Chọn ĐÚNG.**

(b) Diện tích hình phẳng (H) bằng $\frac{26}{3}$.

Diện tích hình phẳng (H) là $S_{(H)} = \int_0^2 (x^2 + 3) dx = \frac{26}{3}$.

» **Chọn ĐÚNG.**

(c) Công thức tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng (H) xung

quanh trục Ox là: $V = \int_0^2 (x^2 + 3)^2 dx$.



Công thức tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng (H) xung

quanh trục Ox là:

$$V = p \int_0^2 (x^2 + 3)^2 dx$$

» **Chọn SAI.**

(d) Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng (H) xung quanh trục Ox bằng $\frac{202}{5}$.

Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng (H) xung quanh trục Ox là:

$$V = p \int_0^2 (x^2 + 3)^2 dx = \frac{202p}{5}$$

» **Chọn ĐÚNG.**

» **Câu 32.** Khối chỏm cầu có bán kính $R=5$ và chiều cao $h=1$ sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi cung tròn có phương trình $y = \sqrt{25 - x^2}$, trục hoành và hai đường thẳng $x=4$, $x=5$ xung quanh trục Ox .

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Khoảng cách từ tâm của khối cầu đến khối chỏm cầu bằng 3.		
(b)	Thể tích của khối chỏm cầu V_1 được tính theo công thức $V_1 = p \int_4^5 (25 - x^2) dx$.		
(c)	Thể tích của khối chỏm cầu $V_1 = \frac{14p}{3}$.		
(d)	Gọi V_2 là thể tích của nửa khối cầu có bán kính bằng 5. Tỷ số thể tích $\frac{V_1}{V_2} = \frac{7}{125}$.		

🔑 **Lời giải**

(a) Khoảng cách từ tâm của khối cầu đến khối chỏm cầu bằng 3.

Khoảng cách từ tâm của khối cầu đến khối chỏm cầu bằng $5 - 1 = 4$.

» **Chọn SAI.**

(b) Thể tích của khối chỏm cầu V_1 được tính theo công thức

$$V_1 = p \int_4^5 (25 - x^2) dx$$

Thể tích của khối chỏm cầu được tính theo công thức

$$V_1 = p \int_4^5 \sqrt{25 - x^2}^2 dx = p \int_4^5 (25 - x^2) dx$$

» **Chọn ĐÚNG.**

(c) Thể tích của khối chỏm cầu $V_1 = \frac{14p}{3}$.



$$V = p \int_4^5 (25 - x^2) dx = p \left(25x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_4^5 = \frac{14p}{3}.$$

Ta có thể tích khối chỏm cầu là

» **Chọn ĐÚNG.**

(d) Gọi V_2 là thể tích của nửa khối cầu có bán kính bằng 5. Tỉ số thể tích $\frac{V_1}{V_2} = \frac{7}{125}$.
Gọi V_2 là thể tích của nửa khối cầu có bán kính bằng 5. Ta có


$$V_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} p \cdot 5^3 = \frac{250}{3} p.$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{\frac{14}{3} p}{\frac{250}{3} p} = \frac{7}{125}$$

Suy ra

» **Chọn ĐÚNG.**

» **Câu 33.** Cho tam giác vuông OAB có cạnh $OA = a$ nằm trên trục Ox và $\angle AOB = \alpha \left(0 < \alpha < \frac{\pi}{2} \right)$. Gọi b là khối tròn xoay sinh ra khi quay miền tam giác OAB xung quanh trục Ox .



	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Khi $a = \frac{p}{4}$ thì thể tích V của khối b là $\frac{pa^3}{3}$ (đvtt).		
(b)	Khi $a = \frac{p}{6}$ thì thể tích V của khối b là $\frac{pa^3}{9}$ (đvtt).		
(c)	Khi thể tích V của khối b là $\frac{4pa^3}{3}$ thì giá trị $\cos \alpha < \frac{1}{2}$.		
(d)	Khi $\tan \alpha = \cot \alpha$ thì thể tích V của khối b là $\frac{pa^3}{3}$.		

» **Lời giải**

(a) Khi $a = \frac{p}{4}$ thì thể tích V của khối b là $\frac{pa^3}{3}$ (đvtt).

Do OB đi qua gốc tọa độ và tạo với Ox một góc $\frac{p}{4}$ nên $OB: y = \tan \frac{p}{4} x = x$.



$$V = p \int_0^a x^2 dx = \frac{px^3}{3} \Big|_0^a = \frac{pa^3}{3} \quad (\text{đvtt}).$$

Khi đó, thể tích của khối b theo

» **Chọn ĐÚNG.**

(b) Khi $a = \frac{p}{6}$ thì thể tích V của khối b là $\frac{pa^3}{9}$ (đvtt).

Do OB đi qua gốc tọa độ và tạo với Ox một góc $\frac{p}{6}$ nên $OB: y = \tan \frac{p}{6} x = \frac{x}{\sqrt{3}}$.

$$V = p \int_0^a \left(\frac{x}{\sqrt{3}} \right)^2 dx = p \int_0^a \frac{x^2}{3} dx = \frac{px^3}{9} \Big|_0^a = \frac{pa^3}{9} \quad (\text{đvtt}).$$

Khi đó, thể tích của khối b theo

» **Chọn ĐÚNG.**

(c) Khi thể tích V của khối b là $\frac{4pa^3}{3}$ thì giá trị $\cos a < \frac{1}{2}$.

Do OB đi qua gốc tọa độ và tạo với Ox một góc a nên $OB: y = \tan a \cdot x$.

$$V = p \int_0^a (\tan a \cdot x)^2 dx = \frac{p \tan^2 a \cdot x^3}{3} \Big|_0^a = \frac{p \tan^2 a \cdot a^3}{3}$$

Khi đó, thể tích của khối b theo (đvtt).

$$V = \frac{4pa^3}{3} \Leftrightarrow \frac{p \tan^2 a \cdot a^3}{3} = \frac{4pa^3}{3} \Leftrightarrow \tan^2 a = 4 \Rightarrow \frac{1}{\cos^2 a} = \tan^2 a + 1 = 5 \Rightarrow \cos a = \frac{\pm 1}{\sqrt{5}}.$$

Mặt khác $0 < a < \frac{p}{2}$ nên $\cos a = \frac{1}{\sqrt{5}}$.

» **Chọn ĐÚNG.**

(d) Khi $\tan a = \cot a$ thì thể tích V của khối b là $\frac{pa^3}{3}$.

Ta có: Do OB đi qua gốc tọa độ và tạo với Ox một góc a nên $OB: y = \tan a \cdot x$.

$$V = p \int_0^a (\tan a \cdot x)^2 dx = \frac{p \tan^2 a \cdot x^3}{3} \Big|_0^a = \frac{p \tan^2 a \cdot a^3}{3}$$

Khi đó, thể tích của khối b theo (đvtt).

$$\text{Do } \tan a = \cot a \Rightarrow \tan^2 a = \cot a \cdot \tan a = 1 \Leftrightarrow \tan a = \pm 1.$$

$$\text{Mặt khác } 0 < a < \frac{p}{2} \text{ nên } \tan a = 1 \Rightarrow V = \frac{p \tan^2 a \cdot a^3}{3} = \frac{pa^3}{3} \quad (\text{đvtt}).$$

» **Chọn ĐÚNG.**

» **Câu 34.** Các nhà kinh tế sử dụng đường cong Lorenz để minh họa sự phân phối thu nhập trong một quốc gia. Gọi x là đại diện cho phần trăm số gia đình trong một quốc gia và y là phần trăm tổng thu nhập, mô hình $y = x^2$ sẽ đại diện cho một quốc gia mà các gia đình có thu nhập như nhau. Đường cong Lorenz $y = f(x)$, biểu thị sự phân phối thu nhập thực tế. Diện tích giữa hai mô hình này, với $0 \leq x \leq 100$, biểu thị “sự bất bình đẳng về thu nhập” của một quốc gia. Năm 2005, đường cong Lorenz của Hoa Kỳ có thể được mô hình hóa bởi hàm số



$$y = (0,00061x^2 + 0,0218x + 1,723)^2, 0 \leq x \leq 100$$

Trong đó x được tính từ các gia đình nghèo nhất đến giàu có nhất (Theo R.Larson, *Brief Calculus: An Applied Approach*, 8th edition, Cengage Learning, 2009)

Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Tính theo thứ tự từ các gia đình nghèo nhất đến giàu nhất, tổng thu nhập thực tế của 60% các gia đình đầu tiên chiếm chưa đến 30% so với tổng thu nhập của toàn bộ các gia đình.		
(b)	Nếu sắp xếp các gia đình theo thứ tự từ nghèo nhất đến giàu nhất, rồi chia thành 10 nhóm bằng nhau từ 1 đến 10, tổng thu nhập của các gia đình trong nhóm 3 chiếm khoảng 8,56% tổng thu nhập của toàn bộ các gia đình.		
(c)	Sự bất bình đẳng về thu nhập của Hoa Kỳ năm 2005 được xác định bởi công thức: $\int_0^{100} [x - (0,00061x^2 + 0,0218x + 1,723)^2] dx$		
(d)	Sự bất bình đẳng về thu nhập của Hoa Kỳ năm 2005 đã vượt quá 2000.		

Lời giải

(a) Tính theo thứ tự từ các gia đình nghèo nhất đến giàu nhất, tổng thu nhập thực tế của 60% các gia đình đầu tiên chiếm chưa đến 30% so với tổng thu nhập của toàn bộ các gia đình.

Tính theo thứ tự từ các gia đình nghèo nhất đến giàu nhất, tổng thu nhập của 60% các gia đình đầu tiên chiếm tỷ lệ trong tổng thu nhập là:

$$f(60) = 27,321529(\%)$$

» Chọn ĐÚNG.

(b) Nếu sắp xếp các gia đình theo thứ tự từ nghèo nhất đến giàu nhất, rồi chia thành 10 nhóm bằng nhau từ 1 đến 10, tổng thu nhập của các gia đình trong nhóm 3 chiếm khoảng 8,56% tổng thu nhập của toàn bộ các gia đình.

Nếu sắp xếp các gia đình theo thứ tự từ nghèo đến giàu, rồi chia thành 10 nhóm bằng nhau, mỗi nhóm chiếm 10% số gia đình của Hoa Kỳ.

Tổng thu nhập của 30% số gia đình (là các gia đình thuộc nhóm 1,2,3) chiếm tỷ lệ trong tổng thu nhập của tất cả các gia đình là:

$$f(30) = 8,561476(\%)$$

Tổng thu nhập của 20% số gia đình (là các gia đình thuộc nhóm 1,2) chiếm tỷ lệ trong tổng thu nhập của tất cả các gia đình là:

$$f(20) = 5,774409(\%)$$

⇒ Tỷ lệ của tổng thu nhập các gia đình nhóm thứ 3 so với toàn bộ các gia đình là:

$$f(30) - f(20) = 2,787067(\%)$$



» **Chọn SAI.**

(c) Sự bất bình đẳng về thu nhập của Hoa Kỳ năm 2005 được xác định bởi công thức:

$$\int_0^{100} \left[x - (0,00061x^2 + 0,0218x + 1,723)^2 \right] dx$$

Sự bất bình đẳng về thu nhập của Hoa Kỳ vào năm 2005 là diện tích hình phẳng S giới hạn bởi hai đồ thị:

$$\begin{cases} y = x \\ y = (0,00061x^2 + 0,0218x + 1,723)^2 \\ x = 0; x = 100 \end{cases} \Rightarrow S = \int_0^{100} \left| (0,00061x^2 + 0,0218x + 1,723)^2 - x \right| dx$$

Cách 1:

Sử dụng máy tính cầm tay, ta thấy phương trình

$$(0,00061x^2 + 0,0218x + 1,723)^2 - x = 0 \text{ có hai nghiệm } x = a; x = b \ (a < b) \text{ thuộc } [0; 100].$$

Xét dấu biểu thức $g(x) = (0,00061x^2 + 0,0218x + 1,723)^2 - x$ ta được:

x	0	a	b	100	
$g(x)$	+	0	-	0	+

$$S = \int_0^{100} |g(x)| dx = \int_0^a g(x) dx + \int_a^b g(x) dx + \int_b^{100} g(x) dx$$

Suy ra:

$$\begin{aligned} &= \left| \int_0^a g(x) dx \right| + \left| \int_a^b g(x) dx \right| + \left| \int_b^{100} g(x) dx \right| \\ &= \int_0^a g(x) dx - \int_a^b g(x) dx + \int_b^{100} g(x) dx \end{aligned}$$

Cách 2:

Sử dụng máy tính cầm tay ta được:

$$S = \int_0^{100} \left| (0,00061x^2 + 0,0218x + 1,723)^2 - x \right| dx \approx 2068,9$$

Kiểm tra phép tính của đề bài, ta có:

$$\int_0^{100} \left[x - (0,00061x^2 + 0,0218x + 1,723)^2 \right] dx = 2059,3131$$

» **Chọn SAI.**

(d) Sự bất bình đẳng về thu nhập của Hoa Kỳ năm 2005 đã vượt quá 2000.


Sự bất bình đẳng thu nhập của Hoa Kỳ năm 2005 là:

$$S = \int_0^{100} \left| (0,00061x^2 + 0,0218x + 1,723)^2 - x \right| dx \approx 2068,9$$

» **Chọn ĐÚNG.**

C. Câu hỏi - Trả lời ngắn

» **Câu 35.** Đồ thị trong hình dưới đây là của hàm số $y = f(x)$.



Biết $\int_{-2}^0 f(x)dx = 3$; $\int_0^1 f(x)dx = -1$
hình.

. Tính diện tích phần hình phẳng tô đậm trong

Lời giải

✓ **Trả lời: 4**

Từ đồ thị ta có $f(x) \geq 0, \forall x \in [-2; 0]$ và $f(x) \leq 0, \forall x \in [0; 1]$.

$$S = \int_{-2}^1 |f(x)| dx = \int_{-2}^0 f(x) dx + \int_0^1 |f(x)| dx = \int_{-2}^0 f(x) dx - \int_0^1 f(x) dx$$

Do đó

$$S = 3 - (-1) = 4$$

» **Câu 36.** Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^3 + 2x + 1$, trục hoành, $x = 1$ và $x = 2$.

Lời giải

✓ **Trả lời: 7,75**

$$S = \int_1^2 |x^3 + 2x + 1| dx = \frac{31}{4} = 7,75$$

Diện tích hình phẳng cần tìm là

» **Câu 37.** Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường: $y = 3x + x^2$, $y = 0$; $x = 0$; $x = 3$ quanh trục Ox bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Lời giải

✓ **Trả lời: 789**

$$V = p \int_0^3 (3x + x^2)^2 dx = \frac{2511p}{10} \approx 789$$

» **Câu 38.** Khối chỏm cầu có bán kính $R = 3$ và chiều cao $h = \frac{3}{2}$ sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi cung tròn có phương trình $y = \sqrt{9 - x^2}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = \frac{3}{2}$, $x = 3$ xung quanh trục Ox . Tính thể tích khối chỏm cầu này (làm tròn kết quả đến hàng chục).

Lời giải

✓ **Trả lời: 17,7**

$$V = p \int_{\frac{3}{2}}^3 (9 - x^2) dx = p \left(9x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{\frac{3}{2}}^3 = \frac{45p}{8} \approx 17,7$$

Ta có thể tích khối chỏm cầu là



» **Câu 39.** Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường: $y = 8 - x^2$, $y = 3x^2$, $x = -\sqrt{2}$, $x = \sqrt{2}$ (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)

🔗 **Lời giải**

✓ **Trả lời: 15,08**

Ta có: $8 - x^2 = 3x^2 \Leftrightarrow 8 - 4x^2 = 0 \Leftrightarrow x = -\sqrt{2}$ hoặc $x = \sqrt{2}$.

Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 8 - x^2$, $y = 3x^2$, $x = -\sqrt{2}$, $x = \sqrt{2}$ là:

$$S = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} |8 - x^2 - 3x^2| dx = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (8 - 4x^2) dx = \left[8x - \frac{4x^3}{3} \right]_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} = \frac{32\sqrt{2}}{3} \approx 15,08 \quad (\text{đvdt}).$$

» **Câu 40.** Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường: $y = \sqrt{2x}$, $y = \frac{x^2}{2}$, $x = 0$, $x = 2$ (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)

🔗 **Lời giải**

✓ **Trả lời: 1,33**

$$\text{Ta có: } \frac{x^2}{2} = \sqrt{2x} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ \frac{x^4}{4} = 2x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x^4 - 8x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x = 0 \\ x = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}.$$


Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{2x}$, $y = \frac{x^2}{2}$, $x = 0$, $x = 2$ là:

$$S = \int_0^2 \left| \frac{x^2}{2} - \sqrt{2x} \right| dx = \int_0^2 \left(\sqrt{2x} - \frac{x^2}{2} \right) dx = \left[\frac{1}{3} (2x)^{\frac{3}{2}} - \frac{x^3}{6} \right]_0^2 = \frac{1}{3} \cdot 4^{\frac{3}{2}} - \frac{2^3}{6} = \frac{4}{3} \quad (\text{đvdt}).$$

» **Câu 41.** Gọi (H) là phần hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị của các hàm số $y = 3x^2$, $y = 4 - x$ và trục hoành. Diện tích của (H) là bằng bao nhiêu?

🔗 **Lời giải**

✓ **Trả lời: 5,5**



$$(H): \begin{cases} y = 3x^2 \\ y = 4 - x \\ y = 0 \end{cases}$$

Xét phương trình hoành độ giao điểm:

$$* 4 - x = 0 \Leftrightarrow x = 4$$



$$* 3x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$$3x^2 = 4 - x \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \text{ (t/m)} \\ x = -\frac{4}{3} \text{ (Loại)} \end{cases}$$

*

$$S_{(H)} = \int_0^1 3x^2 dx + \int_1^4 (4 - x) dx = x^3 \Big|_0^1 + \left(4x - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^4 = \frac{11}{2} = 5,5$$

Diện tích hình phẳng


» **Câu 42.** Cho (H) là hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ và được giới hạn bởi các

đường có phương trình $y = \frac{10}{3}x - x^2$, $y = \begin{cases} -x & \text{khi } x \leq 1 \\ x - 2 & \text{khi } x > 1 \end{cases}$. Diện tích của (H) bằng bao nhiêu.

👉 **Lời giải**

✓ **Trả lời: 6,5**

Ta có



$$\text{Xét: } y = \begin{cases} -x & \text{khi } x \leq 1 \\ x - 2 & \text{khi } x > 1 \end{cases}$$

$\lim_{x \rightarrow 1^+} y = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x - 2) = -1$ và $y(1) = -1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^+} y = y(1)$. Do đó hàm số liên tục tại $x = 1$.


Diện tích hình phẳng cần tính là:

$$S = \int_0^1 \left(\frac{10}{3}x - x^2 + x \right) dx + \int_1^3 \left(\frac{10}{3}x - x^2 - x + 2 \right) dx$$

$$\Leftrightarrow S = \int_0^1 \left(\frac{13}{3}x - x^2 \right) dx + \int_1^3 \left(\frac{7}{3}x - x^2 + 2 \right) dx$$

$$\Leftrightarrow S = \left(\frac{13}{6}x^2 - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 + \left(\frac{7}{6}x^2 - \frac{x^3}{3} + 2x \right) \Big|_1^3 = \frac{13}{2} = 6,5$$

» **Câu 43.** Cho tam giác vuông OAB có cạnh OA nằm trên trục Ox và $AOB = a \left(0 < a < \frac{\pi}{2} \right)$ và $B(a; b)$ với a, b là các số thực thỏa $a^2 + b^2 = 1$. Gọi V là khối tròn xoay sinh ra khi quay miền tam giác OAB xung quanh trục Ox .



Tính giá trị $\tan \alpha$ khi thể tích của khối b đạt giá trị lớn nhất. Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ 2.

Lời giải

✓ **Trả lời: 1,41**

Đáp số: $\sqrt{2}$.

Do OB đi qua gốc tọa độ nên ta đặt $OB: y = kx$ với k là số thực dương.

Do OB đi qua $B(a; b) \Rightarrow OB: y = \frac{b}{a}x$ và $\tan \alpha = \frac{b}{a}$.

$$V = p \int_0^a \left(\frac{b}{a}x \right)^2 dx = p \int_0^a \frac{b^2}{a^2} x^2 dx = \frac{pb^2 x^3}{3a^2} \Big|_0^a = \frac{p}{3} b^2 a$$

Khi đó,


Áp dụng bất đẳng thức Am - Gm:

$$V^2 = \frac{p^2}{9} b^2 a^2 = \frac{p^2}{18} b b^2 2a^2 \leq \frac{p^2}{18} \frac{(b^2 + b^2 + 2a^2)^3}{27} = \frac{4p^2}{243} \Rightarrow V \leq \frac{2p\sqrt{3}}{27}$$

$$b^2 = 2a^2 \Rightarrow \frac{b}{a} = \tan \alpha = \sqrt{2}$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi


» **Câu 44.** Trong chương trình nông thôn mới, tại một xã Y có xây một cây cầu bằng bê tông như hình vẽ. Tính thể tích khối bê tông để đổ đủ cây cầu. (Đường cong trong hình vẽ là các đường Parabol)



Lời giải

✓ **Trả lời: 40**

Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ.



Gọi $(P_1): y = ax^2 + b$ là Parabol đi qua hai điểm $A\left(\frac{19}{2}; 0\right), B(0; 2)$

Nên ta có hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} 0 = a\left(\frac{19}{2}\right)^2 + 2 \\ 2 = b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{8}{361} \\ b = 2 \end{cases} \Rightarrow (P_1): y = -\frac{8}{361}x^2 + 2$$

Gọi $(P_2): y = a_2x^2 + b_2$ là Parabol đi qua hai điểm $C(10; 0), D\left(0; \frac{5}{2}\right)$

Nên ta có hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} 0 = a_2(10)^2 + \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} = b_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_2 = -\frac{1}{40} \\ b_2 = \frac{5}{2} \end{cases} \Rightarrow (P_2): y = -\frac{1}{40}x^2 + \frac{5}{2}$$

Gọi mặt phẳng (P) vuông góc với trục Ox , thiết diện tạo bởi mặt phẳng (P) với khối bê tông là hình chữ nhật có chiều dài bằng 5, chiều rộng bằng

$$h(x) = \begin{cases} \left(-\frac{1}{40}x^2 + \frac{5}{2}\right) - \left(-\frac{8}{361}x^2 + 2\right) = \frac{-41}{14440}x^2 + \frac{1}{2}, & -9,5 \leq x \leq 9,5 \\ -\frac{1}{40}x^2 + \frac{5}{2} & , x \in [-10; -9,5] \cup [9,5; 10] \end{cases}$$

$$S(x) = \begin{cases} 5\left(\frac{-41}{14440}x^2 + \frac{1}{2}\right) & , -9,5 \leq x \leq 9,5 \\ 5\left(-\frac{1}{40}x^2 + \frac{5}{2}\right) & , x \in [-10; -9,5] \cup [9,5; 10] \end{cases}$$

Suy ra diện tích thiết diện là

$$V = \int_{-10}^{10} S(x) dx$$

Do đó

$$V = \int_{-10}^{-9,5} 5\left(-\frac{1}{40}x^2 + \frac{5}{2}\right) dx + \int_{-9,5}^{9,5} 5\left(\frac{-41}{14440}x^2 + \frac{1}{2}\right) dx + \int_{9,5}^{10} 5\left(-\frac{1}{40}x^2 + \frac{5}{2}\right) dx = 40$$

Vậy


» **Câu 45.** Cho hình phẳng (D) được giới hạn bởi các đường $y = x^2 + 2x + 2$; $y = 6 - x$; $y = 2$ và (D) nằm ngoài Parabol $y = x^2 + 2x + 2$. Khi cho (D) quay quanh trục Ox , ta



nhận được vật thể tròn xoay có thể tích $V = \frac{ap}{b}$, trong đó a, b là các số nguyên dương. Giá trị biểu thức $P = a - 2b^2$ bằng bao nhiêu.

Lời giải

✓ **Trả lời: 73**



Vẽ các đường $y = x^2 + 2x + 2$; $y = 6 - x$; $y = 2$.

Dựa vào hình vẽ ta có:

$$V = p \int_0^1 \left| (x^2 + 2x + 2)^2 - 2^2 \right| dx + p \int_1^4 \left| (6 - x)^2 - 2^2 \right| dx = \frac{523p}{15} \Rightarrow a = 523, b = 15$$

Vậy $P = 523 - 2 \cdot 15^2 = 73$.

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
<https://www.vnteach.com>