

**TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH KHÁ MỨC 7-8 ĐIỂM**

**Dạng 1. Tích phân cơ bản có điều kiện**

**1. Định nghĩa:** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên  $K$ ;  $a, b$  là hai phần tử bất kì thuộc  $K$ ,  $F(x)$  là một nguyên hàm của  $f(x)$  trên  $K$ . Hiệu số  $F(b) - F(a)$  gọi là tích phân của của  $f(x)$  từ  $a$  đến  $b$  và được kí hiệu:  $\int_a^b f(x) dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a)$ .

**2. Các tính chất của tích phân:**

$+ \int_a^a f(x) dx = 0$	$+ \int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$
$+ \int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$	$+ \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$
$+ \int_a^b k.f(x) dx = k.\int_a^b f(x) dx$	$+ \text{Nếu } f(x) \geq g(x) \forall x \in [a; b] \text{ thì } \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx.$

**Bảng nguyên hàm của một số hàm thường gặp**

$\int x^\alpha .dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$	$\int (ax+b)^\alpha dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax+b)^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$
$\int \frac{1}{x} dx = \ln x  + C$	$\int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \cdot \ln ax+b  + C$
$\int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$	$\int \frac{1}{(ax+b)^2} dx = -\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{ax+b} + C$
$\int \sin x .dx = -\cos x + C$	$\int \sin(ax+b) .dx = -\frac{1}{a} \cdot \cos(ax+b) + C$
$\int \cos x .dx = \sin x + C$	$\int \cos(ax+b) .dx = \frac{1}{a} \cdot \sin(ax+b) + C$
$\int \frac{1}{\sin^2 x} .dx = -\cot x + C$	$\int \frac{1}{\sin^2(ax+b)} .dx = -\frac{1}{a} \cdot \cot(ax+b) + C$
$\int \frac{1}{\cos^2 x} .dx = \tan x + C$	$\int \frac{1}{\cos^2(ax+b)} .dx = \frac{1}{a} \cdot \tan(ax+b) + C$
$\int e^x .dx = e^x + C$	$\int e^{ax+b} .dx = \frac{1}{a} \cdot e^{ax+b} + C$
$\int a^x .dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$	$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left  \frac{x-a}{x+a} \right  + C$

**Nhận xét.** Khi thay  $x$  bằng  $(ax+b)$  thì lấy nguyên hàm nhân kết quả thêm  $\frac{1}{a}$ .

**Câu 1.** (Kinh Môn - Hải Dương 2019) Cho  $F(x)$  là một nguyên hàm của  $f(x) = \frac{2}{x+2}$ . Biết

$F(-1) = 0$ . Tính  $F(2)$  kết quả là.

A.  $\ln 8 + 1$ .

B.  $4 \ln 2 + 1$ .

C.  $2 \ln 3 + 2$ .

**D.**  $2 \ln 4$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

$$\text{Ta có: } \int_{-1}^2 f(x) dx = F(2) - F(-1) \Leftrightarrow \int_{-1}^2 \frac{2}{x+2} = 2 \ln |x+2| \Big|_{-1}^2 = 2 \ln 4 - 2 \ln 1 = 2 \ln 4$$

$$\Leftrightarrow F(2) - F(-1) = 2 \ln 4 \Leftrightarrow F(2) = 2 \ln 4 \text{ (do } F(-1) = 0 \text{)}.$$

**Câu 2.** (Mã 103 - 2019) Cho hàm số  $f(x)$ . Biết  $f(0) = 4$  và  $f'(x) = 2 \sin^2 x + 1, \forall x \in \mathbb{R}$ , khi đó

$\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx$  bằng

A.  $\frac{\pi^2 + 16\pi - 4}{16}$ .

B.  $\frac{\pi^2 - 4}{16}$ .

C.  $\frac{\pi^2 + 15\pi}{16}$ .

**D.**  $\frac{\pi^2 + 16\pi - 16}{16}$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

$$\text{Ta có } f(x) = \int (2 \sin^2 x + 1) dx = \int (2 - \cos 2x) dx = 2x - \frac{1}{2} \sin 2x + C.$$

$$\text{Vì } f(0) = 4 \Rightarrow C = 4$$

$$\text{Hay } f(x) = 2x - \frac{1}{2} \sin 2x + 4.$$

$$\text{Suy ra } \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left( 2x - \frac{1}{2} \sin 2x + 4 \right) dx$$

$$= x^2 + \frac{1}{4} \cos 2x + 4x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi^2}{16} + \pi - \frac{1}{4} = \frac{\pi^2 + 16\pi - 4}{16}.$$

**Câu 3.** (Mã 104 - 2019) Cho hàm số  $f(x)$ . Biết  $f(0) = 4$  và  $f'(x) = 2 \sin^2 x + 3, \forall x \in \mathbb{R}$ , khi đó

$\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx$  bằng

A.  $\frac{\pi^2 - 2}{8}$ .

B.  $\frac{\pi^2 + 8\pi - 8}{8}$ .

C.  $\frac{\pi^2 + 8\pi - 2}{8}$ .

**D.**  $\frac{3\pi^2 + 2\pi - 3}{8}$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

$$\int f'(x) dx = \int (2 \sin^2 x + 3) dx = \int (1 - \cos 2x + 3) dx = \int (4 - \cos 2x) dx = 4x - \frac{1}{2} \sin 2x + C.$$

$$\text{Ta có } f(0) = 4 \text{ nên } 4 \cdot 0 - \frac{1}{2} \sin 0 + C = 4 \Leftrightarrow C = 4.$$

$$\text{Nên } f(x) = 4x - \frac{1}{2} \sin 2x + 4.$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left( 4x - \frac{1}{2} \sin 2x + 4 \right) dx = \left( 2x^2 + \frac{1}{4} \cos 2x + 4x \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi^2 + 8\pi - 2}{8}.$$

**Câu 4.** (Mã 102 - 2019) Cho hàm số  $f(x)$ . Biết  $f(0) = 4$  và  $f'(x) = 2 \cos^2 x + 3, \forall x \in \mathbb{R}$ , khi đó

$\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx$  bằng?

- A.  $\frac{\pi^2 + 8\pi + 8}{8}$ .      B.  $\frac{\pi^2 + 8\pi + 2}{8}$ .      C.  $\frac{\pi^2 + 6\pi + 8}{8}$ .      D.  $\frac{\pi^2 + 2}{8}$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

$$\begin{aligned} \text{Ta có } f(x) &= \int f'(x) dx = \int (2 \cos^2 x + 3) dx = \int \left( 2 \cdot \frac{1 + \cos 2x}{2} + 3 \right) dx \\ &= \int (\cos 2x + 4) dx = \frac{1}{2} \sin 2x + 4x + C \text{ do } f(0) = 4 \Rightarrow C = 4. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Vậy } f(x) &= \frac{1}{2} \sin 2x + 4x + 4 \text{ nên } \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left( \frac{1}{2} \sin 2x + 4x + 4 \right) dx \\ &= \left( -\frac{1}{4} \cos 2x + 2x^2 + 4x \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi^2 + 8\pi + 2}{8}. \end{aligned}$$

**Câu 5.** Biết rằng hàm số  $f(x) = mx + n$  thỏa mãn  $\int_0^1 f(x) dx = 3, \int_0^2 f(x) dx = 8$ . Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- A.  $m + n = 4$ .      B.  $m + n = -4$ .      C.  $m + n = 2$ .      D.  $m + n = -2$ .

**Lời giải**

$$\text{Ta có: } \int f(x) dx = \int (mx + n) dx = \frac{m}{2} x^2 + nx + C.$$

$$\text{Lại có: } \int_0^1 f(x) dx = 3 \Rightarrow \left( \frac{m}{2} x^2 + nx \right) \Big|_0^1 = 3 \Leftrightarrow \frac{1}{2} m + n = 3 \quad (1).$$

$$\int_0^2 f(x) dx = 8 \Rightarrow \left( \frac{m}{2} x^2 + nx \right) \Big|_0^2 = 8 \Leftrightarrow 2m + 2n = 8 \quad (2).$$

$$\text{Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: } \begin{cases} \frac{1}{2} m + n = 3 \\ 2m + 2n = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 2 \\ n = 2 \end{cases}.$$

$$\Rightarrow m + n = 4.$$

**Câu 6.** Biết rằng hàm số  $f(x) = ax^2 + bx + c$  thỏa mãn  $\int_0^1 f(x) dx = -\frac{7}{2}, \int_0^2 f(x) dx = -2$  và

- A.  $-\frac{3}{4}$ .      B.  $-\frac{4}{3}$ .      C.  $\frac{4}{3}$ .      D.  $\frac{3}{4}$ .

**Lời giải**

$$\text{Ta có: } \int f(x) dx = \int (ax^2 + bx + c) dx = \frac{a}{3} x^3 + \frac{b}{2} x^2 + cx + C.$$

$$\text{Lại có: } \int_0^1 f(x) dx = -\frac{7}{2} \Rightarrow \left( \frac{a}{3}x^3 + \frac{b}{2}x^2 + cx \right) \Big|_0^1 = -\frac{7}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{3}a + \frac{1}{2}b + c = -\frac{7}{2} \quad (1).$$

$$\int_0^2 f(x) dx = -2 \Rightarrow \left( \frac{a}{3}x^3 + \frac{b}{2}x^2 + cx \right) \Big|_0^2 = -2 \Leftrightarrow \frac{8}{3}a + 2b + 2c = -2 \quad (2).$$

$$\int_0^3 f(x) dx = \frac{13}{2} \Rightarrow \left( \frac{a}{3}x^3 + \frac{b}{2}x^2 + cx \right) \Big|_0^3 = \frac{13}{2} \Leftrightarrow 9a + \frac{9}{2}b + 3c = \frac{13}{2} \quad (3).$$

$$\text{Từ (1), (2) và (3) ta có hệ phương trình: } \begin{cases} \frac{1}{3}a + \frac{1}{2}b + c = -\frac{7}{2} \\ \frac{8}{3}a + 2b + 2c = -2 \\ 9a + \frac{9}{2}b + 3c = \frac{13}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 3 \\ c = -\frac{16}{3} \end{cases}.$$

$$\Rightarrow P = a + b + c = 1 + 3 + \left( -\frac{16}{3} \right) = -\frac{4}{3}.$$

**Câu 7.** (Chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên 2019) Có hai giá trị của số thực  $a$  là  $a_1, a_2$  ( $0 < a_1 < a_2$ ) thỏa

$$\text{mãn } \int_1^a (2x-3) dx = 0. \text{ Hãy tính } T = 3^{a_1} + 3^{a_2} + \log_2 \left( \frac{a_2}{a_1} \right).$$

A.  $T = 26$ .

B.  $T = 12$ .

C.  $T = 13$ .

D.  $T = 28$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

$$\text{Ta có: } \int_1^a (2x-3) dx = (x^2 - 3x) \Big|_1^a = a^2 - 3a + 2.$$

$$\text{Vì } \int_1^a (2x-3) dx = 0 \text{ nên } a^2 - 3a + 2 = 0, \text{ suy ra } \begin{cases} a = 1 \\ a = 2 \end{cases}.$$

$$\text{Lại có } 0 < a_1 < a_2 \text{ nên } a_1 = 1; a_2 = 2.$$

$$\text{N như vậy } T = 3^{a_1} + 3^{a_2} + \log_2 \left( \frac{a_2}{a_1} \right) = 3^1 + 3^2 + \log_2 \left( \frac{2}{1} \right) = 13.$$

**Câu 8.** (Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương 2019) Cho  $\int_0^m (3x^2 - 2x + 1) dx = 6$ . Giá trị của tham số  $m$

thuộc khoảng nào sau đây?

A.  $(-1; 2)$ .

B.  $(-\infty; 0)$ .

C.  $(0; 4)$ .

D.  $(-3; 1)$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

$$\text{Ta có: } \int_0^m (3x^2 - 2x + 1) dx = (x^3 - x^2 + x) \Big|_0^m = m^3 - m^2 + m.$$

$$\int_0^m (3x^2 - 2x + 1) dx = 6 \Leftrightarrow m^3 - m^2 + m - 6 = 0 \Leftrightarrow m = 2 \in (0; 4).$$

$$\text{Vậy } m = 2 \in (0; 4).$$



$$\text{Do đó: } f(x) = \begin{cases} \ln \frac{x-2}{x+2} + C_1 & \text{khi } x < -2 \\ \ln \frac{2-x}{x+2} + C_2 & \text{khi } -2 < x < 2 \\ \ln \frac{x-2}{x+2} + C_3 & \text{khi } x > 2 \end{cases}$$

$$f(-3) = \ln 5 + C_1; \quad f(3) = \ln \frac{1}{5} + C_3; \quad f(0) = C_2; \quad f(-1) = \ln 3 + C_2; \quad f(1) = \ln \frac{1}{3} + C_2;$$

$$f(-3) + f(3) = f(-1) + f(1) = 2 \Leftrightarrow C_1 + C_3 = 2C_2 = 2 \Rightarrow \begin{cases} C_1 + C_3 = 2 \\ C_2 = 1 \end{cases}.$$

$$\text{Vậy } f(-4) + f(0) + f(4) = \ln 3 + C_1 + C_2 + \ln \frac{1}{3} + C_3 = C_1 + C_2 + C_3 = 3.$$

**Câu 13.** (Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai - 2018) Biết  $\int_1^4 \sqrt{\frac{1}{4x} + \frac{\sqrt{x+e^x}}{\sqrt{x}e^{2x}}} dx = a + e^b - e^c$  với  $a, b, c$

là các số nguyên. Tính  $T = a + b + c$

A.  $T = -3$ .

B.  $T = 3$ .

C.  $T = -4$ .

D.  $T = -5$ .

**Lời giải**

Ta có  $\frac{1}{4x} + \frac{\sqrt{x+e^x}}{\sqrt{x}e^{2x}} = \left( \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{e^x} \right)^2$  nên

$$\int_1^4 \sqrt{\frac{1}{4x} + \frac{\sqrt{x+e^x}}{\sqrt{x}e^{2x}}} dx = \int_1^4 \left( \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{e^x} \right) dx = \left( \sqrt{x} - e^{-x} \right) \Big|_1^4 = 1 + e^{-1} - e^{-4}.$$

Vậy  $a = 1, b = -1, c = -4$ . Suy ra  $T = -4$ .

**Câu 14.** (Sở Bạc Liêu - 2018) Cho hàm số  $f(x)$  xác định trên  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  thỏa mãn  $f'(x) = \frac{x+1}{x^2}$ ,

$f(-2) = \frac{3}{2}$  và  $f(2) = 2 \ln 2 - \frac{3}{2}$ . Giá trị của biểu thức  $f(-1) + f(4)$  bằng

A.  $\frac{6 \ln 2 - 3}{4}$ .

B.  $\frac{6 \ln 2 + 3}{4}$ .

C.  $\frac{8 \ln 2 + 3}{4}$ .

D.  $\frac{8 \ln 2 - 3}{4}$ .

**Lời giải**

$$\text{Có } f(x) = \int f'(x) dx = \int \frac{x+1}{x^2} dx = \ln x - \frac{1}{x} + C$$

$$\Rightarrow f(x) = \begin{cases} \ln |x| - \frac{1}{x} + C_1 & \text{khi } x < 0 \\ \ln |x| - \frac{1}{x} + C_2 & \text{khi } x > 0 \end{cases}$$

$$\text{Do } f(-2) = \frac{3}{2} \Rightarrow \ln 2 + \frac{1}{2} + C_1 = \frac{3}{2} \Rightarrow C_1 = 1 - \ln 2$$

$$\text{Do } f(2) = 2 \ln 2 - \frac{3}{2} \Rightarrow \ln 2 - \frac{1}{2} + C_2 = 2 \ln 2 - \frac{3}{2} \Rightarrow C_2 = \ln 2 - 1$$

$$\text{Nhu vậy, } f(x) = \begin{cases} \ln|x| - \frac{1}{x} + 1 - \ln 2 & \text{khi } x < 0 \\ \ln|x| - \frac{1}{x} + \ln 2 - 1 & \text{khi } x > 0 \end{cases}$$

$$\text{Vậy } f(-1) + f(4) = (2 - \ln 2) + \left( \ln 4 - \frac{1}{4} + \ln 2 - 1 \right) = \frac{8 \ln 2 + 3}{4}.$$

**Câu 15. (Chuyên Lương Văn Chánh - Phú Yên - 2020)** Cho hàm số  $f(x)$  có  $f(0) = 4$  và

$$f'(x) = 2 \cos^2 x + 1, \forall x \in \mathbb{R} \text{ Khi đó } \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx \text{ bằng.}$$

A.  $\frac{\pi^2 + 16\pi + 16}{16}$ .      B.  $\frac{\pi^2 + 4}{16}$ .      C.  $\frac{\pi^2 + 14\pi}{16}$ .      D.  $\frac{\pi^2 + 16\pi + 4}{16}$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

Ta có

$$\begin{aligned} f(x) &= \int (2 \cos^2 x + 1) dx = \int \left( 2 \left( \frac{1 + \cos 2x}{2} \right) + 1 \right) dx = \int (\cos 2x + 2) dx \\ &= \int \cos 2x dx + \int 2 dx = \frac{\sin 2x}{2} + 2x + C. \end{aligned}$$

$$\text{Lại có } f(0) = 4 \Leftrightarrow C = 4 \Rightarrow f(x) = \frac{\sin 2x}{2} + 2x + 4.$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left( \frac{\sin 2x}{2} + 2x + 4 \right) dx = \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 2x d(2x) + \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2x dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} 4 dx \\ &= \frac{-\cos 2x}{4} \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} + (x^2 + 4x) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi^2 + 16\pi + 4}{16}. \end{aligned}$$

**Câu 16. (Sở Hà Tĩnh - 2020)** Cho hàm số  $f(x)$  có  $f(0) = 0$  và  $f'(x) = \sin^4 x, \forall x \in \mathbb{R}$ . Tích phân

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx \text{ bằng}$$

A.  $\frac{\pi^2 - 6}{18}$ .      B.  $\frac{\pi^2 - 3}{32}$ .      C.  $\frac{3\pi^2 - 16}{64}$ .      D.  $\frac{3\pi^2 - 6}{112}$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Ta có:

$$\begin{aligned} \sin^4 x &= \left( \frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} (1 - 2 \cos 2x + \cos^2 2x) = \frac{1}{4} \left( 1 - 2 \cos 2x + \frac{1 + \cos 4x}{2} \right) \\ &= \frac{1}{8} (\cos 4x - 4 \cos 2x + 3). \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra } f(x) = \int f'(x) dx = \frac{1}{8} \int (\cos 4x - 4 \cos 2x + 3) dx = \frac{1}{32} \sin 4x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{3}{8} x + C.$$

$$\text{Vì } f(0) = 0 \text{ nên } C = 0 \text{ hay } f(x) = \frac{1}{32} \sin 4x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{3}{8} x.$$

$$\begin{aligned} \text{Do đó } \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left( \frac{1}{32} \sin 4x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{3}{8} x \right) dx = \left( -\frac{1}{128} \cos 4x + \frac{1}{8} \cos 2x + \frac{3}{16} x^2 \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \left( -\frac{1}{128} - \frac{1}{8} + \frac{3\pi^2}{64} \right) - \left( -\frac{1}{128} + \frac{1}{8} \right) = \frac{3\pi^2 - 16}{64}. \end{aligned}$$

**Câu 17. (Sở Lạng Sơn 2023)** Cho hàm số  $f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = \frac{1}{(\sin x + 2 \cos x)^2}$  với mọi

$x \in \left[ 0; \frac{\pi}{2} \right]$  và  $f(0) = 0$ . Tích phân  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$  bằng

- A.  $\frac{3\pi + 2 \ln 2}{10}$ .      B.  $\frac{\pi - \ln 2}{5}$ .      C.  $\frac{-\pi + \ln 2}{5}$ .      D.  $\frac{\pi + 4 \ln 2}{20}$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

Ta có:  $f(x) = \int \frac{dx}{(\sin x + 2 \cos x)^2} = \frac{1}{5} \int \frac{dx}{\sin^2(x + \alpha)}$ , với  $\begin{cases} \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}} \end{cases} \Rightarrow \cot \alpha = \frac{1}{2}$ .

Từ đó suy ra:  $f(x) = -\frac{1}{5} \cot(x + \alpha) + C$ , mà  $f(0) = 0 \Rightarrow C = \frac{1}{10}$ .

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = \left( -\frac{1}{5} \ln |\sin(x + \alpha)| + \frac{x}{10} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{1}{5} \ln(\cot \alpha) + \frac{\pi}{20} = \frac{4 \ln 2 + \pi}{20}.$$

### **Dạng 2. Tích phân hàm số hữu tỷ**

Tính  $I = \int_a^b \frac{P(x)}{Q(x)} dx$ ? với  $P(x)$  và  $Q(x)$  là các đa thức không chứa căn.

- Nếu bậc của tử  $P(x) \geq$  bậc mẫu  $Q(x) \xrightarrow{PP}$  chia đa thức.
- Nếu bậc của tử  $P(x) <$  bậc mẫu  $Q(x)$  mà mẫu số **phân tích được thành tích số**  $\xrightarrow{PP}$  đồng nhất thức để đưa thành tổng của các phân số.

Một số trường hợp đồng nhất thức thường gặp:

$$+ \frac{1}{(ax+m)(bx+n)} = \frac{1}{an-bm} \left( \frac{a}{ax+m} - \frac{b}{bx+n} \right) \quad (1)$$

$$+ \frac{mx+n}{(x-a)(x-b)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b} = \frac{(A+B)x - (Ab+Ba)}{(x-a)(x-b)} \Rightarrow \begin{cases} A+B=m \\ Ab+Ba=-n \end{cases}$$

$$+ \frac{1}{(x-m)(ax^2+bx+c)} = \frac{A}{x-m} + \frac{Bx+C}{ax^2+bx+c} \text{ với } \Delta = b^2 - 4ac < 0.$$

$$+ \frac{1}{(x-a)^2(x-b)^2} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{(x-a)^2} + \frac{C}{x-b} + \frac{D}{(x-b)^2}.$$

- Nếu bậc tử  $P(x) <$  bậc mẫu  $Q(x)$  mà **mẫu không phân tích được thành tích số**, ta xét một số trường hợp thường gặp sau:



$$+ I_1 = \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n}, (n \in \mathbb{N}^*) \xrightarrow{PP} x = a \cdot \tan t.$$

$$+ I_2 = \int \frac{dx}{ax^2 + bx + c}, (\Delta < 0) = \int \frac{dx}{a \left[ \left( x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \left( -\frac{\Delta}{4a} \right) \right]}. \text{ Ta sẽ đặt } \longrightarrow x + \frac{b}{2a} = \sqrt{-\frac{\Delta}{4a}} \tan t.$$

$$+ I_3 = \int \frac{px + q}{ax^2 + bx + c} dx \text{ với } \Delta = b^2 - 4ac < 0. \text{ Ta sẽ phân tích:}$$

$$I_3 = \frac{p}{2a} \int \frac{(2ax + b) dx}{\underbrace{ax^2 + bx + c}_A} + \left( q - \frac{b \cdot p}{2a} \right) \int \frac{dx}{\underbrace{ax^2 + bx + c}_{I_2}} \text{ và giải A bằng cách đặt } t = \text{mẫu số.}$$

**Câu 18.** (THPT Quỳnh Lưu 3 Nghệ An 2019) Biết  $\int_1^2 \frac{dx}{(x+1)(2x+1)} = a \ln 2 + b \ln 3 + c \ln 5$ . Khi đó giá trị  $a + b + c$  bằng

A. -3.

B. 2.

C. 1.

D. 0.

**Lời giải**

Ta có:

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{dx}{(x+1)(2x+1)} &= \int_1^2 \left( \frac{2}{2x+1} - \frac{1}{x+1} \right) dx = 2 \int_1^2 \frac{1}{2x+1} dx - \int_1^2 \frac{1}{x+1} dx \\ &= 2 \cdot \frac{1}{2} \ln |2x+1| \Big|_1^2 - \ln |x+1| \Big|_1^2 = \ln(2x+1) \Big|_1^2 - \ln(x+1) \Big|_1^2 = \ln 5 - \ln 3 - (\ln 3 - \ln 2) \\ &= \ln 2 - 2 \ln 3 + \ln 5. \end{aligned}$$

Do đó:  $a = 1, b = -2, c = 1$ . Vậy  $a + b + c = 1 + (-2) + 1 = 0$ .

**Câu 19.** (THPT An Lão Hải Phòng 2019) Biết  $I = \int_{-1}^0 \frac{3x^2 + 5x - 1}{x - 2} dx = a \ln \frac{2}{3} + b$ , ( $a, b \in \mathbb{R}$ ). Khi đó giá trị của  $a + 4b$  bằng

A. 50

B. 60

C. 59

D. 40

**Lời giải**

**Chọn C**

$$\begin{aligned} \text{Ta có } I &= \int_{-1}^0 \frac{3x^2 + 5x - 1}{x - 2} dx = \int_{-1}^0 \left( 3x + 11 + \frac{21}{x - 2} \right) dx = \left( \frac{3}{2} x^2 + 11x + 21 \cdot \ln |x - 2| \right) \Big|_{-1}^0 \\ &= 21 \cdot \ln \frac{2}{3} + \frac{19}{2}. \text{ Suy ra } a = 21, b = \frac{19}{2}. \text{ Vậy } a + 4b = 59 \end{aligned}$$

**Câu 20.** Biết  $\int_0^1 \frac{x^2 - 2}{x + 1} dx = \frac{-1}{m} + n \ln 2$ , với  $m, n$  là các số nguyên. Tính  $m + n$ .

A. S = 1.

B. S = 4.

C. S = -5.

D. S = -1.

**Lời giải**

**Chọn A**

$$\int_0^1 \frac{x^2 - 2}{x + 1} dx = \int_0^1 (x - 1) dx - \int_0^1 \frac{dx}{x + 1} = \frac{(x - 1)^2}{2} \Big|_0^1 - \ln |x + 1| \Big|_0^1 = \frac{-1}{2} - \ln 2$$

$$\Rightarrow m = 2, n = -1 \Rightarrow m + n = 1$$



trị của  $2^{a-3b+c}$  bằng

A. 12

B. 6

C. 1

D. 64

Lời giải

**Chọn D**

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } I &= \int_3^4 \frac{5x-8}{x^2-3x+2} dx = \int_3^4 \frac{5x-8}{(x-1)(x-2)} dx = \int_3^4 \frac{3(x-2)+2(x-1)}{(x-1)(x-2)} dx = \int_3^4 \left( \frac{3}{x-1} + \frac{2}{x-2} \right) dx \\ &= (3 \ln|x-1| + 2 \ln|x-2|) \Big|_3^4 = 3 \ln 3 + 2 \ln 2 - 3 \ln 2 = 3 \ln 3 - \ln 2 + 0 \cdot \ln 5 \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra } \begin{cases} a=3 \\ b=-1 \\ c=0 \end{cases} \Rightarrow 2^{a-3b+c} = 2^6 = 64.$$

**Câu 26.** Biết  $\int_3^5 \frac{x^2+x+1}{x+1} dx = a + \ln \frac{b}{2}$  với  $a, b$  là các số nguyên. Tính  $S = a - 2b$ .

A.  $S = 2$ .

B.  $S = -2$ .

C.  $S = 5$ .

D.  $S = 10$ .

Lời giải

**Chọn A**

$$\int_3^5 \frac{x^2+x+1}{x+1} dx = \int_3^5 \left( x + \frac{1}{x+1} \right) dx = \left( \frac{x^2}{2} + \ln|x+1| \right) \Big|_3^5 = 8 + \ln \frac{3}{2} \Rightarrow \begin{cases} a=8 \\ b=3 \end{cases} \Rightarrow S = a - 2b = 2.$$

**Câu 27.** Biết rằng  $\int_0^1 \frac{1}{x^2+x+1} dx = \frac{\pi\sqrt{a}}{b}$  ( $a, b \in \mathbb{Z}, a < 10$ ). Khi đó  $a+b$  có giá trị bằng

A. 14.

B. 15.

C. 13.

D. 12.

Lời giải

$$\text{Xét } I = \int_0^1 \frac{1}{x^2+x+1} dx = \int_0^1 \frac{1}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} dx.$$

$$\text{Đặt } x + \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \tan t, \text{ với } t \in \left( -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right). \text{ Khi đó } dx = \frac{\sqrt{3}}{2} (1 + \tan^2 t) dt.$$

$$\text{Với } x=0, \text{ ta có } t = \frac{\pi}{6}.$$

$$\text{Với } x=1, \text{ ta có } t = \frac{\pi}{3}.$$

$$\text{Khi đó } I = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} (1 + \tan^2 t)}{\frac{3}{4} (1 + \tan^2 t)} dt = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{2}{\sqrt{3}} dt = \frac{2}{\sqrt{3}} t \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} = \frac{\pi\sqrt{3}}{9}. \text{ Từ đó suy ra } \begin{cases} a=3 \\ b=9 \end{cases} \Rightarrow a+b=12.$$

**Câu 28.** (Đề Thi Công Bằng KHTN 2019) Biết  $\int_0^2 \frac{x^2+5x+2}{x^2+4x+3} dx = a + b \ln 3 + c \ln 5$ , ( $a, b, c \in \mathbb{Q}$ ). Giá trị

của  $abc$  bằng

A. -8.

B. -10.

C. -12.

D. 16.

Lời giải

Ta có:

$$\int_0^2 \frac{x^2 + 5x + 2}{x^2 + 4x + 3} dx = \int_0^2 \left( 1 + \frac{x-1}{(x+1)(x+3)} \right) dx = \int_0^2 \left( 1 - \frac{1}{x+1} + \frac{2}{x+3} \right) dx = (x - \ln|x+1| + 2\ln|x+3|) \Big|_0^2$$

$$= 2 - 3\ln 3 + 2\ln 5.$$

Vậy  $a = 2, b = -3, c = 2$ , do đó  $abc = -12$ .

**Câu 29.** (THPT Nguyễn Trãi - Đà Nẵng - 2018) Giả sử rằng  $\int_{-1}^0 \frac{3x^2 + 5x - 1}{x - 2} dx = a \ln \frac{2}{3} + b$ . Khi đó, giá trị của  $a + 2b$  là

A. 30.

**B.** 60.

C. 50.

D. 40.

**Lời giải**

Ta có:

$$I = \int_{-1}^0 \frac{3x^2 + 5x - 1}{x - 2} dx = \int_{-1}^0 \left( 3x + 11 + \frac{21}{x - 2} \right) dx$$

$$\Rightarrow I = \left[ \frac{3x^2}{2} + 11x + 21 \cdot \ln|x - 2| \right]_{-1}^0 = 21 \cdot \ln 2 + \frac{19}{2} - 21 \cdot \ln 3$$

$$\Rightarrow I = 21 \ln \frac{2}{3} + \frac{19}{2} \Rightarrow \begin{cases} a = 21 \\ b = \frac{19}{2} \end{cases} \Rightarrow a + 2b = 40.$$

**Câu 30.** (Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định -2019) Biết  $\int_1^4 \frac{x^3 + x^2 + 7x + 3}{x^2 - x + 3} dx = \frac{a}{b} + c \ln 5$  với  $a, b, c$  là các số nguyên dương và  $\frac{a}{b}$  là phân số tối giản. Tính  $P = a - b^2 - c^3$ .

A. -5.

**B.** -4.

C. 5.

D. 0.

**Lời giải**

$$\text{Ta có } \int_1^4 \frac{x^3 + x^2 + 7x + 3}{x^2 - x + 3} dx = \int_1^4 \left( x + 2 + \frac{3(2x - 1)}{x^2 - x + 3} \right) dx$$

$$= \left( \frac{1}{2}x^2 + 2x \right) \Big|_1^4 + 3 \int_1^4 \frac{d(x^2 - x + 3)}{x^2 - x + 3} = \frac{27}{2} + 3 \ln|x^2 - x + 3| \Big|_1^4 = \frac{27}{2} + 3 \ln 5.$$

$$\text{Mà } \int_1^4 \frac{x^3 + x^2 + 7x + 3}{x^2 - x + 3} dx = \frac{a}{b} + c \ln 5, \text{ suy ra } a = 27, b = 2, c = 3.$$

$$\text{Vậy } P = a - b^2 - c^3 = -4.$$

**Câu 31.** Cho  $\int_0^1 \frac{4x^2 + 15x + 11}{2x^2 + 5x + 2} dx = a + b \ln 2 + c \ln 3$  với  $a, b, c$  là các số hữu tỷ. Biểu thức  $T = a.c - b$  bằng

A. 4.

**B.** 6.

C.  $-\frac{1}{2}$ .

D.  $\frac{1}{2}$ .

**Lời giải**

Ta có

$$\int_0^1 \frac{4x^2 + 15x + 11}{2x^2 + 5x + 2} dx = \int_0^1 \frac{(4x^2 + 10x + 4) + (5x + 7)}{2x^2 + 5x + 2} dx = \int_0^1 \left( 2 + \frac{5x + 7}{2x^2 + 5x + 2} \right) dx$$

$$= \int_0^1 \left( 2 + \frac{1}{x+2} + \frac{3}{2x+1} \right) dx = \left( 2x + \ln|x+2| + \frac{3}{2} \ln|2x+1| \right) \Big|_0^1 = 2 - \ln 2 + \frac{5}{2} \ln 3$$

Vậy  $a = 2$ ,  $b = -1$ ,  $c = \frac{5}{2}$  nên  $T = 6$ .

**Câu 32. (SGD Bến Tre 2019)** Biết  $\int_0^1 \frac{x^2 - 2}{x+1} dx = \frac{-1}{m} + n \ln 2$ , với  $m, n$  là các số nguyên. Tính  $S = m + n$ .

- A.  $S = -1$ .                      B.  $S = -5$ .                      C.  $S = 1$ .                      D.  $S = 4$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Ta có:  $\int_0^1 \frac{x^2 - 2}{x+1} dx = \int_0^1 \left( x - 1 - \frac{1}{x+1} \right) dx = \left( \frac{x^2}{2} - x - \ln|x+1| \right) \Big|_0^1 = \frac{-1}{2} - \ln 2$ .

Suy ra  $m = 2$ ;  $n = -1$ . Vậy  $S = 1$ .

**Câu 33. (THPT Cẩm Bình 2019)** Cho  $\int_0^1 \frac{1}{x^2 + 3x + 2} dx = a \ln 2 + b \ln 3$ , với  $a, b$  là các số hữu tỷ. Khi đó

$a + b$  bằng

- A. 0.                                  B. 2.                                  C. 1.                                  D. -1.

**Lời giải**

**Chọn C**

Xét  $\int_0^1 \frac{1}{x^2 + 3x + 2} dx = \int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x+2)} dx = \int_0^1 \left( \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \right) dx = \ln \left( \frac{x+1}{x+2} \right) \Big|_0^1 = 2 \ln 2 - \ln 3$ .

Vậy  $a = 2$ ,  $b = -1 \Rightarrow a + b = 1$ .

**Câu 34. (Sở Hà Nam - 2019)** Cho  $\int_0^1 \frac{2x^2 + 3x}{x^2 + 3x + 2} dx = a + b \ln 2 + c \ln 3$  với  $a, b, c$  là các số nguyên. Tổng

$a + b + c$  bằng

- A. 3.                                  B. 2.                                  C. 1.                                  D. -1.

**Lời giải**

**Chọn C**

Ta có:  $\int_0^1 \frac{2x^2 + 3x}{x^2 + 3x + 2} dx = \int_0^1 \left( 2 - \frac{3x+4}{x^2 + 3x + 2} \right) dx$

$$= \int_0^1 \left( 2 - \frac{1}{x+1} - \frac{2}{x+2} \right) dx = \left( 2x - \ln|x+1| - 2 \ln|x+2| \right) \Big|_0^1 = 2 + \ln 2 - 2 \ln 3$$

Suy ra  $a = 2$ ;  $b = 1$ ;  $c = -2$ .

Vậy  $a + b + c = 1$ .

**Câu 35. (Chu Văn An - Hà Nội - 2019)** Cho biết  $\int_0^2 \frac{x-1}{x^2 + 4x + 3} dx = a \ln 5 + b \ln 3$ , với  $a, b \in \mathbb{Q}$ . Tính

$T = a^2 + b^2$  bằng

- A. 13.                                  B. 10.                                  C. 25.                                  D. 5.

**Lời giải**

**Chọn A**

Ta có:  $\frac{x-1}{x^2+4x+3} = \frac{x-1}{(x+1)(x+3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+3}$

$$A = \frac{x-1}{x+3} \Big|_{x=-1} = -1, B = \frac{x-1}{x+1} \Big|_{x=-3} = 2$$

$$\begin{aligned} \int_0^2 \frac{x-1}{x^2+4x+3} dx &= \int_0^2 \left( \frac{-1}{x+1} + \frac{2}{x+3} \right) dx = -\ln|x+1| \Big|_0^2 + 2\ln|x+3| \Big|_0^2 = -\ln 3 + 2\ln 5 - 2\ln 3 \\ &= 2\ln 5 - 3\ln 3 = a \ln 5 + b \ln 3 \\ &\Rightarrow a = 2, b = -3 \Rightarrow T = 13. \end{aligned}$$

**Câu 36. (Chuyên - KHTN - Hà Nội - 2019)** Biết  $\int_0^2 \frac{x^2+5x+2}{x^2+4x+3} dx = a + b \ln 3 + c \ln 5$ , ( $a, b, c \in \mathbb{Q}$ ). Giá trị

của  $abc$  bằng

A. -8.

B. -10.

**C.** -12.

D. 16.

**Lời giải**

**Chọn C**

Ta có:

$$\begin{aligned} \int_0^2 \frac{x^2+5x+2}{x^2+4x+3} dx &= \int_0^2 \left( 1 + \frac{x-1}{x^2+4x+3} \right) dx = \int_0^2 \left( 1 + \frac{-1}{x+1} + \frac{2}{x+3} \right) dx \\ &= \left( x - \ln|x+1| + 2\ln|x+3| \right) \Big|_0^2 = 2 + 2\ln 5 - 3\ln 3 = a + b \ln 3 + c \ln 5. \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -3 \\ c = 2 \end{cases} \Rightarrow a.b.c = -12.$$

**Câu 37. (Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2019)** Biết  $\int_1^4 \frac{x^3+x^2+7x+3}{x^2-x+3} dx = \frac{a}{b} + c \ln 5$  với  $a, b, c$  là

các số nguyên dương và  $\frac{a}{b}$  là phân số tối giản. Tính giá trị của  $P = a - b^2 - c^3$ .

A. -5.

B. -3.

C. 6.

**D.** -4.

**Lời giải**

**Chọn D**

$$\text{Ta có } \int_1^4 \frac{x^3+x^2+7x+3}{x^2-x+3} dx = \int_1^4 \left( x+2 + \frac{3(2x-1)}{x^2-x+3} \right) dx = \left( \frac{x^2}{2} + 2x + 3\ln(x^2-x+3) \right) \Big|_1^4 = \frac{27}{2} + 3\ln 5.$$

$$\text{Vậy } P = a - b^2 - c^3 = -4.$$

**Câu 38. (Bình Phước - 2019)** Cho  $\int_2^3 \frac{dx}{(x+1)(x+2)} = a \ln 2 + b \ln 3 + c \ln 5$  với  $a, b, c$  là các số hữu tỉ. Giá

trị của  $a + b^2 - c^3$  bằng

A. 3.

**B.** 6.

C. 5.

D. 4.

**Lời giải**

**Chọn B**

$$\text{Ta có } \int_2^3 \frac{dx}{(x+1)(x+2)} = \int_2^3 \left( \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \right) dx = \ln \left| \frac{x+1}{x+2} \right| \Big|_2^3 = \ln \frac{4}{5} - \ln \frac{3}{4} = 4 \ln 2 - \ln 3 - \ln 5.$$



$$\begin{aligned} \text{Ta có: } \int_0^1 \frac{2x^2 + 3x + 3}{x^2 + 2x + 1} dx &= \int_0^1 \left( 2 + \frac{1-x}{(x+1)^2} \right) dx = 2 \cdot (1-0) + \int_0^1 \left( \frac{2}{(x+1)^2} - \frac{1}{x+1} \right) dx \\ &= 2 + \left( -\frac{2}{x+1} - \ln|x+1| \right) \Big|_0^1 = 2 + (1 - \ln 2) = 3 - \ln 2. \end{aligned}$$

Do đó  $a = 3$  và  $b = 2$  nên  $P = a^2 + b^2 = 3^2 + 2^2 = 13$ .

**Câu 43.** (THPT Lương Thế Vinh- Kiên Giang-2023) Biết rằng  $\int_1^4 \frac{1}{x^4 + x} dx = a \ln 2 + b \ln 5 + c \ln 13$  với  $a, b, c$  là các số hữu tỷ. Giá trị của biểu thức  $P = a^2 - 4bc$  bằng

A. 0.

B. 6.

C. 4.

**D. 5.**

**Lời giải**

**Chọn D**

$$\begin{aligned} \int_1^4 \frac{1}{x^4 + x} dx &= \int_1^4 \frac{dx}{x(x+1)(x^2 - x + 1)} = \int_1^4 \left( \frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} + \frac{1}{x^2 - x + 1} \right) dx \\ &= \int_1^4 \frac{1}{x} dx + \int_1^4 \frac{1}{x+1} dx + \int_1^4 \frac{1}{x^2 - x + 1} dx \\ &= \ln|x| \Big|_1^4 + \ln|x+1| \Big|_1^4 + \int_1^4 \frac{2x-1}{x^2 - x + 1} dx \\ &= \ln 4 - \ln 1 + \ln 5 - \ln 2 + \int_1^4 \frac{d(x^2 - x + 1)}{x^2 - x + 1} \\ &= \ln 4 - \ln 1 + \ln 5 - \ln 2 + \frac{1}{3} \ln|x^2 - x + 1| \Big|_1^4 \\ &= \ln 4 - \ln 1 + \ln 5 - \ln 2 + \frac{1}{3} (\ln 13 - \ln 2) \\ &= \ln 4 - \ln 1 + \ln 5 - \ln 2 + \frac{1}{3} \ln 13 - \frac{1}{3} \ln 2 \\ &= \ln 4 - \ln 1 + \ln 5 - \ln 2 + \frac{1}{3} \ln 13 - \frac{1}{3} \ln 2 \\ &= \ln 4 - \ln 1 + \ln 5 - \ln 2 + \frac{1}{3} \ln 13 - \frac{1}{3} \ln 2 \end{aligned}$$

Vậy  $a = \frac{7}{3}, b = -\frac{1}{3}, c = -\frac{1}{3} \Rightarrow P = a^2 - 4bc = 5$ .

**Cách 2:**

$$\int_1^4 \frac{1}{x^4 + x} dx = \int_1^4 \frac{x^3 + 1 - x^3}{x(x^3 + 1)} dx = \int_1^4 \left( \frac{1}{x} - \frac{x^2}{x^3 + 1} \right) dx = \ln|x| \Big|_1^4 - \frac{1}{3} \ln|x^3 + 1| \Big|_1^4 = -\frac{1}{3} \ln 13 + \frac{7}{3} \ln 2 - \frac{1}{3} \ln 5$$

Vậy  $a = \frac{7}{3}, b = -\frac{1}{3}, c = -\frac{1}{3} \Rightarrow P = a^2 - 4bc = 5$ .

### **Dạng 3. Tích phân đổi biến**

$$\textcircled{2} \text{ **Tích phân đổi biến:** } \int_a^b [f(x)] \cdot u'(x) \cdot dx = F[u(x)] \Big|_a^b = F[u(b)] - F[u(a)].$$

#### **Các bước tính tích phân đổi biến số**

**Bước 1.** Biến đổi để chọn phép đặt  $t = u(x) \Rightarrow dt = u'(x) \cdot dx$  (quan trọng)

**Bước 2.** Đổi cận:  $\begin{cases} x = b \\ x = a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = u(b) \\ t = u(a) \end{cases}$  (nhớ: **đổi biến phải đổi cận**)



□ **Bước 3.** Đưa về dạng  $I = \int_{u(a)}^{u(b)} f(t).dt$  đơn giản hơn và dễ tính toán.

**Một số phương pháp đổi biến số thường gặp**

**Đổi biến dạng 1.** 
$$I = \int_a^b \frac{f(x)}{g(x)}.dx = \underbrace{\int_a^b h(x).dx}_{I_1} + \underbrace{\int_a^b f(g(x)).\frac{g'(x)}{g(x)}.dx}_{I_2}$$
 với

**Đổi biến dạng 2.**

Nghĩa là nếu gặp tích phân **chứa căn thức** thì có khoảng 80% sẽ đặt  $t =$  căn trừ một số trường hợp ngoại lệ sau:

1/  $I_1 = \int f(\sqrt{a^2 - x^2}).x^{\text{chẵn}}.dx \longrightarrow$  đặt  $x = a.\sin t$  hoặc  $x = a.\cos t$ .

(xuất phát từ công thức  $\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \Rightarrow \begin{cases} \cos^2 x = 1 - \sin^2 x \\ \sin^2 x = 1 - \cos^2 x \end{cases}$ )

2/  $I_2 = \int f(\sqrt{x^2 + a^2}).x^{\text{chẵn}}.dx \longrightarrow$  đặt  $x = a.\tan t$  hoặc  $x = a.\cot t$ .

(mẫu chốt xuất phát từ công thức  $\tan^2 x + 1 = \frac{1}{\cos^2 x}$ )

3/  $I_3 = \int f(\sqrt{x^2 - a^2}).x^{\text{chẵn}}.dx \longrightarrow$  đặt  $x = \frac{a}{\sin t}$  hoặc  $x = \frac{a}{\cos t}$ .

4/  $I_4 = \int f\left(\sqrt{\frac{a \pm x}{a \mp x}}\right)dx \longrightarrow$  đặt  $x = a.\cos 2t$ .

5/  $I_5 = \int \frac{dx}{(a + bx^n)^n \sqrt{a + bx^n}} \longrightarrow$  đặt  $x = \frac{1}{t}$ .

6/  $I_6 = \int R[\sqrt{s_1 ax + b}, \dots, \sqrt{s_k ax + b}]dx \longrightarrow$  đặt  $t^n = ax + b$ .

(trong đó  $n$  là bội số chung nhỏ nhất của  $\{s_1; s_2; \dots; s_k\}$ )

7/  $I_7 = \int \frac{dx}{\sqrt{(ax + b)(cx + d)}} \longrightarrow$  đặt  $t = \sqrt{ax + b} + \sqrt{cx + d}$ .

**Đổi biến dạng 3.** 
$$\int f(\ln x).\frac{1}{x}.dx \longrightarrow t = \ln x \Rightarrow dt = \frac{1}{x}.dx$$

**Đổi biến dạng 4.** 
$$\int f(\sin x).\cos x.dx \longrightarrow t = \sin x \Rightarrow dt = \cos x.dx$$

**Đổi biến dạng 5.**  $\int f(\cos x) \cdot \sin x \cdot dx \longrightarrow t = \cos x \Rightarrow dt = -\sin x \cdot dx$

**Đổi biến dạng 6.**  $\int f(\tan x) \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx \longrightarrow t = \tan x \Rightarrow dt = \frac{dx}{\cos^2 x}$

**Đổi biến dạng 7.**  $\int f(\cot x) \cdot \frac{1}{\sin^2 x} dx \longrightarrow t = \cot x \Rightarrow dt = -\frac{dx}{\sin^2 x}$

**Đổi biến dạng 8.**  $\left[ \int f(\sin x + \cos x) \cdot (\sin x - \cos x) dx \right. \longrightarrow \left. \begin{matrix} t = \sin x + \cos x \\ t = \sin x - \cos x \end{matrix} \right]$

**Đổi biến dạng 9.**  $\left[ \int f(ax^2 + b)^n \cdot x dx \longrightarrow t = ax^2 + b \Rightarrow dt = 2ax dx \right.$   
 $\left. \int f(ax + b)^n \cdot x dx \longrightarrow t = ax + b \Rightarrow dt = adx \right]$

**Câu 44. (Đề Tham Khảo -2019)** Cho  $\int_0^1 \frac{x dx}{(x+2)^2} = a + b \ln 2 + c \ln 3$  với  $a, b, c$  là các số hữu tỷ. Giá trị của

$3a + b + c$  bằng

A. 2

B. 1

C. -2

D. -1

**Lời giải**

**Chọn D**

Đặt  $t = x + 2 \Rightarrow dt = dx$

Đổi cận:  $x = 0 \Rightarrow t = 2; x = 1 \Rightarrow t = 3$

$$\int_0^1 \frac{x dx}{(x+2)^2} = \int_2^3 \frac{(t-2) dt}{t^2} = \int_2^3 \left( \frac{1}{t} - \frac{2}{t^2} \right) dt = \left( \ln |t| + \frac{2}{t} \right) \Big|_2^3 = \ln 3 + \frac{2}{3} - (\ln 2 + 1) = -\frac{1}{3} - \ln 2 + \ln 3$$

Suy ra  $a = -\frac{1}{3}; b = -1; c = 1$

$$3a + b + c = -1 - 1 + 1 = -1.$$

**Câu 45.** Tính  $K = \int_2^3 \frac{x}{x^2 - 1} dx$  bằng

A.  $K = \ln 2.$

**B.**  $K = \frac{1}{2} \ln \frac{8}{3}.$

C.  $K = 2 \ln 2.$

**D.**  $K = \ln \frac{8}{3}.$

**Lời giải**

Đặt  $t = x^2 - 1 \Rightarrow dt = 2x dx \Rightarrow x dx = \frac{dt}{2}$

Với  $x = 2 \Rightarrow t = 3; x = 3 \Rightarrow t = 8$

$$\text{Ta có } K = \frac{1}{2} \int_3^8 \frac{dt}{t} = \frac{1}{2} \ln |t| \Big|_3^8 = \frac{1}{2} \ln \frac{8}{3}.$$

**Câu 46. (Chuyên Long An - 2018)** Cho tích phân  $I = \int_0^1 \frac{x^7}{(1+x^2)^5} dx$ , giả sử đặt  $t = 1 + x^2$ . Tìm mệnh đề

đúng.

$$\text{A. } I = \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{(t-1)^3}{t^5} dt. \quad \text{B. } I = \int_1^3 \frac{(t-1)^3}{t^5} dt.$$

$$\text{C. } I = \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{(t-1)^3}{t^4} dt. \quad \text{D. } I = \frac{3}{2} \int_1^4 \frac{(t-1)^3}{t^4} dt.$$

**Lời giải**

Ta có:  $t = 1 + x^2 \Rightarrow dt = 2x dx$ .

Đổi cận:  $x = 0 \Rightarrow t = 1$ .

$x = 1 \Rightarrow t = 2$ .

$$\Rightarrow I = \int_0^1 \frac{x^7}{(1+x^2)^5} dx = \int_0^1 \frac{x \cdot x^6}{(1+x^2)^5} dx = \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{(t-1)^3}{t^5} dt.$$

**Câu 47. (KTNL Gia Bình Năm 2019)** Có bao nhiêu số thực  $a$  để  $\int_0^1 \frac{x}{a+x^2} dx = 1$ .

A. 2

**B. 1**

C. 0

D. 3

**Lời giải**

**Chọn B**

Điều kiện tích phân tồn tại là  $a + x^2 \neq 0, \forall x \in [0;1] \Rightarrow \begin{cases} a < -1 \\ a > 0 \end{cases}$

Đặt  $t = a + x^2 \Rightarrow dt = 2x dx$ . Khi đó

$$\int_0^1 \frac{x}{a+x^2} dx = \frac{1}{2} \int_a^{1+a} \frac{dt}{t} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+a}{a} \right| = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} 1+a = e^2 a \\ 1+a = -e^2 a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{e^2 - 1} \\ a = \frac{-1}{e^2 + 1} \end{cases}$$

So sánh điều kiện ta được  $a = \frac{1}{e^2 - 1}$ .

**Câu 48. (Nguyễn Huệ - Phú Yên - 2020)** Cho hàm số  $f(x)$  có  $f(1) = 0$  và

$f'(x) = 2019 \cdot 2020 \cdot x(x-1)^{2018}, \forall x \in \mathbb{R}$ . Khi đó  $\int_0^1 f(x) dx$  bằng

A.  $\frac{2}{2021}$ .

B.  $\frac{1}{1011}$ .

**C.  $-\frac{2}{2021}$ .**

D.  $-\frac{1}{1011}$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Cần nhớ:  $\int f'(x) dx = f(x) + C$  và  $\int (ax+b)^\alpha dx = \frac{1}{a} \frac{(ax+b)^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$  ( $\alpha \neq -1$ ).

Ta có  $f(x) = \int f'(x) dx = \int 2019 \cdot 2020 \cdot x(x-1)^{2018} dx = 2019 \cdot 2020 \int x(x-1)^{2018} dx$ .

Đặt  $t = x-1 \Rightarrow dt = dx$  và  $x = t+1$ .

Suy ra  $f(x) = 2019 \cdot 2020 \int (t+1)t^{2018} dt = 2019 \cdot 2020 \int (t^{2019} + t^{2018}) dt$

$$= 2019 \cdot 2020 \left( \frac{t^{2020}}{2020} + \frac{t^{2019}}{2019} \right) + C = 2019t^{2020} + 2020t^{2019} + C.$$

Từ đó  $f(x) = 2019(x-1)^{2020} + 2020(x-1)^{2019} + C$ .

Mà  $f(1) = 0 \Leftrightarrow 2019(1-1)^{2020} + 2020(1-1)^{2019} + C = 0 \Leftrightarrow C = 0$ .

Suy ra  $f(x) = 2019(x-1)^{2020} + 2020(x-1)^{2019}$ .

$$\begin{aligned} \text{Vậy } \int_0^1 f(x) dx &= \int_0^1 [2019(x-1)^{2020} + 2020(x-1)^{2019}] dx = \left[ 2019 \cdot \frac{(x-1)^{2021}}{2021} + 2020 \cdot \frac{(x-1)^{2020}}{2020} \right]_0^1 \\ &= -\left( -\frac{2019}{2021} + 1 \right) = -\frac{2}{2021}. \end{aligned}$$

**Câu 49. (Đề Tham Khảo 2019)** Cho  $\int_0^1 \frac{xdx}{(x+2)^2} = a + b \ln 2 + c \ln 3$  với  $a, b, c$  là các số hữu tỷ. Giá trị của

$3a + b + c$  bằng

A. -2

**B.** -1

C. 2

D. 1

**Lời giải**

**Chọn B**

Đặt  $t = x + 2 \Rightarrow dt = dx$

Đổi cận:  $x = 0 \Rightarrow t = 2$ ;  $x = 1 \Rightarrow t = 3$

$$\int_0^1 \frac{xdx}{(x+2)^2} = \int_2^3 \frac{(t-2)dt}{t^2} = \int_2^3 \left( \frac{1}{t} - \frac{2}{t^2} \right) dt = \left( \ln|t| + \frac{2}{t} \right) \Big|_2^3 = \ln 3 + \frac{2}{3} - (\ln 2 + 1) = -\frac{1}{3} - \ln 2 + \ln 3$$

Suy ra  $a = -\frac{1}{3}$ ;  $b = -1$ ;  $c = 1$

$$3a + b + c = -1 - 1 + 1 = -1.$$

**Câu 50. (Chuyên Vĩnh Phúc 2019)** Cho  $\int 2x(3x-2)^6 dx = A(3x-2)^8 + B(3x-2)^7 + C$  với  $A, B, C \in \mathbb{R}$ .

Tính giá trị của biểu thức  $12A + 7B$ .

A.  $\frac{23}{252}$

**B.**  $\frac{241}{252}$

C.  $\frac{52}{9}$

**D.**  $\frac{7}{9}$

**Lời giải.**

Đặt  $t = 3x - 2 \Rightarrow dt = 3dx \Rightarrow dx = \frac{dt}{3}$ .

Khi đó.

$$\int 2x(3x-2)^6 dx = \frac{2}{3} \int \frac{t+2}{3} t^6 dt = \frac{2}{9} \int (t^7 + 2t^6) dt = \frac{2}{9} \left( \frac{t^8}{8} + \frac{2t^7}{7} \right) + C.$$

$$= \frac{1}{36} (3x-2)^8 + \frac{4}{63} (3x-2)^7 + C.$$

Từ đó ta có  $A = \frac{1}{36}$ ,  $B = \frac{4}{63}$ . Suy ra  $12A + 7B = \frac{7}{9}$ .

**Câu 51. (Chuyên Hà Tĩnh - 2018)** Biết  $\int_0^1 \frac{2x^2 + 3x + 3}{x^2 + 2x + 1} dx = a - \ln b$  với  $a, b$  là các số nguyên dương. Tính

$P = a^2 + b^2$ .

**A.** 13.

**B.** 5.

**C.** 4.

**D.** 10.

**Lời giải**

$$\text{Ta có } I = \int_0^1 \frac{2x^2 + 3x + 3}{x^2 + 2x + 1} dx$$

$$\text{Đặt } t = x + 1 \Rightarrow \begin{cases} dt = dx \\ x = t - 1 \end{cases} \text{ suy ra } \begin{cases} x = 0 \leftrightarrow t = 1 \\ x = 1 \leftrightarrow t = 2 \end{cases}$$



Ta có:  $I = \int_1^2 (x+1)^2 e^{x-\frac{1}{x}} dx = \int_1^2 (x^2 + 2x + 1) e^{x-\frac{1}{x}} dx = \int_1^2 (x^2 + 1) e^{x-\frac{1}{x}} dx + \int_1^2 2xe^{x-\frac{1}{x}} dx$

Xét

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_1^2 (x^2 + 1) e^{x-\frac{1}{x}} dx = \int_1^2 x^2 \cdot e^{x-\frac{1}{x}} \cdot \frac{x^2+1}{x^2} dx = \int_1^2 x^2 \cdot e^{x-\frac{1}{x}} d\left(x - \frac{1}{x}\right) = \int_1^2 x^2 d\left(e^{x-\frac{1}{x}}\right) \\ &= x^2 e^{x-\frac{1}{x}} \Big|_1^2 - \int_1^2 e^{x-\frac{1}{x}} d(x^2) = x^2 e^{x-\frac{1}{x}} \Big|_1^2 - \int_1^2 2xe^{x-\frac{1}{x}} dx \\ \Rightarrow I_1 + \int_1^2 2xe^{x-\frac{1}{x}} dx &= x^2 e^{x-\frac{1}{x}} \Big|_1^2 \Rightarrow I = x^2 e^{x-\frac{1}{x}} \Big|_1^2 = 4e^{\frac{3}{2}} - 1 \end{aligned}$$

Do  $\int_1^2 (x+1)^2 e^{x-\frac{1}{x}} dx = me^q - n$ , trong đó  $m, n, p, q \in \mathbb{Z}^+$  và  $\frac{p}{q}$  là phân số tối giản  $\Rightarrow \begin{cases} m = 4 \\ n = 1 \\ p = 3 \\ q = 2 \end{cases}$

Khi đó,  $T = m + n + p + q = 4 + 1 + 3 + 2 = 10$ .

**Câu 56.** Số điểm cực trị của hàm số  $f(x) = \int_{2x}^{x^2} \frac{2tdt}{1+t^2}$  là

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3


**Lời giải**

**Chọn D**

Ta có  $f(x) = \int_{2x}^{x^2} \frac{2tdt}{1+t^2} = \int_{2x}^{x^2} \frac{d(1+t^2)}{1+t^2} = \ln(1+t^2) \Big|_{2x}^{x^2} = \ln(1+x^4) - \ln(1+4x^2)$ .

$$f'(x) = \frac{4x^3}{1+x^4} - \frac{8x^2}{1+4x^2}; f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{4x^3}{1+x^4} - \frac{8x^2}{1+4x^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm \frac{\sqrt{\sqrt{17}-1}}{2} \end{cases}$$

Trục xét dấu:



Từ đó ta thấy hàm số có 3 điểm cực trị.

**Câu 57. (Chuyên Bắc Giang 2019)** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm trên  $\mathbb{R}$  đồng thời thỏa mãn

$f(0) = f(1) = 5$ . Tính tích phân  $I = \int_0^1 f'(x) e^{f(x)} dx$ .

A.  $I = 10$

B.  $I = -5$

C.  $I = 0$

D.  $I = 5$

**Lời giải**

**Chọn C**

$$I = \int_0^1 f'(x) e^{f(x)} dx = \int_0^1 e^{f(x)} d(f(x)) = e^{f(x)} \Big|_0^1 = e^{f(1)} - e^{f(0)} = e^5 - e^5 = 0.$$



$$= \frac{1}{3} \ln \frac{5}{11} - \frac{1}{3} \ln \frac{1}{4} = \frac{2}{3} \ln 2 + \frac{1}{3} \ln 5 - \frac{1}{3} \ln 11.$$

$$\text{Vậy } a = \frac{2}{3}; b = \frac{1}{3}; c = -\frac{1}{3} \Rightarrow a - b = -c.$$

**Câu 61. (Đề Tham Khảo 2017)** Tính tích phân  $I = \int_1^2 2x\sqrt{x^2-1}dx$  bằng cách đặt  $u = x^2 - 1$ , mệnh đề nào dưới đây đúng?

A.  $I = \int_0^3 \sqrt{u}du$       B.  $I = \frac{1}{2} \int_1^2 \sqrt{u}du$       C.  $I = 2 \int_0^3 \sqrt{u}du$       D.  $I = \int_1^2 \sqrt{u}du$

**Lời giải**

**Chọn A**

$$I = \int_1^2 2x\sqrt{x^2-1}dx$$

đặt  $u = x^2 - 1 \Rightarrow du = 2xdx$ . Đổi cận  $x = 1 \Rightarrow u = 0$ ;  $x = 2 \Rightarrow u = 3$

$$\text{Nên } I = \int_0^3 \sqrt{u}du$$

**Câu 62. (Nguyễn Trãi - Thái Bình - 2020)** Giả sử tích phân  $I = \int_1^5 \frac{1}{1+\sqrt{3x+1}} dx = a + b \ln 3 + c \ln 5$ . Lúc đó

A.  $a + b + c = \frac{5}{3}$ .      B.  $a + b + c = \frac{4}{3}$ .      C.  $a + b + c = \frac{7}{3}$ .      D.  $a + b + c = \frac{8}{3}$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

Đặt  $t = \sqrt{3x+1}$ . Ta có  $t^2 = 3x+1 \Rightarrow dx = \frac{2}{3} t dt$ .

Đổi cận

$x$	1	5
$t$	2	4

$$\text{Ta có } I = \int_1^5 \frac{1}{1+\sqrt{3x+1}} dx = \int_2^4 \frac{1}{1+t} \cdot \frac{2}{3} t dt$$

$$= \frac{2}{3} \int_2^4 \frac{t}{t+1} dt$$

$$= \frac{2}{3} \int_2^4 \left(1 - \frac{1}{t+1}\right) dt = \frac{2}{3} (t - \ln|1+t|) \Big|_2^4$$

$$= \frac{4}{3} + \frac{2}{3} \ln 3 - \frac{2}{3} \ln 5.$$

$$\text{Do đó } a = \frac{4}{3}; b = \frac{2}{3}; c = -\frac{2}{3}.$$

$$\text{Vậy } a + b + c = \frac{4}{3}.$$



**Câu 63. (Liên trường Nghệ An - 2020)** Cho hàm số  $f(x)$  có  $f(2) = 0$  và

$f'(x) = \frac{x+7}{\sqrt{2x-3}}, \forall x \in \left(\frac{3}{2}; +\infty\right)$ . Biết rằng  $\int_4^7 f\left(\frac{x}{2}\right) dx = \frac{a}{b}$  ( $a, b \in \mathbb{Z}, b > 0, \frac{a}{b}$  là phân số tối giản). Khi đó  $a+b$  bằng

A. 250.

**B.** 251.

C. 133.

D. 221.

**Lời giải**

**Chọn B**

$$\begin{aligned} \text{Ta có } f(x) &= \int f'(x) \cdot dx = \int \frac{x+7}{\sqrt{2x-3}} \cdot dx = \int \frac{\frac{1}{2}(2x-3) + \frac{17}{2}}{\sqrt{2x-3}} \cdot dx = \int \left( \frac{1}{2} \sqrt{2x-3} + \frac{17}{2\sqrt{2x-3}} \right) \cdot dx \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\frac{3}{2}} \sqrt{(2x-3)^3} + \frac{17}{2} \cdot \sqrt{2x-3} + C = \frac{1}{6} \sqrt{(2x-3)^3} + \frac{17}{2} \cdot \sqrt{2x-3} + C. \end{aligned}$$

$$\text{Mà } f(2) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{6} \sqrt{(2 \cdot 2 - 3)^3} + \frac{17}{2} \cdot \sqrt{2 \cdot 2 - 3} + C = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{6} + \frac{17}{2} + C = 0 \Leftrightarrow C = -\frac{26}{3}.$$

$$\text{Suy ra } f(x) = \frac{1}{6} \sqrt{(2x-3)^3} + \frac{17}{2} \cdot \sqrt{2x-3} - \frac{26}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{Do đó } \int_4^7 f\left(\frac{x}{2}\right) dx &= \int_4^7 \left[ \frac{1}{6} \sqrt{(x-3)^3} + \frac{17}{2} \cdot \sqrt{x-3} - \frac{26}{3} \right] dx = \left[ \frac{1}{6} \frac{\sqrt{(x-3)^5}}{\frac{5}{2}} + \frac{17}{2} \cdot \frac{\sqrt{(x-3)^3}}{\frac{3}{2}} - \frac{26}{3} x \right]_4^7 \\ &= \left[ \frac{1}{15} \sqrt{(x-3)^5} + \frac{17}{3} \cdot \sqrt{(x-3)^3} - \frac{26}{3} x \right]_4^7 \\ &= \left[ \frac{1}{15} \sqrt{(7-3)^5} + \frac{17}{3} \cdot \sqrt{(7-3)^3} - \frac{26}{3} \cdot 7 \right] - \left[ \frac{1}{15} \sqrt{(4-3)^5} + \frac{17}{3} \cdot \sqrt{(4-3)^3} - \frac{26}{3} \cdot 4 \right] \\ &= \left[ \frac{1}{15} \sqrt{(7-3)^5} + \frac{17}{3} \cdot \sqrt{(7-3)^3} - \frac{26}{3} \cdot 7 \right] - \left[ \frac{1}{15} \sqrt{(4-3)^5} + \frac{17}{3} \cdot \sqrt{(4-3)^3} - \frac{26}{3} \cdot 4 \right] \\ &= \frac{236}{15}. \end{aligned}$$

Suy ra  $a = 236, b = 15$ . Vậy  $a + b = 251$ .

**Câu 64. (Nam Định - 2018)** Biết tích phân  $\int_0^{\ln 6} \frac{e^x}{1 + \sqrt{e^x + 3}} dx = a + b \ln 2 + c \ln 3$ , với  $a, b, c$  là các số nguyên. Tính  $T = a + b + c$ .

A.  $T = -1$ .

**B.**  $T = 0$ .

C.  $T = 2$ .

D.  $T = 1$ .

**Lời giải**

$$\text{Đặt } t = \sqrt{e^x + 3} \Rightarrow t^2 = e^x + 3 \Rightarrow 2tdt = e^x dx.$$

$$\text{Đổi cận } \begin{cases} x = \ln 6 \\ x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = 3 \\ t = 2 \end{cases}.$$

$$\begin{aligned} \text{Suy ra } \int_0^{\ln 6} \frac{e^x}{1 + \sqrt{e^x + 3}} dx &= \int_2^3 \frac{2tdt}{1+t} = \int_2^3 \left( 2 - \frac{2}{1+t} \right) dt = (2t - 2 \ln|t+1|) \Big|_2^3 \\ &= (6 - 2 \ln 4) - (4 - 2 \ln 3) \\ &= 2 - 4 \ln 2 + 2 \ln 3 \Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -4 \\ c = 2 \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy  $T = 0$ .

**Câu 65. (Chuyên Vinh - 2018)** Tích phân  $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{3x+1}}$  bằng

A.  $\frac{4}{3}$ .                      B.  $\frac{3}{2}$ .                      C.  $\frac{1}{3}$ .                      **D.  $\frac{2}{3}$ .**

**Lời giải**

$$\text{Đặt } t = \sqrt{3x+1} \Rightarrow t^2 = 3x+1 \Rightarrow 2tdt = 3dx \Rightarrow \frac{2t}{3} dt = dx$$

$$\text{Đổi cận: } x = 0 \Rightarrow t = 1; x = 1 \Rightarrow t = 2$$

$$\text{Khi đó } \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{3x+1}} = \frac{2}{3} \int_1^2 \frac{1}{t} \cdot t dt = \frac{2}{3} \int_1^2 dt = \frac{2}{3} t \Big|_1^2 = \frac{2}{3}.$$

$$\text{Cách khác: Sử dụng công thức } \int \frac{dx}{\sqrt{ax+b}} = \frac{2}{a} \sqrt{ax+b} + C \text{ thì } \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{3x+1}} = \frac{2}{3} \sqrt{3x+1} \Big|_0^1 = \frac{2}{3}.$$

**Câu 66. (Đề Tham Khảo 2018)** Biết  $\int_1^2 \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x+x\sqrt{x+1}}} dx = \sqrt{a} - \sqrt{b} - c$  với  $a, b, c$  là các số nguyên

dương. Tính  $P = a + b + c$

A.  $P = 18$                       B.  $P = 46$                       C.  $P = 24$                       D.  $P = 12$

**Lời giải**

**Chọn B**

**Cách 1**

$$\int_1^2 \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x+x\sqrt{x+1}}} dx = \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x(x+1)}(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})} = \int_1^2 \frac{\sqrt{x} + \sqrt{x+1}}{\sqrt{x(x+1)}(\sqrt{x} + \sqrt{x+1})^2} dx$$

$$\text{Đặt } t = \sqrt{x+1} + \sqrt{x} \Rightarrow dt = \left( \frac{1}{2\sqrt{x+1}} + \frac{1}{2\sqrt{x}} \right) dx \Leftrightarrow 2dt = \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{\sqrt{x(x+1)}} dx$$

$$\text{Khi đó } I = \int_{1+\sqrt{2}}^{\sqrt{2}+\sqrt{3}} \frac{2}{t^2} dt = \left( \frac{-2}{t} \right) \Big|_{1+\sqrt{2}}^{\sqrt{2}+\sqrt{3}} = -2\sqrt{3} + 4\sqrt{2} - 2 = \sqrt{32} - \sqrt{12} - 2$$

$$\Rightarrow P = a + b + c = 32 + 12 + 2 = 46.$$

**Cách 2**

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x+x\sqrt{x+1}}} dx &= \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x(x+1)}(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})} = \int_1^2 \frac{(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})(\sqrt{x+1} - \sqrt{x})}{\sqrt{x(x+1)}(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})} dx \\ &= \int_1^2 \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{\sqrt{x(x+1)}} dx = \int_1^2 \left( \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x+1}} \right) dx = (2\sqrt{x} - 2\sqrt{x+1}) \Big|_1^2 = 2\sqrt{2} - 2 - 2\sqrt{3} + 2\sqrt{2} = \sqrt{32} - \sqrt{12} - 2 \end{aligned}$$

**Câu 67. (Chuyên Trần Phú Hải Phòng 2019)** Biết  $\int_1^e \frac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln x}} dx = a + b\sqrt{2}$  với  $a, b$  là các số hữu tỷ.

Tính  $S = a + b$ .

- A.  $S = 1$ .                      B.  $S = \frac{1}{2}$ .                      C.  $S = \frac{3}{4}$ .                      **D.  $S = \frac{2}{3}$ .**

**Lời giải**

$$\text{Đặt } \sqrt{1 + \ln x} = t \Rightarrow \ln x = t^2 - 1 \Rightarrow \frac{dx}{x} = 2t dt$$

$$\text{Đổi cận } \begin{cases} x = 1 \rightarrow t = 1 \\ x = e \rightarrow t = \sqrt{2} \end{cases}$$

$$\text{Vậy } \int_1^e \frac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln x}} dx = \int_1^{\sqrt{2}} \frac{(t^2-1)2t dt}{t} = 2 \int_1^{\sqrt{2}} (t^2-1) dt = 2 \left( \frac{t^3}{3} - t \right) \Big|_1^{\sqrt{2}} = \frac{4}{3} - \frac{2}{3}\sqrt{2}$$

$$\text{Suy ra } a = \frac{4}{3}; b = -\frac{2}{3} \Rightarrow S = a + b = \frac{2}{3}$$

**Câu 68. (Gang Thép Thái Nguyên 2019)** Cho tích phân  $I = \int_0^{2\sqrt{2}} \sqrt{16-x^2} dx$  và  $x = 4 \sin t$ . Mệnh đề nào sau đây đúng?

**A.**  $I = 8 \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + \cos 2t) dt$ .    **B.**  $I = 16 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 t dt$ .

**C.**  $I = 8 \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 - \cos 2t) dt$ .    **D.**  $I = -16 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 t dt$ .

**Lời giải**

$$\text{Đặt } x = 4 \sin t \Rightarrow dx = 4 \cos t dt.$$

$$\text{Đổi cận: } x = 0 \Rightarrow t = 0; x = 2\sqrt{2} \Rightarrow t = \frac{\pi}{4}.$$

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{16 - 16 \sin^2 t} \cdot 4 \cos t dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} 4 |\cos t| \cdot 4 \cos t dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} 4 |\cos t| \cdot 4 \cos t dt = 16 \int_0^{\frac{\pi}{4}} |\cos t| \cdot \cos t dt.$$

$$\text{Mà vì } t \in \left(0; \frac{\pi}{4}\right) \text{ thì } \cos t > 0 \text{ nên khi đó } I = 16 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 t dt = 8 \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + \cos 2t) dt.$$

**Câu 69.** Biết  $\int_1^5 \frac{1}{1+\sqrt{3x+1}} dx = a + b \ln 3 + c \ln 5$  ( $a, b, c \in \mathbb{Q}$ ). Giá trị của  $a + b + c$  bằng

- A.  $\frac{7}{3}$ .                      B.  $\frac{5}{3}$ .                      C.  $\frac{8}{3}$ .                      **D.  $\frac{4}{3}$ .**

**Lời giải**

$$\text{Đặt } t = \sqrt{3x+1} \Rightarrow t^2 = 3x+1 \Rightarrow 2t dt = 3 dx \Rightarrow dx = \frac{2}{3} t dt$$

$$\text{Đổi cận: } x = 1 \Rightarrow t = 2; x = 5 \Rightarrow t = 4$$

$$\int_1^5 \frac{1}{1+\sqrt{3x+1}} dx = \frac{2}{3} \int_2^4 \frac{t}{1+t} dt = \frac{2}{3} \int_2^4 \left(1 - \frac{1}{1+t}\right) dt = \frac{2}{3} (t - \ln|t+1|) \Big|_2^4 = \frac{4}{3} - \frac{2}{3} \ln 5 + \frac{2}{3} \ln 3.$$

$$\Rightarrow a = \frac{4}{3}, b = \frac{2}{3}, c = -\frac{2}{3} \Rightarrow a+b+c = \frac{4}{3}.$$

**Câu 70.** Cho  $\int_{\frac{1}{2}}^1 \sqrt{\frac{x}{x^3+1}} dx = \frac{1}{a} \ln\left(\frac{b}{c} + \sqrt{d}\right)$ , với  $a, b, c, d$  là các số nguyên dương và  $\frac{b}{c}$  tối giản. Giá trị

của  $a+b+c+d$  bằng

A. 12

**B.** 10

C. 18

D. 15

**Lời giải**

**Chọn B**

$$I = \int_{\frac{1}{2}}^1 \sqrt{\frac{x}{x^3+1}} dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 \sqrt{\frac{x}{x^3\left(1+\frac{1}{x^3}\right)}} dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\frac{1}{2}x \cdot \sqrt{1+\left(\frac{1}{x}\right)^3}} dx$$

$$\bullet \text{ Đặt } t = \frac{1}{x} \Rightarrow x = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2} dt$$

$$\text{Đổi cận: } x = \frac{1}{2} \Rightarrow t = 2; x = 1 \Rightarrow t = 1$$

$$\text{Khi đó: } I = \int_2^1 \frac{t}{\sqrt{1+t^3}} \left(-\frac{1}{t^2} dt\right) = \int_1^2 \frac{t^2 dt}{t^3 \cdot \sqrt{1+t^3}}$$

$$\bullet \text{ Đặt } u = \sqrt{1+t^3} \Rightarrow u^2 = 1+t^3 \Rightarrow t^3 = u^2 - 1 \Rightarrow 3t^2 dt = 2u du \Rightarrow t^2 dt = \frac{2u du}{3}$$

$$\text{Đổi cận: } t = 1 \Rightarrow u = \sqrt{2}; t = 2 \Rightarrow u = 3$$

$$\text{Ta có: } I = \int_{\sqrt{2}}^3 \frac{\frac{2u du}{3}}{(u^2-1)u} = \frac{2}{3} \int_{\sqrt{2}}^3 \frac{du}{u^2-1} = \frac{1}{3} \ln \left| \frac{u-1}{u+1} \right| \Big|_{\sqrt{2}}^3 = \frac{1}{3} \ln \left( \frac{3}{2} + \sqrt{2} \right)$$

Suy ra  $a = 3, b = 3, c = 2, d = 2$ . Vậy  $a+b+c+d = 10$ .

**Câu 71.** (Lê Quý Đôn - Quảng Trị - 2018) Cho biết  $\int_0^{\sqrt{7}} \frac{x^3}{\sqrt[3]{1+x^2}} dx = \frac{m}{n}$  với  $\frac{m}{n}$  là một phân số tối giản.

Tính  $m-7n$

A. 0.

**B.** 1.

C. 2.

D. 91.

**Lời giải**

$$\text{Đặt } t = \sqrt[3]{1+x^2} \Rightarrow t^3 = 1+x^2 \Rightarrow 3t^2 dt = 2x dx \Rightarrow x dx = \frac{3t^2 dt}{2}.$$

Đổi cận:

$x$	0	$\sqrt{7}$
$t$	1	2

$$\int_0^{\sqrt{7}} \frac{x^3}{\sqrt[3]{1+x^2}} dx = \int_1^2 \frac{t^3-1}{t} \cdot \frac{3t^2}{2} dt = \frac{3}{2} \int_1^2 (t^4-t) dt = \frac{3}{2} \cdot \left( \frac{t^5}{5} - \frac{t^2}{2} \right) \Big|_1^2 = \frac{141}{20}.$$

$$\Rightarrow m-7n = 141 - 7 \cdot 20 = 1.$$

**Câu 72. (Chuyên Đại Học Vinh 2019)** Biết rằng  $\int_0^1 \frac{dx}{3x+5\sqrt{3x+1}+7} = a \ln 2 + b \ln 3 + c \ln 5$ , với  $a, b, c$  là

các số hữu tỉ. Giá trị của  $a+b+c$  bằng

- A.**  $-\frac{10}{3}$                       **B.**  $-\frac{5}{3}$                       **C.**  $\frac{10}{3}$                       **D.**  $\frac{5}{3}$

**Lời giải**

**Chọn A**

$$A = \int_0^1 \frac{dx}{3x+5\sqrt{3x+1}+7}$$

$$\text{Đặt } t = \sqrt{3x+1} \Rightarrow t^2 = 3x+1 \Rightarrow 2tdt = 3dx$$

$$\text{Đổi cận: } x=0 \Rightarrow t=1; x=1 \Rightarrow t=2$$

$$\begin{aligned} A &= \int_1^2 \frac{\frac{2}{3}tdt}{t^2+5t+6} = \frac{2}{3} \int_1^2 \frac{t}{(t+2)(t+3)} dt = \frac{2}{3} \int_1^2 \left( \frac{-2}{t+2} + \frac{3}{t+3} \right) dt = \frac{2}{3} (-2 \ln|t+2| + 3 \ln|t+3|) \Big|_1^2 \\ &= \frac{2}{3} (-2 \ln 4 + 3 \ln 5 + 2 \ln 3 - 3 \ln 4) = \frac{2}{3} (-10 \ln 2 + 2 \ln 3 + 3 \ln 5) = -\frac{20}{3} \ln 2 + \frac{4}{3} \ln 3 + 2 \ln 5 \end{aligned}$$

$$\text{Vậy: } a+b+c = -\frac{20}{3} + \frac{4}{3} + 2 = -\frac{10}{3}.$$

**Câu 73.** Biết  $\int_1^e \frac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln x}} dx = a + b\sqrt{2}$  với  $a, b$  là các số hữu tỷ. Tính  $S = a + b$ .

- A.**  $S = 1$ .                      **B.**  $S = \frac{1}{2}$ .                      **C.**  $S = \frac{3}{4}$ .                      **D.**  $S = \frac{2}{3}$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

$$\text{Đặt } \sqrt{1+\ln x} = t \Rightarrow \ln x = t^2 - 1 \Rightarrow \frac{dx}{x} = 2tdt$$

$$\text{Đổi cận } \begin{cases} x=1 \rightarrow t=1 \\ x=e \rightarrow t=\sqrt{2} \end{cases}$$

$$\text{Vậy } \int_1^e \frac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln x}} dx = \int_1^{\sqrt{2}} \frac{(t^2-1)2tdt}{t} = 2 \int_1^{\sqrt{2}} (t^2-1) dt = 2 \left( \frac{t^3}{3} - t \right) \Big|_1^{\sqrt{2}} = \frac{4}{3} - \frac{2}{3}\sqrt{2}$$

$$\text{Suy ra } a = \frac{4}{3}; b = -\frac{2}{3} \Rightarrow S = a + b = \frac{2}{3}$$

**Câu 74. (THPT Ngô Sĩ Liên Bắc Giang 2019)** Cho  $\int_0^3 \frac{x}{4+2\sqrt{x+1}} dx = \frac{a}{3} + b \ln 2 + c \ln 3$  với  $a, b, c$  là các số nguyên. Giá trị  $a+b+c$  bằng:

- A.** 9                      **B.** 2                      **C.** 1                      **D.** 7

**Lời giải**

**Chọn C**

$$\int_0^3 \frac{x}{4+2\sqrt{x+1}} dx =$$

$$t = 4 + 2\sqrt{x+1} \Rightarrow (t-4)^2 = 4(x+1)$$

$$\Rightarrow 2(t-4)dt = 4dx$$

$$x=0 \Rightarrow t=6$$

$$x=3 \Rightarrow t=8$$

$$I = \int_6^8 \frac{t^2 - 8t + 16 - 4}{8t} \cdot (t-4)dt = \int_6^8 \frac{t^3 - 12t^2 + 44t - 48}{8t} dt = \int_6^8 \left( \frac{t^2}{8} - \frac{3t}{2} + \frac{11}{2} - \frac{6}{t} \right) dt$$

$$= \left( \frac{t^3}{24} - \frac{3t^2}{4} + \frac{11}{2}t - 6\ln|t| \right) \Big|_6^8 = \frac{7}{3} - 12\ln 2 + 6\ln 3$$

$$\Rightarrow a+b+c=1$$

**Câu 75. (THPT Ba Đình 2019)** Cho  $I = \int_0^3 \frac{x}{4+2\sqrt{x+1}} dx = \frac{a}{d} + b \ln 2 + c \ln d$ , với  $a, b, c, d$  là các số

nguyên và  $\frac{a}{d}$  là phân số tối giản. Giá trị của  $a+b+c+d$  bằng

A. 16.

**B.** 4.

C. 28.

D. -2.

**Lời giải**

$$\text{Đặt } t = \sqrt{x+1} \Rightarrow x = t^2 - 1$$

$$\Rightarrow dx = 2tdt$$

$$\text{Đổi cận: } x=0 \rightarrow t=1; \quad x=3 \rightarrow t=2$$

$$I = \int_1^2 \frac{t^2 - 1}{4 + 2t} \cdot 2t dt = \int_1^2 \left( t^2 - 2t + 3 - \frac{6}{t+2} \right) dt = \left( \frac{t^3}{3} - t^2 + 3t - 6\ln|t+2| \right) \Big|_1^2 = \frac{7}{3} - 12\ln 2 + 6\ln 3.$$

Suy ra  $a=7, b=-12, c=6, d=3$ . Do đó  $a+b+c+d=4$ .

**Câu 76.** Tính  $I = \int_0^a \frac{x^3 + x}{\sqrt{x^2 + 1}} dx$ .

A.  $I = (a^2 + 1)\sqrt{a^2 + 1} - 1$ .

**B.**  $I = \frac{1}{3} \left[ (a^2 + 1)\sqrt{a^2 + 1} - 1 \right]$ .

C.  $I = \frac{1}{3} \left[ (a^2 + 1)\sqrt{a^2 + 1} + 1 \right]$ .

D.  $I = (a^2 + 1)\sqrt{a^2 + 1} + 1$ .

**Lời giải**

$$\text{Ta có } I = \int_0^a \frac{x^3 + x}{\sqrt{x^2 + 1}} dx = \int_0^a \frac{x(x^2 + 1)}{\sqrt{x^2 + 1}} dx = \int_0^a x\sqrt{x^2 + 1} dx.$$

$$\text{Đặt } u = \sqrt{x^2 + 1} \Rightarrow u^2 = x^2 + 1 \Rightarrow udu = xdx.$$

$$\text{Đổi cận: } x=0 \Rightarrow u=1, \quad x=a \Rightarrow u=\sqrt{a^2 + 1}.$$

$$\text{Vậy } I = \int_1^{\sqrt{a^2 + 1}} u^2 du = \frac{u^3}{3} \Big|_1^{\sqrt{a^2 + 1}} = \frac{1}{3} \left[ (a^2 + 1)\sqrt{a^2 + 1} - 1 \right].$$

**Câu 77. (THCS - THPT Nguyễn Khuyến - 2018)** Giá trị của tích phân  $\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{x}{1-x}} dx$  bằng tích phân nào dưới đây?

**A.**  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} 2 \sin^2 y \, dy$ .      **B.**  $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sin^2 x}{\cos x} \, dx$ .      **C.**  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^2 y}{\cos y} \, dy$ .      **D.**  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin^2 y \, dy$ .

**Lời giải**

Đặt  $x = \sin^2 y$  ta có  $dx = d(\sin^2 y) \Leftrightarrow dx = 2 \sin y \cdot \cos y \, dy$

Khi  $x = 0 \Rightarrow y = 0$  và  $x = \frac{1}{2} \Rightarrow y = \frac{\pi}{4}$ .

Suy ra  $\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{x}{1-x}} \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin y}{\cos y} \cdot 2 \sin y \cos y \, dy = \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2 \sin^2 y \, dy$ .

**Câu 78. (Chuyên Thăng Long - Đà Lạt - 2018)** Biết  $\int_{\sqrt{3}}^{2\sqrt{2}} \frac{x}{\sqrt{x^2+1+x^2-1}} \, dx = \frac{b}{a} \ln 5 - c \ln 2$  với  $a, b, c$  là

các số nguyên và phân số  $\frac{a}{b}$  là tối giản. Tính  $P = 3a + 2b + c$ .

**A.** 11.      **B.** 12.      **C.** 14.      **D.** 13.

**Lời giải**

Đặt  $t = \sqrt{x^2+1} \Rightarrow t^2 = x^2+1 \Rightarrow x \, dx = t \, dt$

Đổi cận:  $x = \sqrt{3} \Rightarrow t = 2, x = 2\sqrt{2} \Rightarrow t = 3$ .

Khi đó  $\int_{\sqrt{3}}^{2\sqrt{2}} \frac{x}{\sqrt{x^2+1+x^2-1}} \, dx = \int_2^3 \frac{t \, dt}{t^2+t-2} = \left( \frac{1}{3} \ln |t-1| + \frac{2}{3} \ln |t+2| \right) \Big|_2^3$   
 $= \left( \frac{1}{3} \ln 2 + \frac{2}{3} \ln 5 \right) - \left( \frac{2}{3} \ln 4 \right) = \frac{2}{3} \ln 5 - \ln 2$ .

Vậy  $a = 3, b = 2, c = 1 \Rightarrow 3a + 2b + c = 14$ .

**Câu 79. (Bình Giang - Hải Dương - 2018)** Cho tích phân

$\int_1^4 \frac{\sqrt{25-x^2}}{x} \, dx = a + b\sqrt{6} + c \ln \left( \frac{5\sqrt{6}+12}{5\sqrt{6}-12} \right) + d \ln 2$  với  $a, b, c, d$  là các số hữu tỉ. Tính tổng  $a + b + c + d$ .

**A.**  $-\frac{1}{3}$ .      **B.**  $-\frac{3}{25}$ .      **C.**  $-\frac{3}{2}$ .      **D.**  $-\frac{3}{20}$ .

**Lời giải**

Đặt  $t = \sqrt{25-x^2} \Rightarrow t^2 = 25-x^2 \Rightarrow x \, dx = -t \, dt$

Khi đó:

$I = \int_1^4 \frac{\sqrt{25-x^2}}{x} \, dx = \int_3^{2\sqrt{6}} \frac{t^2}{25-t^2} \, dt = \int_3^{2\sqrt{6}} \left( -1 + \frac{25}{25-t^2} \right) \, dt = \int_3^{2\sqrt{6}} \left( -1 + \frac{5}{2(5-t)} + \frac{5}{2(5+t)} \right) \, dt$   
 $= \left( -t + \frac{5}{2} \ln \left| \frac{5+t}{5-t} \right| \right) \Big|_3^{2\sqrt{6}} = 3 - 2\sqrt{6} + \frac{5}{2} \ln \left( \frac{5\sqrt{6}+12}{5\sqrt{6}-12} \right) - 5 \ln 2$ .

Vậy  $a = 3, b = -2, c = \frac{5}{2}, d = -5 \Rightarrow a + b + c + d = -\frac{3}{2}$ .

**Câu 80. (Sở Hưng Yên - 2018)** Cho tích phân  $I = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}}$  nếu đổi biến số  $x = 2 \sin t, t \in \left( -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right)$  thì ta

được.

$$\text{A. } I = \int_0^{\frac{\pi}{3}} dt.$$

$$\text{B. } I = \int_0^{\frac{\pi}{6}} dt.$$

$$\text{C. } I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} t dt.$$

$$\text{D. } I = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{dt}{t}.$$

**Lời giải**

$$x = 2 \sin t \Rightarrow dx = 2 \cos t dt.$$

$$\text{Với } x = 0 \Rightarrow t = 0; x = 1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{6}.$$

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{2 \cos t dt}{2\sqrt{1 - \sin^2 t}} = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos t dt}{\cos t} = \int_0^{\frac{\pi}{6}} dt.$$

**Câu 81. (THPT Phú Lương - Thái Nguyên - 2018)** Biết  $\int_0^1 \frac{x^3}{x + \sqrt{1+x^2}} dx = \frac{a\sqrt{b} + c}{15}$  với  $a, b, c$  là các số nguyên và  $b \geq 0$ . Tính  $P = a + b^2 - c$ .

$$\text{A. } P = 3.$$

$$\text{B. } P = 7.$$

$$\text{C. } P = -7.$$

$$\text{D. } P = 5.$$

**Lời giải.**

$$I = \int_0^1 \frac{x^3}{x + \sqrt{1+x^2}} dx = \int_0^1 x^3 (\sqrt{1+x^2} - x) dx = \int_0^1 x^3 \sqrt{1+x^2} dx - \int_0^1 x^4 dx = A - \frac{1}{5}$$

$$+ \text{Tính A: Đặt } t = \sqrt{1+x^2} \Rightarrow t dt = x dx$$

$$A = \int_1^{\sqrt{2}} (t^2 - 1) \cdot t^2 dt = \int_1^{\sqrt{2}} (t^4 - t^2) dt = \left( \frac{t^5}{5} - \frac{t^3}{3} \right) \Big|_1^{\sqrt{2}} = \frac{2 + 2\sqrt{2}}{15}$$

$$I = \frac{-1 + 2\sqrt{2}}{15} \Rightarrow a = 2; b = 2; c = -1$$

$$P = a + b^2 - c = 7$$

**Câu 82.** Cho  $n$  là số nguyên dương khác 0, hãy tính tích phân  $I = \int_0^1 (1-x^2)^n x dx$  theo  $n$ .

$$\text{A. } I = \frac{1}{2n+2}.$$

$$\text{B. } I = \frac{1}{2n}.$$

$$\text{C. } I = \frac{1}{2n-1}.$$

$$\text{D. } I = \frac{1}{2n+1}.$$

**Lời giải**

Với  $n \in \mathbb{N}^*$ , khi đó:

$$\text{Đặt } t = 1 - x^2 \Rightarrow dt = -2x dx \Rightarrow x dx = -\frac{1}{2} dt$$

$$\text{Đổi cận: } x = 0 \rightarrow t = 1; x = 1 \rightarrow t = 0$$

$$\text{Khi đó } I = -\frac{1}{2} \int_1^0 t^n dt = \frac{1}{2} \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{t^{n+1}}{n+1} \Big|_0^1 = \frac{1}{2n+2}$$

$$\text{Cách 2: Ta có } d(1-x^2) = -2x dx \rightarrow -\frac{1}{2} d(1-x^2) = x dx$$

$$I = \int_0^1 (1-x^2)^n x dx = -\frac{1}{2} \int_1^0 (1-x^2)^n d(1-x^2) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{(1-x^2)^{n+1}}{n+1} \Big|_1^0 = \frac{1}{2n+2}$$



**Câu 83. (Chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên 2019)** Giả sử  $I = \int_1^{64} \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} = a \ln \frac{2}{3} + b$  với  $a, b$  là số nguyên.

Khi đó giá trị  $a - b$  là

A. -17.

B. 5.

C. -5.

D. 17.

**Lời giải**

$$\text{Đặt } t = \sqrt[6]{x} \Rightarrow x = t^6 \Rightarrow dx = 6.t^5 dt.$$

$$\text{Đổi cận: } x=1 \Rightarrow t=1; \quad x=64 \Rightarrow t=2.$$

$$\text{Suy ra } I = \int_1^2 \frac{6t^5}{t^3 + t^2} dt = 6 \int_1^2 \frac{t^3}{t+1} dt = 6 \int_1^2 \left( t^2 - t + 1 - \frac{1}{t+1} \right) dt$$

$$= 6 \int_1^2 (t^2 - t + 1) dt - 6 \int_1^2 \frac{1}{t+1} d(t+1)$$

$$= 6 \left( \frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} + t \right) \Big|_1^2 - 6 \ln |t+1| \Big|_1^2 = 6 \left( \frac{8}{3} - \frac{5}{6} \right) - 6(\ln 3 - \ln 2) = 11 - 6 \ln \frac{3}{2} = 6 \ln \frac{2}{3} + 11.$$

$$\text{Từ đó suy ra } \begin{cases} a=6 \\ b=11 \end{cases} \Rightarrow a-b = -5.$$

**Câu 84. (Tiên Du - Bắc Ninh - 2020)** Cho hàm số  $f(x)$  có  $f(\sqrt{2}) = -2$  và

$$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{6-x^2}}, \forall x \in (-\sqrt{6}; \sqrt{6}). \text{ Khi đó } \int_0^{\sqrt{3}} f(x).dx \text{ bằng}$$

A.  $-\frac{3\pi}{4}$ .

B.  $\frac{3\pi+6}{4}$ .

C.  $\frac{\pi+2}{4}$ .

D.  $-\frac{3\pi+6}{4}$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

$$\text{Ta có } \forall x \in (-\sqrt{6}; \sqrt{6}) \Rightarrow f(x) = \int f'(x).dx = \int \frac{x}{\sqrt{6-x^2}}.dx$$

$$= -\frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{6-x^2}}.d(6-x^2) = -\frac{1}{2}.2\sqrt{6-x^2} + C.$$

$$\text{Mà } f(\sqrt{2}) = -2 \Leftrightarrow -\sqrt{6-2} + C = -2 \Leftrightarrow C = 0.$$

$$\text{Suy ra } f(x) = -\sqrt{6-x^2}.$$

$$\text{Do đó } I = \int_0^{\sqrt{3}} f(x).dx = -\int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{6-x^2}.dx.$$

$$\text{Đặt } x = \sqrt{6} \sin t, t \in \left[ -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right] \Rightarrow dx = \sqrt{6} \cos t dt.$$

$$\text{Đổi cận } x=0 \Rightarrow t=0; \quad x=\sqrt{3} \Rightarrow t = \frac{\pi}{4}.$$

$$\begin{aligned} \text{Suy ra } I &= -\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{6-6\sin^2 t} \cdot \sqrt{6} \cdot \cos t \cdot dt = -6 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 t \cdot dt = -3 \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos 2t + 1) \cdot dt = -3 \left( \frac{1}{2} \sin 2t + t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= -3 \left( \frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \right) = -\frac{3\pi + 6}{4}. \end{aligned}$$

**Câu 85. (Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - 2018)** Biết  $\int_1^2 \frac{x}{3x + \sqrt{9x^2 - 1}} dx = a + b\sqrt{2} + c\sqrt{35}$  với  $a, b, c$  là các số hữu tỷ, tính  $P = a + 2b + c - 7$ .

- A.**  $-\frac{1}{9}$ .                      **B.**  $\frac{86}{27}$ .                      **C.**  $-2$ .                      **D.**  $\frac{67}{27}$ .

**Lời giải**

Ta có

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{x}{3x + \sqrt{9x^2 - 1}} dx &= \int_1^2 x(3x + \sqrt{9x^2 - 1}) dx = \int_1^2 (3x^2 - x\sqrt{9x^2 - 1}) dx = \int_1^2 3x^2 dx - \int_1^2 x\sqrt{9x^2 - 1} dx \\ &= x^3 \Big|_1^2 + \int_1^2 x\sqrt{9x^2 - 1} dx = 7 + \int_1^2 x\sqrt{9x^2 - 1} dx. \end{aligned}$$

Tính  $\int_1^2 x\sqrt{9x^2 - 1} dx$ .

Đặt  $\sqrt{9x^2 - 1} = t \Rightarrow 9x^2 - 1 = t^2 \Rightarrow x dx = \frac{t dt}{9}$ .

Khi  $x = 1$  thì  $t = 2\sqrt{2}$ ; khi  $x = 2$  thì  $t = \sqrt{35}$ .

Khi đó  $\int_1^2 x\sqrt{9x^2 - 1} dx = \int_{2\sqrt{2}}^{\sqrt{35}} t \frac{t dt}{9} = \frac{t^3}{27} \Big|_{2\sqrt{2}}^{\sqrt{35}} = \frac{35}{27} \sqrt{35} - \frac{16}{27} \sqrt{2}$ .

Vậy  $\int_1^2 \frac{x}{3x + \sqrt{9x^2 - 1}} dx = 7 - \frac{35}{27} \sqrt{35} + \frac{16}{27} \sqrt{2} \Rightarrow a = 7, b = \frac{16}{27}, c = -\frac{35}{27}$ .

Vậy  $P = a + 2b + c - 7 = 7 + \frac{32}{27} - \frac{35}{27} - 7 = -\frac{1}{9}$ .

**Câu 86. (THPT Phan Chu Trinh - Đắk Lắk - 2018)** Biết  $\int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{x+1} + (x+1)\sqrt{x}} = \sqrt{a} - \sqrt{b} - \sqrt{c}$  với  $a, b, c$  là các số nguyên dương. Tính  $P = a + b + c$ .

- A.**  $P = 44$ .                      **B.**  $P = 42$ .                      **C.**  $P = 46$ .                      **D.**  $P = 48$ .

**Lời giải**

Đặt  $I = \int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{x+1} + (x+1)\sqrt{x}} = \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x(x+1)}(\sqrt{x} + \sqrt{x+1})}$ .

Đặt  $t = \sqrt{x} + \sqrt{x+1} \Rightarrow dt = \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{2\sqrt{x(x+1)}} dx \Leftrightarrow \frac{dx}{\sqrt{x(x+1)}} = 2 \frac{dt}{t}$ .

Khi  $x = 1$  thì  $t = \sqrt{2} + 1$ , khi  $x = 2$  thì  $t = \sqrt{3} + \sqrt{2}$ .

$$I = \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x(x+1)}(\sqrt{x} + \sqrt{x+1})} = 2 \int_{\sqrt{2}+1}^{\sqrt{3}+\sqrt{2}} \frac{dt}{t^2} = -2 \left[ \frac{1}{t} \right]_{\sqrt{2}+1}^{\sqrt{3}+\sqrt{2}} = -2 \left( \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}+1} \right) = 4\sqrt{2} - 2\sqrt{3} - 2$$

$$= \sqrt{32} - \sqrt{12} - \sqrt{4} \Rightarrow a = 32, b = 12, c = 4$$

Vậy  $P = a + b + c = 48$

**Câu 87. (Sở Phú Thọ - 2018)** Biết  $\int_0^4 \frac{\sqrt{2x+1} dx}{2x+3\sqrt{2x+1}+3} = a + b \ln 2 + c \ln \frac{5}{3}$  ( $a, b, c \in \mathbb{Z}$ ). Tính  $T = 2a + b + c$ .

- A.  $T = 4$ .                      B.  $T = 2$ .                      C.  $T = 1$ .                      D.  $T = 3$ .

**Lời giải**

$$I = \int_0^4 \frac{\sqrt{2x+1} dx}{2x+3\sqrt{2x+1}+3} = \int_0^4 \frac{\sqrt{2x+1} dx}{(\sqrt{2x+1}+1)(\sqrt{2x+1}+2)} = \int_0^4 \frac{2(\sqrt{2x+1}+1) - (\sqrt{2x+1}+2) dx}{(\sqrt{2x+1}+1)(\sqrt{2x+1}+2)}$$

$$= \int_0^4 \frac{2 dx}{(\sqrt{2x+1}+2)} - \int_0^4 \frac{dx}{(\sqrt{2x+1}+1)}$$

Đặt  $u = \sqrt{2x+1} \Rightarrow u du = dx$ . Với  $x = 0 \Rightarrow u = 1$ , với  $x = 4 \Rightarrow u = 3$ .

$$\text{Suy ra } I = \int_1^3 \frac{2udu}{u+2} - \int_1^3 \frac{udu}{u+1} = \int_1^3 \left( 2 - \frac{4}{u+2} \right) du - \int_1^3 \left( 1 - \frac{1}{u+1} \right) du$$

$$= \left( u - 4 \ln|u+2| + \ln|u+1| \right) \Big|_1^3 = 2 - 4 \ln \frac{5}{3} + \ln 2$$

$$\Rightarrow a = 2, b = 1, c = 1 \Rightarrow T = 2 \cdot 1 + 1 - 4 = 1.$$

**Câu 88. (Đề Tham Khảo 2020 Lần 2)** Cho hàm số  $f(x)$  có  $f(0) = 0$  và  $f'(x) = \cos x \cos^2 2x, \forall x \in \mathbb{R}$ .

Khi đó  $\int_0^\pi f(x) dx$  bằng

- A.  $\frac{1042}{225}$ .                      B.  $\frac{208}{225}$ .                      C.  $\frac{242}{225}$ .                      D.  $\frac{149}{225}$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

$$\text{Ta có } f(x) = \int f'(x) dx = \int \cos x \cos^2 2x dx = \int \cos x (1 - 2 \sin^2 x)^2 dx.$$

Đặt  $t = \sin x \Rightarrow dt = \cos x dx$ .

$$\Rightarrow f(x) = \int (1 - 2t^2)^2 dt = \int (1 - 4t^2 + 4t^4) dt = t - \frac{4}{3}t^3 + \frac{4}{5}t^5 + C = \sin x - \frac{4}{3} \sin^3 x + \frac{4}{5} \sin^5 x + C.$$

Mà  $f(0) = 0 \Rightarrow C = 0$ .

$$\text{Do đó } f(x) = \sin x - \frac{4}{3} \sin^3 x + \frac{4}{5} \sin^5 x = \sin x \left( 1 - \frac{4}{3} \sin^2 x + \frac{4}{5} \sin^4 x \right).$$

$$= \sin x \left[ 1 - \frac{4}{3} (1 - \cos^2 x) + \frac{4}{5} (1 - \cos^2 x)^2 \right].$$

$$\text{Ta có } \int_0^\pi f(x) dx = \int_0^\pi \sin x \left[ 1 - \frac{4}{3} (1 - \cos^2 x) + \frac{4}{5} (1 - \cos^2 x)^2 \right] dx.$$

Đặt  $t = \cos x \Rightarrow dt = -\sin x dx$

Đổi cận  $x = 0 \Rightarrow t = 1; x = \pi \Rightarrow t = -1$ .

$$\text{Khi đó, } \int_0^\pi f(x) dx = \int_{-1}^1 \left[ 1 - \frac{4}{3} (1 - t^2) + \frac{4}{5} (1 - t^2)^2 \right] dt = \int_{-1}^1 \left( \frac{7}{15} - \frac{4}{15} t^2 + \frac{4}{5} t^4 \right) dt$$

$$= \left( \frac{7}{15}t - \frac{4}{45}t^3 + \frac{4}{5}t^4 \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{242}{225}.$$

**Câu 89. (Sở Bình Phước - 2020)** Cho  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin^2 x - 5 \sin x + 6} dx = a \ln \frac{4}{b}$ . Giá trị của  $a + b$  bằng

- A. 0.                                      B. 1.                                      C. 4.                                      D. 3.

**Lời giải**

**Chọn C**

$$\text{Ta có } I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin^2 x - 5 \sin x + 6} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d(\sin x)}{\sin^2 x - 5 \sin x + 6} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d(\sin x)}{(\sin x - 2)(\sin x - 3)}.$$

$$\text{Đặt } t = \sin x \Rightarrow dt = d(\sin x).$$

$$\text{Đổi cận: Khi } x = 0 \Rightarrow t = 0; x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = 1.$$

Khi đó

$$I = \int_0^1 \frac{dt}{(t-2)(t-3)} = \int_0^1 \left( \frac{-1}{t-2} + \frac{1}{t-3} \right) dt = \left[ \ln|t-3| - \ln|t-2| \right]_0^1 = \ln \left| \frac{t-3}{t-2} \right|_0^1 = \ln 2 - \ln \frac{3}{2} = \ln \frac{4}{3}.$$

$$\text{Ta có } a = 1, b = 3.$$

$$\text{Vậy giá trị của } a + b = 1 + 3 = 4.$$

**Câu 90. (Đề Minh Họa 2017)** Tính tích phân  $I = \int_0^{\pi} \cos^3 x \cdot \sin x dx$ .

- A.  $I = -\frac{1}{4}$                                       B.  $I = -\frac{1}{4}\pi^4$                                       C.  $I = -\pi^4$                                       D.  $I = 0$

**Lời giải**

**Chọn D**

$$\text{Ta có: } I = \int_0^{\pi} \cos^3 x \cdot \sin x dx. \text{ Đặt } t = \cos x \Rightarrow dt = -\sin x dx \Leftrightarrow -dt = \sin x dx$$

$$\text{Đổi cận: Với } x = 0 \Rightarrow t = 1; \text{ với } x = \pi \Rightarrow t = -1.$$

$$\text{Vậy } I = -\int_1^{-1} t^3 dt = \int_{-1}^1 t^3 dt = \frac{t^4}{4} \Big|_{-1}^1 = \frac{1^4}{4} - \frac{(-1)^4}{4} = 0.$$

Cách khác : Bấm máy tính.

**Câu 91. (THPT Kinh Môn - 2018)** Cho  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin^2 x - 5 \sin x + 6} dx = a \ln \frac{4}{c} + b$ , tính tổng  $S = a + b + c$

- A.  $S = 1$ .                                      B.  $S = 4$ .                                      C.  $S = 3$ .                                      D.  $S = 0$ .

**Lời giải**

$$\text{Đặt } t = \sin x \Rightarrow dt = \cos x dx. x = 0 \Rightarrow t = 0, x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = 1.$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin^2 x - 5 \sin x + 6} dx = \int_0^1 \frac{1}{t^2 - 5t + 6} dt = \int_0^1 \left( \frac{1}{t-3} - \frac{1}{t-2} \right) dt = \ln \left| \frac{t-3}{t-2} \right|_0^1 = \ln 2 - \ln \frac{3}{2} = \ln \frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow a = 1, b = 0, c = 3 \Rightarrow S = a + b + c = 4.$$

**Câu 92. (Bình Dương 2018)** Cho tích phân  $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{2 + \cos x} \cdot \sin x dx$ . Nếu đặt  $t = 2 + \cos x$  thì kết quả nào sau đây đúng?

A.  $I = \int_3^2 \sqrt{t} dt$ .      B.  $I = \int_2^3 \sqrt{t} dt$ .      C.  $I = 2 \int_3^2 \sqrt{t} dt$ .      D.  $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{t} dt$ .

**Lời giải**

$$\begin{aligned} \text{Ta có } I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{2 + \cos x} \cdot \sin x dx = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{2 + \cos x} d(\cos x) \\ &= - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{2 + \cos x} d(\cos x + 2) = - \int_3^2 \sqrt{t} dt = \int_2^3 \sqrt{t} dt. \end{aligned}$$

**Câu 93. (Đồng Tháp - 2018)** Tính tích phân  $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^2 x}{\cos^4 x} dx$  bằng cách đặt  $u = \tan x$ , mệnh đề nào dưới đây đúng?

A.  $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} u^2 du$ .      B.  $I = \int_0^2 \frac{1}{u^2} du$ .      C.  $I = - \int_0^1 u^2 du$ .      D.  $I = \int_0^1 u^2 du$ .

**Lời giải**

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^2 x}{\cos^4 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx.$$

$$\text{Đặt } u = \tan x \Rightarrow du = \frac{1}{\cos^2 x} dx.$$

$$\text{Đổi cận: } x = 0 \Rightarrow u = 0, \quad x = \frac{\pi}{4} \Rightarrow u = 1$$

$$\text{Suy ra: } I = \int_0^1 u^2 du.$$

**Câu 94. (THTP Lê Quý Đôn - Hà Nội - 2018)** Tính tích phân  $I = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{\cos^3 x} dx$ .

A.  $I = \frac{5}{2}$ .      B.  $I = \frac{3}{2}$ .      C.  $I = \frac{\pi}{3} + \frac{9}{20}$ .      D.  $I = \frac{9}{4}$ .

**Lời giải**

$$\text{Đặt } t = \cos x \Rightarrow dt = -\sin x dx.$$

$$\text{Đổi cận: } x = 0 \Rightarrow t = 1; \quad x = \frac{\pi}{3} \Rightarrow t = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Khi đó: } I = \int_1^{\frac{1}{2}} \frac{-1}{t^3} dt = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{t^3} dt = \left. \frac{-1}{2t^2} \right|_{\frac{1}{2}}^1 = -\frac{1}{2} + 2 = \frac{3}{2}.$$

**Câu 95.** (THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - 2018) Cho tích phân  $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\cos x + 2} dx = a \ln 5 + b \ln 2$  với  $a, b \in \mathbb{Z}$ .

Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

- A.**  $2a + b = 0$ .      **B.**  $a - 2b = 0$ .      **C.**  $2a - b = 0$ .      **D.**  $a + 2b = 0$ .

**Lời giải**

Đặt  $t = \cos x + 2 \Rightarrow dt = -\sin x dx$

Đổi cận  $x = \frac{\pi}{3} \Rightarrow t = \frac{5}{2}$ ,  $x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = 2$

$$\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\cos x + 2} dx = -\int_{\frac{5}{2}}^2 \frac{1}{t} dt = \int_2^{\frac{5}{2}} \frac{1}{t} dt = \ln t \Big|_2^{\frac{5}{2}} = \ln \frac{5}{2} - \ln 2 = \ln 5 - 2 \ln 2$$

Vậy ta được  $a = 1; b = -2$ .

**Câu 96.** (THPT Đông Sơn Thanh Hóa 2019) Có bao nhiêu số  $a \in (0; 20\pi)$  sao cho  $\int_0^a \sin^5 x \sin 2x dx = \frac{2}{7}$ .

- A.** 10.      **B.** 9.      **C.** 20.      **D.** 19.

**Lời giải**

$$I = \int_0^a \sin^5 x \sin 2x dx = 2 \int_0^a \sin^6 x \cos x dx$$

Đặt  $t = \sin x \Rightarrow dt = \cos x dx$  và  $\begin{cases} \sin a = b; & b \in [-1; 1] \\ \sin 0 = 0 \end{cases}$ .

$$I = 2 \int_0^b t^6 dt = 2 \cdot \frac{t^7}{7} \Big|_0^b = \frac{2b^7}{7}.$$

Theo giả thiết:  $\int_0^a \sin^5 x \sin 2x dx = \frac{2}{7} \Rightarrow \frac{2b^7}{7} = \frac{2}{7} \Leftrightarrow b = 1 \Leftrightarrow \sin a = 1 \Leftrightarrow a = \frac{\pi}{2} + k2\pi; k \in \mathbb{Z}$ .

$$a \in (0; 20\pi) \Leftrightarrow 0 < \frac{\pi}{2} + k2\pi < 20\pi \Leftrightarrow -\frac{\pi}{2} < k2\pi < \frac{39\pi}{2} \Leftrightarrow -\frac{1}{4} < k < \frac{39}{4}.$$

Mà  $k \in \mathbb{Z}$  nên suy ra  $k \in \{0; 1; 2; \dots; 9\}$ .

**Câu 97.** (HSG Bắc Ninh 2019) Biết  $F(x)$  nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \frac{\sin 2x + \cos x}{\sqrt{1 + \sin x}}$  và  $F(0) = 2$ .

Tính  $F\left(\frac{\pi}{2}\right)$

- A.**  $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2\sqrt{2}-8}{3}$       **B.**  $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2\sqrt{2}+8}{3}$       **C.**  $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{4\sqrt{2}-8}{3}$       **D.**  $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{4\sqrt{2}+8}{3}$

**Lời giải**

Ta có:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2x + \cos x}{\sqrt{1 + \sin x}} dx = F\left(\frac{\pi}{2}\right) - F(0)$$

Đặt  $t = \sqrt{1 + \sin x} \Rightarrow 2t dt = \cos x dx$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2x + \cos x}{\sqrt{1 + \sin x}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2 \sin x + 1}{\sqrt{1 + \sin x}} \cos x dx$$

$$= \int_1^{\sqrt{2}} \frac{2(t^2 - 1) + 1}{t} 2t dt = 2 \int_1^{\sqrt{2}} (2t^2 - 1) dt = 2 \left( \frac{2t^3}{3} - t \right) \Big|_1^{\sqrt{2}} = \frac{2 + 2\sqrt{2}}{3}$$

$$F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2 + 2\sqrt{2}}{3} + F(0) = \frac{2 + 2\sqrt{2}}{3} + 2 = \frac{8 + 2\sqrt{2}}{3}.$$

**Câu 98.** Biết  $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{dx}{1 + \sin x} = \frac{a\sqrt{3} + b}{c}$ , với  $a, b \in \mathbb{Z}, c \in \mathbb{Z}^+$  và  $a, b, c$  là các số nguyên tố cùng nhau. Giá trị của tổng  $a + b + c$  bằng

**A.** 5.

**B.** 12.

**C.** 7.

**D.** -1.

**Lời giải**

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{dx}{1 + \sin x} = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{dx}{\left(\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2}\right)^2} = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{\left(1 + \tan \frac{x}{2}\right)^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}{\left(1 + \tan \frac{x}{2}\right)^2} dx.$$

$$\text{Đặt } t = 1 + \tan \frac{x}{2} \Rightarrow 2dt = \left(1 + \tan^2 \frac{x}{2}\right) dx$$

$$\text{Đổi cận: } x = 0 \Rightarrow t = 1; x = \frac{\pi}{6} \Rightarrow t = 3 - \sqrt{3}.$$

$$I = \int_1^{3-\sqrt{3}} \frac{2dt}{t^2} = -\frac{2}{t} \Big|_1^{3-\sqrt{3}} = \frac{-\sqrt{3} + 3}{3}.$$

Suy ra  $a = -1, b = 3, c = 3$  nên  $a + b + c = 5$ .

**Câu 99.** Cho tích phân số  $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\cos x + 2} dx = a \ln 5 + b \ln 2$  với  $a, b \in \mathbb{Z}$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

**A.**  $2a + b = 0$ .

**B.**  $a - 2b = 0$ .

**C.**  $2a - b = 0$ .

**D.**  $a + 2b = 0$ .

**Lời giải**

$$+ \text{Xét: } I = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\cos x + 2} dx$$

$$+ \text{Đặt } u = \cos x + 2 \Rightarrow du = -\sin x dx \Rightarrow \sin x dx = -du$$

$$+ \text{Đổi cận: } \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} \Rightarrow u = \frac{5}{2} \\ x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow u = 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow I = \int_{\frac{5}{2}}^2 \frac{-1}{u} du = -\ln|u| \Big|_{\frac{5}{2}}^2 = -\left(\ln 2 - \ln \frac{5}{2}\right) = \ln 5 - 2 \ln 2 \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \end{cases}.$$

**Câu 100.** (THPT Nghen - Hà Tĩnh - 2018) Cho  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{(\cos x)^2 - 5 \cos x + 6} dx = a \ln \frac{4}{c} + b$ , với  $a, b$  là các số

hữu tỉ,  $c > 0$ . Tính tổng  $S = a + b + c$ .

A.  $S = 3$ .

B.  $S = 0$ .

C.  $S = 1$ .

D.  $S = 4$ .

**Lời giải**

Đặt  $t = \cos x \Rightarrow dt = -\sin x dx$ .

Đổi cận:  $x = 0 \Rightarrow t = 1$ ;  $x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = 0$

Ta có:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{(\cos x)^2 - 5 \cos x + 6} dx = -\int_1^0 \frac{1}{t^2 - 5t + 6} dt = \int_0^1 \left( \frac{1}{t-3} - \frac{1}{t-2} \right) dt = \ln \left| \frac{t-3}{t-2} \right| \Big|_0^1 = \ln 2 - \ln \frac{3}{2} = \ln \frac{4}{3}$$

$$= a \ln \frac{4}{c} + b.$$

$$\text{Do đó: } \begin{cases} a = 1 \\ c = 3 \\ b = 0 \end{cases}$$

Vậy  $S = a + b + c = 4$ .

**Câu 101.** (Thanh Chương 1 - Nghệ An - 2020) Cho hàm số  $y = f(x)$  có  $f(0) = 1$  và

$f'(x) = \tan^3 x + \tan x, \forall x \in \mathbb{R}$ . Biết  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx = \frac{a + \pi}{b}; a, b \in \mathbb{Q}$ , khi đó  $b - a$  bằng

A. 4.

B. 12.

C. 0.

D. -4.

**Lời giải**

**Chọn A**

Từ giả thiết  $f'(x) = \tan^3 x + \tan x, \forall x \in \mathbb{R}$  ta có

$$f(x) = \int f'(x) dx = \int (\tan^3 x + \tan x) dx = \int \tan x (1 + \tan^2 x) dx = \int \tan x d(\tan x) = \frac{1}{2} \tan^2 x + C,$$

Ta có  $f(0) = 1$  suy ra  $C = 1$  vậy  $f(x) = \frac{1}{2} \tan^2 x + 1$ .

$$\text{Tích phân } \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\tan^2 x + 2) dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\tan^2 x + 1 + 1) dx = \frac{1}{2} (\tan x + x) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{2} \left( 1 + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{4 + \pi}{8}.$$

$$\text{Từ đây ta được } \begin{cases} a = 4 \\ b = 8 \end{cases} \Rightarrow b - a = 4.$$

Vậy  $b - a = 4$ .



**Câu 102. (Tiên Lãng - Hải Phòng - 2020)** Cho hàm số  $y = f(x)$  có  $f(0) = 0$  và

$$f'(x) = \sin^8 x - \cos^8 x - 4\sin^6 x, \forall x \in \mathbb{R}. \text{ Tính } I = \int_0^{\pi} 16f(x) dx.$$

A.  $I = 10\pi^2$ .

B.  $I = 160\pi$ .

C.  $I = 16\pi^2$ .

**D.  $I = -10\pi^2$ .**

**Lời giải**

**Chọn D**

Ta có:

$$\begin{aligned} \sin^8 x - \cos^8 x - 4\sin^6 x &= (\sin^4 x - \cos^4 x)(\sin^4 x + \cos^4 x) - 4\sin^6 x \\ &= (\sin^2 x - \cos^2 x)(\sin^4 x + \cos^4 x) - 4\sin^6 x = \cos^4 x \sin^2 x - \sin^4 x \cos^2 x - \cos^6 x - 3\sin^6 x \\ &= \cos^4 x \sin^2 x - \sin^4 x \cos^2 x - 2\sin^6 x - (\cos^6 x + \sin^6 x) \\ &= \sin^2 x (\cos^4 x - \sin^4 x) - \sin^4 x (\cos^2 x + \sin^2 x) - (1 - 3\cos^2 x \cdot \sin^2 x) = 4\cos^2 x \cdot \sin^2 x - 2\sin^4 x - 1 \\ &= -\frac{3}{4}\cos 4x + \cos 2x - \frac{5}{4}. \end{aligned}$$

Suy ra:

$$\begin{aligned} f(x) &= \int f'(x) dx = \int (\sin^8 x - \cos^8 x - 4\sin^6 x) dx = \int \left( -\frac{3}{4}\cos 4x + \cos 2x - \frac{5}{4} \right) dx \\ &= -\frac{3}{16}\sin 4x + \frac{1}{2}\sin 2x - \frac{5}{4}x + C. \end{aligned}$$

Vì  $f(0) = 0 \Rightarrow C = 0$ .

Vậy  $f(x) = -\frac{3}{16}\sin 4x + \frac{1}{2}\sin 2x - \frac{5}{4}x$ .

Suy ra:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi} 16f(x) dx = \int_0^{\pi} 16 \left( -\frac{3}{16}\sin 4x + \frac{1}{2}\sin 2x - \frac{5}{4}x \right) dx = \int_0^{\pi} (-3\sin 4x + 8\sin 2x - 20x) dx \\ &= \left( \frac{3}{4}\cos 4x - 4\cos 2x - 10x^2 \right) \Big|_0^{\pi} = -10\pi^2. \end{aligned}$$

**Câu 103. (Đề Tham Khảo 2017)** Cho  $\int_0^1 \frac{dx}{e^x + 1} = a + b \ln \frac{1+e}{2}$ , với  $a, b$  là các số hữu tỉ. Tính  $S = a^3 + b^3$ .

A.  $S = -2$ .

B.  $S = 0$ .

C.  $S = 1$ .

**D.  $S = 2$ .**

**Lời giải**

**Chọn B**

**Cách 1.** Đặt  $t = e^x \Rightarrow dt = e^x dx$ . Đổi cận:  $x = 0 \Rightarrow t = 1; x = 1 \Rightarrow t = e$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{e^x + 1} &= \int_0^1 \frac{e^x dx}{e^x(e^x + 1)} = \int_1^e \frac{dt}{t(t+1)} = \int_1^e \left( \frac{1}{t} - \frac{1}{t+1} \right) dt = (\ln|t| - \ln|t+1|) \Big|_1^e = (1 - \ln(1+e)) - (-\ln 2) \\ &= 1 + \ln \frac{2}{1+e} = 1 - \ln \frac{1+e}{2} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -1 \end{cases} \Rightarrow S = a^3 + b^3 = 0. \end{aligned}$$

**Cách 2.**  $\int_0^1 \frac{dx}{e^x + 1} = \int_0^1 \frac{(e^x + 1) - e^x}{e^x + 1} dx = \int_0^1 dx - \int_0^1 \frac{d(e^x + 1)}{e^x + 1} = x \Big|_0^1 - \ln|e^x + 1| \Big|_0^1 = 1 - \ln \frac{1+e}{2}$ .

Suy ra  $a = 1$  và  $b = -1$ . Vậy  $S = a^3 + b^3 = 0$ .

**Câu 104. (Cần Thơ - 2018)** Cho tích phân  $I = \int_1^e \frac{3\ln x + 1}{x} dx$ . Nếu đặt  $t = \ln x$  thì

A.  $I = \int_0^1 \frac{3t+1}{e^t} dt$ .      B.  $I = \int_1^e \frac{3t+1}{t} dt$ .      C.  $I = \int_1^e (3t+1) dt$ .      D.  $I = \int_0^1 (3t+1) dt$ .

**Lời giải**

Đặt  $t = \ln x \Rightarrow dt = \frac{1}{x} dx$ . Đổi cận  $x = e \Rightarrow t = 1$ ;  $x = 1 \Rightarrow t = 0$ .

Khi đó  $I = \int_1^e \frac{3 \ln x + 1}{x} dx = \int_0^1 (3t+1) dt$ .

**Câu 105. (Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2019)** Cho  $I = \int_1^e \frac{\ln x}{x(\ln x + 2)^2} dx = a \ln 3 + b \ln 2 + \frac{c}{3}$ , với

$a, b, c \in \mathbb{Z}$ . Khẳng định nào sau đây đúng.

A.  $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ .      B.  $a^2 + b^2 + c^2 = 11$ .      C.  $a^2 + b^2 + c^2 = 9$ .      D.  $a^2 + b^2 + c^2 = 3$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

Ta có  $I = \int_1^e \frac{\ln x}{x(\ln x + 2)^2} dx$ , đặt  $\ln x + 2 = t \Rightarrow \frac{dx}{x} = dt$

$$I = \int_2^3 \frac{t-2}{t^2} dt = \int_2^3 \frac{1}{t} dt - 2 \int_2^3 \frac{1}{t^2} dt = \ln t \Big|_2^3 + \frac{2}{t} \Big|_2^3 = \ln 3 - \ln 2 + \frac{2}{3} - \frac{2}{2} = \ln 3 - \ln 2 - \frac{1}{3}$$

Suy ra  $a = 1; b = -1; c = -1$ , vậy  $a^2 + b^2 + c^2 = 3$ . **Chọn D.**

**Câu 106. (Việt Đức Hà Nội 2019)** Biết  $I = \int_0^4 x \ln(x^2 + 9) dx = a \ln 5 + b \ln 3 + c$  trong đó  $a, b, c$  là các số

thực. Giá trị của biểu thức  $T = a + b + c$  là:

A.  $T = 11$ .      B.  $T = 9$ .      C.  $T = 10$ .      D.  $T = 8$ .

**Lời giải**

Đặt  $x^2 + 9 = t \Rightarrow 2x dx = dt \Leftrightarrow x dx = \frac{1}{2} dt$ .

Khi đó  $I = \frac{1}{2} \int_9^{25} \ln t dt = \frac{1}{2} (t \ln t - t) \Big|_9^{25} = \frac{1}{2} [(25 \ln 25 - 25) - (9 \ln 9 - 9)] = 25 \ln 5 - 9 \ln 3 - 8$ .

Suy ra  $T = a + b + c = 25 - 9 - 8 = 8$ .

**Câu 107.** Cho  $I = \int_1^e \frac{\ln x}{x(\ln x + 2)^2} dx$  có kết quả dạng  $I = \ln a + b$  với  $a > 0, b \in \mathbb{R}$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

A.  $2ab = -1$ .      B.  $2ab = 1$ .      C.  $-b + \ln \frac{3}{2a} = -\frac{1}{3}$ .      D.  $-b + \ln \frac{3}{2a} = \frac{1}{3}$ .

**Lời giải**

Đặt  $\ln x + 2 = t \Leftrightarrow \ln x = t - 2 \Rightarrow \frac{1}{x} dx = dt$ .

Đổi cận: khi  $x = 1$  thì  $t = 2$ ; khi  $x = e$  thì  $t = 3$ .

$$\text{Khi đó } I = \int_2^3 \frac{t-2}{t^2} dt = \int_2^3 \left( \frac{1}{t} - \frac{2}{t^2} \right) dt = \left( \ln |t| + \frac{2}{t} \right) \Big|_2^3 = \ln \frac{3}{2} - \frac{1}{3} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{3}{2} \\ b = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

Vậy  $2ab = -1$ .

**Câu 108. (THPT Gia Lộc Hải Dương 2019)** Cho  $\int_1^e \frac{2 \ln x + 1}{x(\ln x + 2)^2} dx = \ln \frac{a}{b} - \frac{c}{d}$  với  $a, b, c$  là các số

nguyên dương, biết  $\frac{a}{b}; \frac{c}{d}$  là các phân số tối giản. Tính giá trị  $a + b + c + d$ ?

A. 18.

B. 15.

C. 16.

D. 17.

**Lời giải**

$$\text{Đặt } t = \ln x \Rightarrow dt = \frac{dx}{x}.$$

Đổi cận:  $x = 1 \Rightarrow t = 0$ ;  $x = e \Rightarrow t = 1$ . Khi đó:

$$I = \int_1^e \frac{2 \ln x + 1}{x(\ln x + 2)^2} dx = \int_0^1 \frac{2t + 1}{(t + 2)^2} dt = \int_0^1 \left( \frac{-3}{(t + 2)^2} + \frac{2}{t + 2} \right) dt = \left( \frac{3}{t + 2} + 2 \ln |t + 2| \right) \Big|_0^1 = \ln \frac{9}{4} - \frac{1}{2}.$$

Vậy  $a + b + c + d = 9 + 4 + 1 + 2 = 16$ .

**Câu 109. (Kim Liên - Hà Nội - 2018)** Biết  $\int_0^1 \frac{\pi x^3 + 2^x + ex^3 \cdot 2^x}{\pi + e \cdot 2^x} dx = \frac{1}{m} + \frac{1}{e \ln n} \ln \left( p + \frac{e}{e + \pi} \right)$  với  $m, n, p$

là các số nguyên dương. Tính tổng  $S = m + n + p$ .

A.  $S = 6$ .

B.  $S = 5$ .

C.  $S = 7$ .

D.  $S = 8$ .

**Lời giải**

$$\text{Ta có } \int_0^1 \frac{\pi x^3 + 2^x + ex^3 \cdot 2^x}{\pi + e \cdot 2^x} dx = \int_0^1 \left( x^3 + \frac{2^x}{\pi + e \cdot 2^x} \right) dx = \frac{1}{4} + \int_0^1 \frac{2^x}{\pi + e \cdot 2^x} dx = \frac{1}{4} + J.$$

$$\text{Tính } J = \int_0^1 \frac{2^x}{\pi + e \cdot 2^x} dx. \text{ Đặt } \pi + e \cdot 2^x = t \Rightarrow e \cdot 2^x \ln 2 dx = dt \Leftrightarrow 2^x dx = \frac{1}{e \cdot \ln 2} dt.$$

Đổi cận: Khi  $x = 0$  thì  $t = \pi + e$ ; khi  $x = 1$  thì  $t = \pi + 2e$ .

$$J = \int_0^1 \frac{2^x}{\pi + e \cdot 2^x} dx = \frac{1}{e \ln 2} \int_{\pi + e}^{\pi + 2e} \frac{1}{t} dt = \frac{1}{e \ln 2} \ln |t| \Big|_{\pi + e}^{\pi + 2e} = \frac{1}{e \ln 2} \ln \left( 1 + \frac{e}{e + \pi} \right).$$

$$\text{Khi đó } \int_0^1 \frac{\pi x^3 + 2^x + ex^3 \cdot 2^x}{\pi + e \cdot 2^x} dx = \frac{1}{4} + \frac{1}{e \ln 2} \ln \left( 1 + \frac{e}{e + \pi} \right) \Rightarrow m = 4, n = 2, p = 1. \text{ Vậy } S = 7.$$

**Câu 110. (THPT - Yên Định Thanh Hóa 2019)** Cho  $\int_1^e \frac{(3x^3 - 1) \ln x + 3x^2 - 1}{1 + x \ln x} dx = a \cdot e^3 + b + c \cdot \ln(e + 1)$  với

$a, b, c$  là các số nguyên và  $\ln e = 1$ . Tính  $P = a^2 + b^2 + c^2$ .

A.  $P = 9$ .

B.  $P = 14$ .

C.  $P = 10$ .

D.  $P = 3$ .

**Lời giải**

Ta có

$$I = \int_1^e \frac{(3x^3 - 1) \ln x + 3x^2 - 1}{1 + x \ln x} dx = \int_1^e \frac{3x^2(1 + x \ln x) - (1 + \ln x)}{1 + x \ln x} dx = \int_1^e 3x^2 dx - \int_1^e \frac{(1 + \ln x)}{1 + x \ln x} dx = e^3 - 1 - A$$

$$\text{Tính } A = \int_1^e \frac{(1 + \ln x)}{1 + x \ln x} dx. \text{ Đặt } t = 1 + x \ln x \Rightarrow dt = (1 + \ln x) dx.$$

$$\text{Đổi cận: } \begin{cases} x = 1 \Rightarrow t = 1 \\ x = e \Rightarrow t = e + 1 \end{cases}. \text{ Khi đó } A = \int_1^{e+1} \frac{dt}{t} = \ln t \Big|_1^{e+1} = \ln(e + 1).$$

$$\text{Vậy } I = e^3 - 1 - \ln(e+1) \longrightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=-1 \Rightarrow P = a^2 + b^2 + c^2 = 3. \\ c=-1 \end{cases}$$

**Câu 111.** Biết  $I = \int_0^{\ln 2} \frac{dx}{e^x + 3e^{-x} + 4} = \frac{1}{c}(\ln a - \ln b + \ln c)$  với  $a, b, c$  là các số nguyên dương.

Tính  $P = 2a - b + c$ .

A.  $P = -3$ .

B.  $P = -1$ .

C.  $P = 4$ .

**D.  $P = 3$**

**Lời giải**

$$\text{Ta có } I = \int_0^{\ln 2} \frac{dx}{e^x + 3e^{-x} + 4} = \int_0^{\ln 2} \frac{e^x dx}{e^{2x} + 4e^x + 3}.$$

Đặt  $t = e^x \Rightarrow dt = e^x dx$ . Đổi cận:  $x = 0 \Rightarrow t = 1, x = \ln 2 \Rightarrow t = 2$ .

$$\text{Khi đó } I = \int_1^2 \frac{1}{t^2 + 4t + 3} dt = \frac{1}{2} \int_1^2 \left( \frac{1}{t+1} - \frac{1}{t+3} \right) dt = \frac{1}{2} \ln \frac{t+1}{t+3} \Big|_1^2 = \frac{1}{2} (\ln 3 - \ln 5 + \ln 2).$$

Suy ra  $a = 3, b = 5, c = 2$ . Vậy  $P = 2a - b + c = 3$ .

**Câu 112. (Chuyên Hạ Long - 2018)** Biết  $\int_1^2 \frac{x+1}{x^2 + x \ln x} dx = \ln(\ln a + b)$  với  $a, b$  là các số nguyên dương.

Tính  $P = a^2 + b^2 + ab$ .

A. 10.

**B. 8.**

C. 12.

D. 6.

**Lời giải**

$$\text{Ta có } \int_1^2 \frac{x+1}{x^2 + x \ln x} dx = \int_1^2 \frac{x+1}{x(x + \ln x)} dx.$$

$$\text{Đặt } t = x + \ln x \Rightarrow dt = \left( 1 + \frac{1}{x} \right) dx = \frac{x+1}{x} dx.$$

Khi  $x = 1 \Rightarrow t = 1; x = 2 \Rightarrow t = 2 + \ln 2$ .

$$\text{Khi đó } I = \int_1^{2+\ln 2} \frac{dt}{t} = \ln |t| \Big|_1^{2+\ln 2} = \ln(\ln 2 + 2). \text{ Suy ra } \begin{cases} a = 2 \\ b = 2 \end{cases}.$$

Vậy  $P = 8$ .

**Câu 113. (Chuyên Thái Bình 2018)** Cho  $\int_0^1 \frac{(x^2 + x)e^x}{x + e^{-x}} dx = a.e + b \ln(e + c)$  với  $a, b, c \in \mathbb{Z}$ . Tính

$P = a + 2b - c$ .

A.  $P = 1$ .

B.  $P = -1$ .

C.  $P = 0$ .

**D.  $P = -2$ .**

**Lời giải**

$$\text{Ta có: } I = \int_0^1 \frac{(x^2 + x)e^x}{x + e^{-x}} dx = \int_0^1 \frac{(x+1)e^x x e^x}{x e^x + 1} dx.$$

$$\text{Đặt } t = x e^x + 1 \Rightarrow dt = (1+x)e^x dx.$$

Đổi cận:  $x = 0 \Rightarrow t = 1; x = 1 \Rightarrow t = e + 1$ .

$$\text{Khi đó: } I = \int_1^{e+1} \frac{t-1}{t} dt = \int_1^{e+1} \left( 1 - \frac{1}{t} \right) dt = (t - \ln |t|) \Big|_1^{e+1} = e - \ln(e+1).$$

Suy ra:  $a = 1, b = -1, c = 1$ .

Vậy:  $P = a + 2b - c = -2$ .

**Câu 114. (Chuyên KHTN - 2020)** Cho hàm số  $y = f(x)$  biết  $f(0) = \frac{1}{2}$  và  $f'(x) = xe^{x^2}$  với mọi  $x \in \mathbb{R}$ .

Khi đó  $\int_0^1 xf(x)dx$  bằng

- A.  $\frac{e+1}{4}$ .                      B.  $\frac{e-1}{4}$ .                      C.  $\frac{e-1}{2}$ .                      D.  $\frac{e+1}{2}$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

$$\text{Ta có } f(x) = \int f'(x).dx = \int x.e^{x^2} dx = \frac{1}{2} \int e^{x^2}.d(x^2) = \frac{1}{2}e^{x^2} + C.$$

$$\text{Mà } f(0) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} + C = \frac{1}{2} \Leftrightarrow C = 0 \Rightarrow f(x) = \frac{1}{2}e^{x^2}.$$

$$\Rightarrow \int_0^1 xf(x)dx = \frac{1}{2} \int_0^1 xe^{x^2} dx = \frac{1}{4} \int_0^1 e^{x^2} d(x^2) = \frac{1}{4} e^{x^2} \Big|_0^1 = \frac{e-1}{4}.$$

**Câu 115. (Chuyên Nguyễn Bình Khiêm - Quảng Nam - 2020)** Biết rằng  $\int_1^e \frac{2 \ln x + 1}{x(\ln x + 1)^2} dx = a \ln 2 - \frac{b}{c}$

với  $a, b, c$  là các số nguyên dương và  $\frac{b}{c}$  là phân số tối giản. Tính  $S = a + b + c$ .

- A.  $S = 3$ .                      B.  $S = 7$ .                      C.  $S = 10$ .                      D.  $S = 5$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

$$\text{Đặt } \ln x + 1 = t. \text{ Ta có: } \frac{1}{x} dx = dt.$$

$$\text{Đổi cận: } x = 1 \Rightarrow t = 1; x = e \Rightarrow t = 2.$$

$$\text{Ta có: } \int_1^e \frac{2 \ln x + 1}{x(\ln x + 1)^2} dx = \int_1^2 \frac{2(t-1)+1}{t^2} dt = \int_1^2 \left( \frac{2}{t} - \frac{1}{t^2} \right) dt = \left( 2 \ln |t| + \frac{1}{t} \right) \Big|_1^2 = 2 \ln 2 - \frac{1}{2}.$$

$$\text{Suy ra: } a = 2; b = 1; c = 2. \text{ Khi đó: } S = a + b + c = 5.$$

**Câu 116. (Đề Minh Họa 2023)** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$ . Gọi  $F(x), G(x)$  là hai nguyên hàm của

$f(x)$  trên  $\mathbb{R}$  thỏa mãn  $F(4) + G(4) = 4$  và  $F(0) + G(0) = 1$ . Khi đó  $\int_0^2 f(2x)dx$  bằng

- B. 3.                      B.  $\frac{3}{4}$ .                      C. 6.                      D.  $\frac{3}{2}$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

$$\text{Ta có: } G(x) = F(x) + C$$

$$\begin{cases} F(4) + G(4) = 4 \\ F(0) + G(0) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2F(4) + C = 4 \\ 2F(0) + C = 1 \end{cases} \Leftrightarrow F(4) - F(0) = \frac{3}{2}.$$

Vậy:

$$\int_0^2 f(2x)dx = \frac{1}{2} \int_0^4 f(x)dx = \frac{F(4) - F(0)}{2} = \frac{3}{4}.$$

**Câu 117. (THPT Yên Khánh A - 2023)** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm liên tục trên đoạn  $[0;1]$  và thỏa

mãn  $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ . Biết  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f^2(x) dx = \pi$  và  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f'(x) \sin 3x dx = \frac{-3\pi}{2}$ . Tích phân  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$  bằng.

**A.**  $\frac{-2}{3}$ .

**B.**  $\frac{2}{3}$ .

**C.**  $\frac{1}{3}$ .

**D.**  $\frac{-5}{7}$ .

**Lời giải**

Xét tích phân  $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f'(x) \sin 3x dx$

Đặt  $u = \sin 3x \Rightarrow du = 3\cos 3x dx$

$dv = f'(x) dx \Rightarrow v = f(x)$

$$I = \sin 3x \cdot f(x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3f(x) \cos 3x dx = -\frac{3\pi}{2}$$

$$\Leftrightarrow \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3f(x) \cos 3x dx = \frac{3\pi}{2} \Leftrightarrow \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \cos 3x dx = \frac{\pi}{2}.$$

$$\text{Xét } \int_0^1 [f(x)]^2 dx - \int_0^1 4\cos 3x \cdot f(x) dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2\cos 3x)^2 dx = \pi - 2\pi + \pi = 0$$

$$\Leftrightarrow \int_0^1 [f(x) - 2\cos 3x]^2 dx = 0 \Leftrightarrow f(x) = 2\cos 3x$$

$$\text{Vậy } \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\cos 3x dx = 2 \frac{\sin 3x}{3} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{2}{3}.$$

**Câu 118. (THPT-Thị Xã Quảng Trị-2023)** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  thỏa  $f(x) = 3f(2x)$ . Gọi

$F(x)$  là nguyên hàm của  $f(x)$  trên  $\mathbb{R}$  thỏa mãn  $F(4) = 3$  và  $F(2) + 4F(8) = 0$ . Khi đó  $\int_0^2 f(3x+2) dx$

bằng

**A.** 9.

**B.** -9.

**C.** 15.

**D.** -5.

**Lời giải**

**Chọn D**

$$\text{Ta có: } \int_0^2 f(3x+2) dx = \frac{1}{3} \int_0^2 f(3x+2) d(3x+2) = \frac{1}{3} \int_2^8 f(t) dt = \frac{1}{3} F(t) \Big|_2^8 = \frac{1}{3} [F(8) - F(2)].$$

Mặt khác ta có:

$$f(x) = 3f(2x) \Rightarrow \int_2^4 f(x) dx = \int_2^4 3f(2x) dx = \frac{3}{2} \int_2^4 f(2x) d(2x) = \frac{3}{2} \int_4^8 f(t) d(t)$$

$$\Leftrightarrow F(x) \Big|_2^4 = \frac{3}{2} F(t) \Big|_4^8 \Leftrightarrow F(4) - F(2) = \frac{3}{2} [F(8) - F(4)]$$

$$\Leftrightarrow F(2) + \frac{3}{2} F(8) = \frac{15}{2}$$

Kết hợp với giả thiết ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} F(2) + 4F(8) = 0 \\ F(2) + \frac{3}{2} F(8) = \frac{15}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} F(2) = 12 \\ F(8) = -3 \end{cases}$$

$$\text{Vậy } \int_0^2 f(3x+2) dx = \frac{1}{3} [F(8) - F(2)] = \frac{1}{3} (-3 - 12) = -5.$$

**Câu 119. (THPT-Liên Trường Nghệ An- 2023)** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  và thỏa mãn

$$3f(3) = -6 + f(1). \text{ Biết rằng } I = \int_1^{e^2} \frac{f(\sqrt{4 \ln x + 1})}{x\sqrt{4 \ln x + 1}} dx = 3. \text{ Khi đó } I = \int_1^3 xf'(x) dx \text{ bằng}$$

- A.** -12.                      **B.** -9.                      **C.**  $\frac{-15}{2}$ .                      **D.** 0.

**Lời giải**

**Chọn A**

$$\text{Xét } I = \int_1^{e^2} \frac{f(\sqrt{4 \ln x + 1})}{x\sqrt{4 \ln x + 1}} dx = 3,$$

$$\text{Đặt } t = \sqrt{4 \ln x + 1} \Rightarrow t^2 = 4 \ln x + 1 \Rightarrow 2t dt = \frac{4 dx}{x} \Rightarrow \frac{dx}{x} = \frac{t dt}{2}.$$

$$\text{Với } x = 1 \Rightarrow t = 1; x = e^2 \Rightarrow t = 3.$$

$$\text{Do đó } I = \int_1^3 f(t) \frac{dt}{2} = 3 \Rightarrow \int_1^3 f(t) dt = 6.$$

$$\text{Xét } I = \int_1^3 xf'(x) dx = \int_1^3 xd(f(x)) = xf(x) \Big|_1^3 - \int_1^3 f(x) dx = 3f(3) - f(1) - 6 = -12.$$

**Câu 120. THPT HAI BÀ TRUNG-HUẾ-2023)** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$ . Gọi  $xF(x), G(x)$  là hai nguyên hàm của  $f(x)$  trên  $\mathbb{R}$  thỏa mãn  $3F(1) + G(0) = 6$  và  $F(1) - G(1) = 6$ . Tính

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2x \cdot f(\cos^2 x) dx.$$

- A.** -2.                      **B.** 4.                      **C.** 2.                      **D.** -4.

**Lời giải**

**Chọn B**

$$\text{Đặt } t = \cos^2 x \Rightarrow dt = -\sin 2x dx.$$

$$\text{Đổi cận } \begin{cases} x = 0 \Rightarrow t = 1 \\ x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = 0 \end{cases}.$$

$$I = \int_1^0 f(t)(-dt) = \int_0^1 f(t) dt = tF(t) \Big|_0^1 = F(1).$$

$$\text{Ta có: } G(x) = xF(x) + C$$

$$\begin{cases} 3F(1) + G(0) = 6 \\ F(1) - G(1) = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3F(1) + C = 6 \\ F(1) - F(1) - C = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} F(1) = 4 \\ C = -6 \end{cases} \Rightarrow I = 4.$$

$$\text{Vậy } I = 4.$$

**Câu 121. (THPT Cụm 3 - Bạc Liêu - 2023)** Cho hàm số  $y = f(x) = \begin{cases} e^x + 1 & \text{khi } x \geq 0 \\ x^2 - 2x + 2 & \text{khi } x < 0 \end{cases}$ . Tích phân

$$I = \int_{1/e}^{e^2} \frac{f(\ln x - 1)}{x} dx = \frac{a}{b} + ce \text{ biết } a, b, c \in \mathbb{Z} \text{ và } \frac{a}{b} \text{ tối giản. Tính } a + b + c?$$

A. 35.

B. 29.

C. 36.

D. 27.

**Lời giải**

**Chọn C**

$$\text{Xét } I = \int_{1/e}^{e^2} \frac{f(\ln x - 1)}{x} dx.$$

$$\text{Đặt } u = \ln x - 1 \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx. \text{ Đổi cận } \begin{cases} x = \frac{1}{e} \Rightarrow u = -2 \\ x = e^2 \Rightarrow u = 1 \end{cases}.$$

$$\text{Khi đó } I = \int_{-2}^1 f(u) du = \int_{-2}^1 f(x) dx = \int_{-2}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx$$

$$= \int_{-2}^0 (x^2 - 2x + 2) dx + \int_0^1 (e^x + 1) dx$$

$$= \left( \frac{1}{3} x^3 - x^2 + 2x \right) \Big|_{-2}^0 + (e^x + x) \Big|_0^1 = \frac{32}{3} + e.$$

$$\text{Do đó } a = 32, b = 3, c = 1 \Rightarrow a + b + c = 36.$$

**Câu 122. (Sở Thanh Hóa - 2023)** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$ . Gọi  $F(x), G(x)$  là hai nguyên hàm

của  $f(x)$  trên  $\mathbb{R}$  thỏa mãn  $F(2) + G(2) = 4$  và  $F(1) + G(1) = 1$ . Khi đó  $\int_0^{\pi} \sin \frac{x}{2} f\left(\cos \frac{x}{2} + 1\right) dx$  bằng

A. 6.

B.  $\frac{3}{2}$ .

C. 3.

D.  $\frac{3}{4}$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

$$\text{Đặt } t = \cos \frac{x}{2} + 1 \Rightarrow dt = -\frac{1}{2} \sin \frac{x}{2} dx. \text{ Khi } x = 0 \Rightarrow t = 2; x = \pi \Rightarrow t = 1 \text{ nên:}$$

$$I = \int_0^{\pi} \sin \frac{x}{2} f\left(\cos \frac{x}{2} + 1\right) dx = 2 \int_1^2 f(t) dt$$

$$\text{Vậy } I = 2(F(2) - F(1)) \text{ hoặc } I = 2(G(2) - G(1)) \text{ nên:}$$

$$2I = 2(F(2) + G(2) - F(1) - G(1)) = 2(4 - 1) = 6.$$

**Câu 123. (Sở Thanh Hoá - 2023)** Biết  $\int_1^5 \frac{1}{1 + \sqrt{3x+1}} dx = a + b \ln 3 + c \ln 5$  ( $a, b, c \in \mathbb{Q}$ ). Giá trị của

$a + 2b + 3c$  bằng:

A.  $\frac{2}{3}$ .

B.  $\frac{5}{3}$ .

C.  $\frac{8}{3}$ .

D.  $\frac{7}{3}$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

$$\text{Đặt } t = \sqrt{3x+1} \Rightarrow t^2 = 3x+1 \Rightarrow \frac{2}{3} t dt = dx.$$

$$\text{Đổi cận } \begin{cases} x = 1 \Rightarrow t = 2 \\ x = 5 \Rightarrow t = 4. \end{cases}$$





Đổi cận

$x$	0	1
$t$	1	3

Ta được  $I = \frac{1}{2} \int_1^3 f(t) dt = 12 \Rightarrow \int_1^3 f(x) dx = 24$ .

Đặt  $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin^2 x) \sin 2x dx$ .

Đặt  $t = \sin^2 x \Rightarrow dt = \sin 2x dx$ .

Đổi cận

$x$	0	$\frac{\pi}{2}$
$t$	0	1

Ta được  $J = \int_0^1 f(t) dt = 3 \Rightarrow \int_0^1 f(x) dx = 3$

Do đó  $\int_0^3 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_1^3 f(x) dx = 3 + 24 = 27$ .

**Câu 127. (SỞ GIÁO DỤC HÀ TĨNH-2023)** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  và

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(\tan x) dx = \int_0^1 \frac{x^2 f(x)}{x^2 + 1} dx = 2.$$

Tính  $I = \int_0^1 f(x) dx$

A.  $I = -4$ .

B.  $I = 2$ .

**C.  $I = 4$ .**

D.  $I = 6$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Đặt  $u = \tan x \Rightarrow du = \frac{1}{\cos^2 x} dx = (1 + \tan^2 x) dx \Rightarrow \frac{du}{u^2 + 1} = dx$

Đổi cận:

$x$	0	$\frac{\pi}{4}$
$u$	0	1

Ta có:  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(\tan x) dx = \int_0^1 \frac{f(u)}{u^2 + 1} du = \int_0^1 \frac{f(x)}{x^2 + 1} dx \Rightarrow \int_0^1 \frac{f(x)}{x^2 + 1} dx = 2$ .

$I = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{(x^2 + 1)f(x)}{x^2 + 1} dx = \int_0^1 \frac{x^2 f(x)}{x^2 + 1} dx + \int_0^1 \frac{f(x)}{x^2 + 1} dx = 2 + 2 = 4$ .

**Câu 128. (Sở Bắc-Ninh-2023)** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$ . Biết  $\int_1^{e^3} \frac{f(\ln x)}{x} dx = 7$ ,

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) \sin x dx = 3$ . Giá trị của  $\int_1^3 [f(x) + 2x] dx$  bằng

A. 10.

B. -10.

**C. 15.**

D. 12.

**Lời giải**

**Chọn D**

$$\text{Ta có } \int_1^{e^3} \frac{f(\ln x)}{x} dx = \int_1^{e^3} f(\ln x) d(\ln x) = \int_0^3 f(t) dt = \int_0^3 f(x) dx = 7.$$

$$\text{Ta có } \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) \sin x dx = -\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) d(\cos x) = -\int_1^0 f(u) du = \int_0^1 f(x) dx = 3.$$

$$\text{Khi đó } \int_1^3 [f(x) + 2x] dx = \int_0^3 f(x) dx - \int_0^1 f(x) dx + \int_1^3 2x dx = 7 - 3 + 8 = 12.$$

**Câu 129. (SGD Bắc Giang - 2023)** Biết rằng tồn tại các số hữu tỷ  $a, b, c$  sao cho

$$\int_1^e \frac{(x^3 + 1) \ln x + x^2 + 1}{x \ln x + 1} dx = a.e^3 + b + c \cdot \ln(e + 1), \text{ (với } e = 2,71828\dots \text{ là cơ số của logarit tự nhiên). Giá trị của}$$

biểu thức  $T = a^2 + 8b^2 + c^2$  bằng

- A.  $\frac{16}{9}$ ..                      B. 2..                      C.  $\frac{7}{4}$ ..                      D. 5..

**Lời giải**

**Chọn B**

$$\int_1^e \frac{(x^3 + 1) \ln x + x^2 + 1}{x \ln x + 1} dx = \int_1^e \left( x^2 + \frac{\ln x + 1}{x \ln x + 1} \right) dx = \left( \frac{x^3}{3} + \ln |x \ln x + 1| \right) \Big|_1^e = \frac{1}{3} e^3 - \frac{1}{3} + \ln(e + 1).$$

$$\Rightarrow a = \frac{1}{3}; b = -\frac{1}{3}; c = 1.$$

$$\text{Vậy } T = a^2 + 8b^2 + c^2 = 2.$$

**Câu 130. Chuyên Thái Bình-Thái Bình-2023)** Cho  $f(x)$  là hàm số liên tục trên tập số thực không âm và

$$\text{thỏa mãn } f(x^2 + 3x + 1) = x + 2 \quad \forall x \geq 0. \text{ Tính } \int_1^5 f(x) dx$$

- A.  $\frac{37}{6}$ .                      B.  $\frac{527}{3}$ .                      C.  $\frac{61}{6}$ .                      D.  $\frac{464}{3}$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

$$\text{Ta có: } I = \int_0^1 f(x^2 + 3x + 1)(2x + 3) dx = \int_0^1 (x + 2)(2x + 3) dx = \frac{61}{6}$$

$$\text{Đặt } t = x^2 + 3x + 1 \Rightarrow dt = (2x + 3) dx,$$

$$\text{Đổi cận: } x = 0 \Rightarrow t = 1$$

$$x = 1 \Rightarrow t = 5$$

$$\text{Suy ra } \frac{61}{6} = \int_0^1 f(x^2 + 3x + 1)(2x + 3) dx = \int_1^5 f(t) dt = \int_1^5 f(x) dx.$$

**Câu 131. (Chuyên Quang Trung - Bình Phước - 2023)** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$ . Gọi

$$F(x), G(x) \text{ là hai nguyên hàm của } f(x) \text{ trên } \mathbb{R} \text{ thỏa mãn } F(8) + G(8) = 4. \text{ Cho biết } \int_1^3 f(2x + 6) dx = 2,$$

giá trị của  $F(12) + G(12)$  bằng

- A. 10.                      B. 12.                      C. 6.                      D. 8.

**Lời giải**

**Chọn B**

$$\int_1^3 f(2x+6)dx = \frac{1}{2} F(2x+6) \Big|_1^3 = \frac{1}{2} [F(12) - F(8)] \Rightarrow F(12) - F(8) = 4.$$

$$\text{Tương tự } \int_1^3 f(2x+6)dx = \frac{1}{2} G(2x+6) \Big|_1^3 = \frac{1}{2} [G(12) - G(8)] \Rightarrow G(12) - G(8) = 4.$$

$$\text{Suy ra } F(12) + G(12) - F(8) - G(8) = 8 \Rightarrow F(12) + G(12) = 12.$$

**Câu 132. (Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi - 2023)** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  và có một nguyên hàm là  $F(x)$ . Nếu  $\int_0^1 f(2x)dx = 6$  thì giá trị  $F(0) - F(2)$  bằng

- A.** -12.                      **B.** 3.                      **C.** 12.                      **D.** -3.

**Lời giải**

**Chọn A**

$$\text{Ta có } \int_0^1 f(2x)dx = 6 \Rightarrow \frac{1}{2} \int_0^1 f(2x)d2x = 6 \Rightarrow \int_0^2 f(x)dx = 12 \Rightarrow F(0) - F(2) = -12$$

**Câu 133. (Chuyên KHTN - Hà Nội - 2023)** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  và thỏa mãn

$$\int_0^3 f(\sqrt{x+1})dx = 8. \text{ Tích phân } \int_1^2 xf(x)dx \text{ bằng}$$

- A.** 2.                      **B.** 16.                      **C.** 8.                      **D.** 4.

**Lời giải**

**Chọn D**

$$\text{Đặt } t = \sqrt{x+1} \Rightarrow t^2 = x+1 \Rightarrow 2tdt = dx$$

$$\text{Đổi cận: } x=0 \text{ thì } t=1; x=3 \text{ thì } t=2.$$

$$\text{Ta có: } \int_0^3 f(\sqrt{x+1})dx = 8 \Leftrightarrow 2 \int_1^2 f(t)tdt = 8 \Leftrightarrow \int_1^2 f(t)tdt = 4 \Leftrightarrow \int_1^2 xf(x)dx = 4.$$

**Câu 134. (Chuyên Biên Hòa - Hà Nam 2023)** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$ . Gọi  $F(x), G(x)$  là hai nguyên hàm của  $f(x)$  trên  $\mathbb{R}$  thỏa mãn  $F(2) + G(2) = 8$  và  $F(0) + G(0) = -2$ . Khi đó  $\int_0^{16} f\left(\frac{x}{8}\right)dx$  bằng

- A.** -40.                      **B.** 40.                      **C.** 5.                      **D.** -5.

**Lời giải**

**Chọn B**

$$\text{Ta có: } G(x) = F(x) + C \Rightarrow \begin{cases} G(2) = F(2) + C \\ G(0) = F(0) + C \end{cases}$$

$$\begin{cases} F(2) + G(2) = 8 \\ F(0) + G(0) = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2F(2) + C = 8 \\ 2F(0) + C = -2 \end{cases} \Leftrightarrow F(2) - F(0) = 5.$$

$$\text{Vậy: } \int_0^{16} f\left(\frac{x}{8}\right)dx = 8 \int_0^2 f(t)dt = 8(F(2) - F(0)) = 40.$$

**Câu 135. (Chuyên Biên Hòa Hà Nam - 2023)** Cho hàm số  $f(x) = \begin{cases} 3x+1 & \text{khi } x > 2 \\ ax-2a+b & \text{khi } x \leq 2 \end{cases}$ . Biết

$$\int_0^2 f(x^2+1) dx = 5. \text{ Tính giá trị của biểu thức } T = 2a - b^2 + 1$$

A. 77.

B. 79.

C. 78.

D. 80.

**Lời giải**

**Chọn C**

Hàm số liên tục tại  $x = 2 \Rightarrow 3 \cdot 2 + 1 = 2a - 2a + b \Leftrightarrow b = 7$

Đặt  $t = x^2 + 1 \Rightarrow dt = 2x dx$

$$\text{Đổi cận } \begin{cases} x = 0 \Rightarrow t = 1 \\ x = 2 \Rightarrow t = 5 \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } \frac{1}{2} \int_1^5 f(t) dt = 5 \Leftrightarrow \int_1^5 f(x) dx = 10 \Leftrightarrow \int_1^2 (ax - 2a + 7) dx + \int_2^5 (3x + 1) dx = 10$$

$$\Leftrightarrow a \frac{x^2}{2} - 2ax + 7x \Big|_1^2 = -\frac{49}{2} \Leftrightarrow -\frac{1}{2}a + 7 = -\frac{49}{2} \Leftrightarrow a = 63$$

$$\text{Vậy } T = 2 \cdot 63 - 7^2 + 1.$$

**Câu 136. (Sở Đắk Nông 2023)** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$ . Gọi  $F(x), G(x)$  là hai nguyên hàm của  $f(x)$  trên  $\mathbb{R}$  thỏa mãn  $F(8) + G(8) = 8$  và  $F(0) + G(0) = -2$ . Khi đó  $\int_{-2}^0 f(-4x) dx$  bằng

A.  $\frac{5}{4}$ .

B. 5.

C. -5.

D.  $-\frac{5}{4}$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

Đặt  $I = \int_{-2}^0 f(-4x) dx$ . Đặt  $-4x = t \Rightarrow dx = -\frac{1}{4} dt$ . Đổi cận:

<b>x</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>
<b>t</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

$$\text{Khi đó: } I = -\frac{1}{4} \int_8^0 f(t) dt = \frac{1}{4} \int_0^8 f(t) dt = \frac{1}{4} \int_0^8 f(x) dx.$$

Do  $F(x), G(x)$  là hai nguyên hàm của  $f(x)$  trên  $\mathbb{R}$  nên có:

$$I = \frac{1}{4} G(x) \Big|_0^8 = \frac{1}{4} [G(8) - G(0)] \Rightarrow G(8) - G(0) = 4I. \text{ Tương tự cũng có:}$$

$$F(8) - F(0) = 4I.$$

$$\text{Suy ra: } 8I = F(8) + G(8) - F(0) - G(0) = 8 - (-2) = 10 \Rightarrow I = \frac{5}{4}.$$

#### **Dạng 4. Tích phân từng phần**

Nếu  $u, v$  có đạo hàm liên tục trên  $(a; b)$  thì  $I = \int_a^b u \cdot dv = u \cdot v \Big|_a^b - \int_a^b v \cdot du$ .

$$\text{Chọn } \begin{cases} u = \dots \xrightarrow{\text{Vi phân}} du = \dots dx \\ dv = \dots dx \xrightarrow{\text{Nguyên hàm}} v = \dots \end{cases}$$

Nhận dạng: **tích hai hàm khác loại nhân nhau** (ví dụ: mũ nhân lượng giác, ...)

Thứ tự ưu tiên chọn  $u$  là: "log – đa – lượng – mũ" và  $dv$  là phần còn lại.

Nghĩa là nếu có  $\ln$  hay  $\log_a x$  thì chọn  $u = \ln$  hay  $u = \log_a x = \frac{1}{\ln a} \cdot \ln x$  và  $dv =$  còn lại. Nếu không có  $\ln$ ;  $\log$  thì chọn  $u =$  đa thức và  $dv =$  còn lại,...

**CHÚ Ý:**  $\int_a^b$  (hàm mũ).(lượng giác). $dx \longrightarrow$  tích phân từng phần luân hồi.

Nghĩa là sau khi đặt  $u, dv$  để tính tích phân từng phần và tiếp tục tính  $\int u dv$  sẽ xuất hiện lại tích phân ban đầu. Giả sử tích phân được tính ban đầu là  $I$  và nếu lặp lại, ta sẽ không giải tiếp mà xem đây là phương trình bậc nhất ẩn là  $I \xrightarrow{\text{giải}} I$ .

**Câu 137. (Đề Tham Khảo 2020 Lần 2)** Xét  $\int_0^2 x e^{x^2} dx$ , nếu đặt  $u = x^2$  thì  $\int_0^2 x e^{x^2} dx$  bằng

- A.  $2 \int_0^2 e^u du$ .      B.  $2 \int_0^4 e^u du$ .      C.  $\frac{1}{2} \int_0^2 e^u du$ .      D.  $\frac{1}{2} \int_0^4 e^u du$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

$$\text{Đặt } u = x^2 \Rightarrow du = 2x dx \Leftrightarrow x dx = \frac{du}{2}.$$

$$\text{Khi } x = 0 \Rightarrow u = 0, \text{ khi } x = 2 \Rightarrow u = 4.$$

$$\text{Do đó } \int_0^2 x e^{x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^4 e^u du.$$

**Câu 138. (Đề Minh Họa 2017)** Tính tích phân  $I = \int_1^e x \ln x dx$ :

- A.  $I = \frac{e^2 - 1}{4}$       B.  $I = \frac{1}{2}$       C.  $I = \frac{e^2 - 2}{2}$       D.  $I = \frac{e^2 + 1}{4}$

**Lời giải**

**Chọn D**

$$I = \int_1^e x \ln x dx. \text{ Đặt } \begin{cases} u = \ln x \\ dv = x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{1}{x} dx \\ v = \frac{x^2}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow I = \frac{x^2}{2} \ln x \Big|_0^e - \int_0^e \frac{1}{x} \cdot \frac{x^2}{2} dx = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \int_0^e x dx = \frac{e^2}{2} - \frac{x^2}{4} \Big|_0^e = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4}.$$

**Câu 139. (Mã 103 2018)** Cho  $\int_1^e (1 + x \ln x) dx = ae^2 + be + c$  với  $a, b, c$  là các số hữu tỷ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $a + b = c$       B.  $a + b = -c$       C.  $a - b = c$       D.  $a - b = -c$

**Lời giải**

**Chọn C**

$$\text{Ta có } \int_1^e (1 + x \ln x) dx = \int_1^e 1 \cdot dx + \int_1^e x \ln x dx = e - 1 + \int_1^e x \ln x dx.$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = \ln x \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx \\ dv = x \cdot dx \Rightarrow v = \frac{x^2}{2} \end{cases}$$

$$\text{Khi đó } \int_1^e x \ln x \, dx = \frac{x^2}{2} \ln x \Big|_1^e - \frac{1}{2} \int_1^e x \, dx = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{4} x^2 \Big|_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4}.$$

$$\text{Suy ra } \int_1^e (1+x \ln x) \, dx = e - 1 + \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{e^2}{4} + e - \frac{3}{4} \text{ nên } a = \frac{1}{4}, b = 1, c = -\frac{3}{4}.$$

Vậy  $a - b = c$ .

**Câu 140. (Mã 104 2018)** Cho  $\int_1^e (2+x \ln x) dx = ae^2 + be + c$  với  $a, b, c$  là các số hữu tỉ. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A.  $a + b = c$                       B.  $a - b = c$                       C.  $a - b = -c$                       D.  $a + b = -c$

**Lời giải**

**Chọn B**

$$\text{Ta có } \int_1^e (2+x \ln x) dx = \int_1^e 2 dx + \int_1^e x \ln x dx = 2x \Big|_1^e + I = 2e - 2 + I \text{ với } I = \int_1^e x \ln x dx$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = \ln x \\ dv = x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{1}{x} dx \\ v = \frac{x^2}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow I = \frac{x^2}{2} \ln x \Big|_1^e - \int_1^e \frac{x}{2} dx = \frac{x^2}{2} \ln x \Big|_1^e - \frac{x^2}{4} \Big|_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{4} (e^2 - 1) = \frac{e^2 + 1}{4}$$

$$\Rightarrow \int_1^e (2+x \ln x) dx = 2e - 2 + \frac{e^2 + 1}{4} = \frac{1}{4} e^2 + 2e - \frac{7}{4}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{4} \\ b = 2 \\ c = -\frac{7}{4} \end{cases} \Rightarrow a - b = c$$

**Câu 141. (THPT Nguyễn Viết Xuân - 2020)** Biết  $\int_0^1 x \ln(x^2 + 1) dx = a \ln 2 - \frac{b}{c}$  (với  $a, b, c \in \mathbb{N}^*$  và  $\frac{b}{c}$  là phân số tối giản). Tính  $P = 13a + 10b + 84c$ .

- A. 193.                      B. 191.                      C. 190.                      D. 189.

**Lời giải**

**Chọn B**

$$\text{Đặt: } \begin{cases} u = \ln(x^2 + 1) \\ dv = x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{2x}{x^2 + 1} dx \\ v = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\text{Khi đó: } \int_0^1 x \ln(x^2 + 1) dx = \left( \frac{x^2 + 1}{2} \right) \ln(x^2 + 1) \Big|_0^1 - \int_0^1 x dx = \ln 2 - \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow a = 1, b = 1, c = 2. \text{ Vậy } P = 13a + 10b + 84c = 191.$$

**Câu 142. (Nguyễn Trãi - Thái Bình - 2020)** Cho  $a$  là số thực dương. Tính  $I = \int_0^a \sin^{2016} x \cdot \cos(2018x) dx$

bằng:

A.  $I = \frac{\cos^{2017} a \cdot \sin 2017a}{2016}$ .

**B.**  $I = \frac{\sin^{2017} a \cdot \cos 2017a}{2017}$ .

C.  $I = \frac{\sin^{2017} a \cdot \cos 2017a}{2016}$ .

D.  $I = \frac{\cos^{2017} a \cdot \cos 2017a}{2017}$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

Ta có  $I = \int_0^a \sin^{2016} x \cdot \cos(2017x + x) dx = \int_0^a \sin^{2016} x \cdot [\cos(2017x) \cdot \cos x - \sin(2017x) \cdot \sin x] dx$

$= \int_0^a \sin^{2016} x \cos(2017x) \cdot \cos x dx - \int_0^a \sin^{2017} x \sin(2017x) dx$ .

Xét  $J = \int_0^a \sin^{2016} x \cos(2017x) \cdot \cos x dx$ .

Đặt  $\begin{cases} u = \cos(2017x) \\ du = \sin^{2016} x \cdot \cos x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = -2017 \sin(2017x) dx \\ v = \frac{1}{2017} \sin^{2017} x \end{cases}$ .

Khi đó  $J = \cos(2017x) \cdot \frac{1}{2017} \sin^{2017} x \Big|_0^a + \int_0^a \sin^{2017} x \cdot \sin(2017x) dx$ .

Suy ra  $I = \cos(2017x) \cdot \frac{1}{2017} \sin^{2017} x \Big|_0^a + \int_0^a \sin^{2017} x \cdot \sin(2017x) dx - \int_0^a \sin^{2017} x \cdot \sin(2017x) dx$ .

$= \cos(2017x) \cdot \frac{1}{2017} \sin^{2017} x \Big|_0^a = \frac{1}{2017} \sin^{2017} a \cdot \cos(2017a)$ .

**Câu 143. (Chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình - 2020)** Cho hàm số  $f(x)$  có  $f(0) = -1$  và

$f'(x) = x(6 + 12x + e^{-x}), \forall x \in \mathbb{R}$ . Khi đó  $\int_0^1 f(x) dx$  bằng

A.  $3e$ .

**B.**  $3e^{-1}$ .

C.  $4 - 3e^{-1}$ .

D.  $-3e^{-1}$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

Ta có:  $f'(x) = x(6 + 12x + e^{-x}), \forall x \in \mathbb{R}$  nên  $f(x)$  là một nguyên hàm của  $f'(x)$ .

$\int f'(x) dx = \int x(6 + 12x + e^{-x}) dx = \int (6x + 12x^2) dx + \int xe^{-x} dx$

Mà  $\int (6x + 12x^2) dx = 3x^2 + 4x^3 + C$

Xét  $\int xe^{-x} dx$ : Đặt  $\begin{cases} u = x \\ dv = e^{-x} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = -e^{-x} \end{cases}$

$\int xe^{-x} dx = -xe^{-x} + \int e^{-x} dx = -xe^{-x} - e^{-x} + C = -(x+1)e^{-x} + C$



Suy ra  $f(x) = 3x^2 + 4x^3 - (x+1)e^{-x} + C, \forall x \in \mathbb{R}$ .

Mà  $f(0) = -1 \Rightarrow C = 0$  nên  $f(x) = 3x^2 + 4x^3 - (x+1)e^{-x}, \forall x \in \mathbb{R}$ .

Ta có

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (3x^2 + 4x^3 - (x+1)e^{-x}) dx = (x^3 + x^4) \Big|_0^1 - \int_0^1 (x+1)e^{-x} dx = 2 - \int_0^1 (x+1)e^{-x} dx$$

$$\text{Xét } \int_0^1 (x+1)e^{-x} dx : \text{Đặt } \begin{cases} u = x+1 \\ dv = e^{-x} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = -e^{-x} \end{cases}$$

$$\int_0^1 (x+1)e^{-x} dx = -(x+1)e^{-x} \Big|_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx = -2e^{-1} + 1 - e^{-x} \Big|_0^1 = -2e^{-1} + 1 - e^{-1} + 1 = 2 - 3e^{-1}$$

$$\text{Vậy } \int_0^1 f(x) dx = 3e^{-1}.$$

**Câu 144. (Chuyên Bắc Ninh - 2020)** Biết  $I = \int_0^4 x \ln(x^2 + 9) dx = a \ln 5 + b \ln 3 + c$  trong đó  $a, b, c$  là các số

thực. Tính giá trị của biểu thức  $T = a + b + c$ .

A.  $T = 9$ .

B.  $T = 11$ .

C.  $T = 8$ .

D.  $T = 10$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

**Cách 1**

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = \ln(x^2 + 9) \\ dv = x dx \end{cases}, \text{ ta có } \begin{cases} du = \frac{2x}{x^2 + 9} dx \\ v = \frac{x^2 + 9}{2} \end{cases}.$$

Do đó

$$\begin{aligned} I &= \frac{x^2 + 9}{2} \ln(x^2 + 9) \Big|_0^4 - \int_0^4 \frac{x^2 + 9}{2} \cdot \frac{2x}{x^2 + 9} dx = \frac{x^2 + 9}{2} \ln(x^2 + 9) \Big|_0^4 - \int_0^4 x dx \\ &= \frac{x^2 + 9}{2} \ln(x^2 + 9) \Big|_0^4 - \left( \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^4 = \frac{25}{2} \ln 25 - \frac{9}{2} \ln 9 - 8 = 25 \ln 5 - 9 \ln 3 - 8 = a \ln 5 + b \ln 3 + c. \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra } \begin{cases} a = 25 \\ b = -9 \\ c = -8 \end{cases} \Rightarrow a + b + c = 8.$$

**Cách 2**

$$\text{Ta có } I = \int_0^4 x \ln(x^2 + 9) dx$$

$$\text{Đặt } t = x^2 + 9 \Rightarrow dt = 2x dx \Rightarrow x dx = \frac{1}{2} dt$$

$$\text{Đổi cận: } x = 0 \Rightarrow t = 9, x = 4 \Rightarrow t = 25$$

$$\text{Suy ra } I = \int_0^4 x \ln(x^2 + 9) dx = \frac{1}{2} \int_9^{25} \ln t dt$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = \ln t \\ dv = dt \end{cases}, \text{ ta có } \begin{cases} du = \frac{1}{t} dt \\ v = t \end{cases}.$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I &= \frac{1}{2} \int_9^{25} t \ln t dt = \frac{1}{2} \left( t \cdot \ln t \Big|_9^{25} - \int_9^{25} t \cdot \frac{1}{t} dt \right) = \frac{1}{2} \left( t \cdot \ln t \Big|_9^{25} - \int_9^{25} dt \right) = \frac{1}{2} \left( t \cdot \ln t \Big|_9^{25} - t \Big|_9^{25} \right) \\ &= \frac{25}{2} \ln 25 - \frac{9}{2} \ln 9 - 8 = 25 \ln 5 - 9 \ln 3 - 8 = a \ln 5 + b \ln 3 + c. \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra } \begin{cases} a = 25 \\ b = -9 \\ c = -8 \end{cases} \Rightarrow a + b + c = 8.$$

**Câu 145. (Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ - 2020)** Xét hàm số  $f(x) = e^x + \int_0^1 xf(x)dx$ . Giá trị của  $f(\ln(5620))$  bằng

- A.** 5622.                      **B.** 5620.                      **C.** 5618.                      **D.** 5621.

**Lời giải**

**Chọn A**

$$\text{Từ } f(x) = e^x + \int_0^1 xf(x)dx. \quad (1)$$

Lấy đạo hàm hai vế, suy ra  $f'(x) = e^x$ .

$$\text{Khi đó, } f(x) = \int f'(x)dx = \int e^x dx = e^x + C. \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) suy ra: } C = \int_0^1 xf(x)dx \Leftrightarrow C = \int_0^1 x(e^x + C)dx \Leftrightarrow C = \int_0^1 xe^x dx + \int_0^1 Cx dx$$

$$\Leftrightarrow C = 1 + \frac{Cx^2}{2} \Big|_0^1 \Leftrightarrow C = 1 + \frac{C}{2} \Leftrightarrow C = 2.$$

$$\text{Vậy } f(x) = e^x + 2 \Rightarrow f(\ln(5620)) = e^{\ln(5620)} + 2 = 5620 + 2 = 5622.$$

**Câu 146.** Tích phân  $\int_0^1 (x-2)e^{2x} dx$  bằng

- A.**  $\frac{-5-3e^2}{4}$ .                      **B.**  $\frac{5-3e^2}{4}$ .                      **C.**  $\frac{5-3e^2}{2}$ .                      **D.**  $\frac{5+3e^2}{4}$ .

**Lời giải**

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = x-2 \\ dv = e^{2x} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = \frac{1}{2} e^{2x} \end{cases}.$$

Suy ra



$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (x-1) \sin 2x dx = -\frac{1}{2}(x-1) \cos 2x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2x dx.$$

**Câu 150. (Chuyên KHTN 2019)** Biết rằng tồn tại duy nhất các bộ số nguyên  $a, b, c$  sao cho

$$\int_2^3 (4x+2) \ln x dx = a + b \ln 2 + c \ln 3. \text{ Giá trị của } a + b + c \text{ bằng}$$

A. 19.

B. -19.

C. 5.

D. -5.

**Lời giải**

$$\text{Đặt } \begin{cases} \ln x = u \Rightarrow \frac{1}{x} dx = du \\ (4x+2) dx = dv \Rightarrow 2x^2 + 2x = v \end{cases}$$

Khi đó

$$\int_2^3 (4x+2) \ln x dx = \ln x \cdot (2x^2 + 2x) \Big|_2^3 - 2 \int_2^3 (x+1) dx = 24 \ln 3 - 12 \ln 2 - 2 \cdot \frac{7}{2} = -7 - 12 \ln 2 + 24 \ln 3.$$

$$\text{Vậy } a = -7; b = -12; c = 24 \Rightarrow a + b + c = 5.$$

**Câu 151. (HSG Bắc Ninh 2019)** Cho  $\int_1^2 \frac{\ln(1+x)}{x^2} dx = a \ln 2 + b \ln 3$ , với  $a, b$  là các số hữu tỉ. Tính

$$P = a + 4b.$$

A.  $P=0$

B.  $P=1$

C.  $P=3$

D.  $P=-3$

**Lời giải**

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{\ln(1+x)}{x^2} dx &= \int_1^2 \ln(1+x) \left( \frac{-1}{x} \right)' dx = \ln(1+x) \cdot \frac{-1}{x} \Big|_1^2 - \int_1^2 \frac{1}{x+1} \cdot \frac{-1}{x} dx \\ &= \frac{-1}{2} \ln 3 + \ln 2 + \int_1^2 \frac{1}{x} dx - \int_1^2 \frac{1}{x+1} dx = \frac{-1}{2} \ln 3 + \ln 2 - \ln(1+x) \Big|_1^2 + \ln x \Big|_1^2 \\ &= \frac{-1}{2} \ln 3 + \ln 2 - \ln 3 + 2 \ln 2 = \frac{-3}{2} \ln 3 + 3 \ln 2 \Rightarrow a = 3, b = \frac{-3}{2}. \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } a + 4b = -3.$$

**Câu 152.** Tính tích phân  $I = \int_1^{2^{1000}} \frac{\ln x}{(x+1)^2} dx$ , ta được

A.  $I = -\frac{\ln 2^{1000}}{1+2^{1000}} + 1001 \ln \frac{2}{1+2^{1000}}.$

B.  $I = -\frac{1000 \ln 2}{1+2^{1000}} + \ln \frac{2^{1000}}{1+2^{1000}}.$

C.  $I = \frac{\ln 2^{1000}}{1+2^{1000}} - 1001 \ln \frac{2}{1+2^{1000}}.$

D.  $I = \frac{1000 \ln 2}{1+2^{1000}} - \ln \frac{2^{1000}}{1+2^{1000}}.$

**Lời giải**

**Chọn A**

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = \ln x \\ dv = \frac{dx}{(x+1)^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{dx}{x} \\ v = -\frac{1}{x+1} \end{cases}$$

$$\Rightarrow I = -\frac{\ln x}{x+1} \Big|_1^{2^{1000}} + \int_1^{2^{1000}} \frac{1}{x+1} \cdot \frac{dx}{x} = -\frac{\ln 2^{1000}}{2^{1000}+1} + \int_1^{2^{1000}} \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) dx = -\frac{1000 \ln 2}{2^{1000}+1} + \ln \left| \frac{x}{x+1} \right| \Big|_1^{2^{1000}}$$

$$= -\frac{1000 \ln 2}{2^{1000} + 1} + \ln \frac{2^{1000}}{2^{1000} + 1} - \ln \frac{1}{2} = -\frac{1000 \ln 2}{2^{1000} + 1} + \ln \frac{2^{1001}}{2^{1000} + 1} = -\frac{\ln 2^{1000}}{1 + 2^{1000}} + 1001 \ln \frac{2}{1 + 2^{1000}}.$$

**Câu 153.** Biết  $\int_0^2 2x \ln(x+1) dx = a \cdot \ln b$ , với  $a, b \in \mathbb{N}^*$ ,  $b$  là số nguyên tố. Tính  $6a + 7b$ .

- A.  $6a + 7b = 33$ .      B.  $6a + 7b = 25$ .      C.  $6a + 7b = 42$ .      D.  $6a + 7b = 39$ .

**Lời giải**

Xét  $I = \int_0^2 2x \ln(x+1) dx$ .

Đặt  $\begin{cases} u = \ln(x+1) \\ dv = 2x dx \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} du = \frac{1}{x+1} dx \\ v = x^2 - 1 \end{cases}$ .

Ta có  $I = (x^2 - 1) \ln(x+1) \Big|_0^2 - \int_0^2 \frac{x^2 - 1}{x+1} dx = 3 \ln 3 - \int_0^2 (x-1) dx = 3 \ln 3 - \left( \frac{x^2}{2} - x \right) \Big|_0^2 = 3 \ln 3$ .

Vậy  $a = 3, b = 3 \Rightarrow 6a + 7b = 39$ .

**Câu 154.** (Chuyên Hưng Yên 2019) Biết rằng  $\int_1^a \ln x dx = 1 + 2a$ , ( $a > 1$ ). Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?

- A.  $a \in (18; 21)$ .      B.  $a \in (1; 4)$ .      C.  $a \in (11; 14)$ .      D.  $a \in (6; 9)$ .

**Lời giải**

Đặt  $u = \ln x \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx$

$dv = dx \Rightarrow v = x$

Ta có  $\int_1^a \ln x dx = a \cdot \ln a - \int_1^a dx = a \ln a - a + 1 = 1 + 2a$

$\Rightarrow a \ln a = 3a \Leftrightarrow \ln a = 3 \Leftrightarrow a = e^3$ .

Vậy  $a \in (18; 21)$ .

**Câu 155.** (KTNL GV Bắc Giang 2019) Cho tích phân  $\int_0^1 (x-2)e^x dx = a + be$ , với  $a; b \in \mathbb{Z}$ . Tổng  $a + b$  bằng

- A. 1.      B. -3.      C. 5.      D. -1.

**Chọn A**

Đặt  $\begin{cases} u = x-2 \\ dv = e^x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = e^x \end{cases} \Rightarrow \int_0^1 (x-2)e^x dx = (x-2)e^x \Big|_0^1 - \int_0^1 e^x dx = -e + 2 - e^x \Big|_0^1 = 3 - 2e = a + be$

với  $a; b \in \mathbb{Z} \Rightarrow a = 3, b = -2 \Rightarrow a + b = 1$

**Câu 156.** (KTNL GV Thuận Thành 2 Bắc Ninh -2019) Tính tích phân  $I = \int_1^2 x e^x dx$ .

- A.  $I = e^2$ .      B.  $I = -e^2$ .      C.  $I = e$ .      D.  $I = 3e^2 - 2e$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

Đặt  $\begin{cases} u = x \\ dv = e^x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = e^x \end{cases}$

$$I = \int_1^2 x e^x dx = x e^x \Big|_1^2 - \int_1^2 e^x dx = 2e^2 - e - e^x \Big|_1^2 = 2e^2 - e - (e^2 - e) = e^2.$$

**Câu 157.** (THPT Yên Phong Số 1 Bắc Ninh 2019) Biết rằng  $\int_2^3 x \ln x dx = m \ln 3 + n \ln 2 + p$  trong đó

$m, n, p \in \mathbb{Q}$ . Tính  $m + n + 2p$

- A.  $\frac{5}{4}$ .                      B.  $\frac{9}{2}$ .                      C. 0.                      D.  $-\frac{5}{4}$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = \ln x \\ dv = x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{1}{x} dx \\ v = \frac{x^2}{2} \end{cases}.$$

$$\Rightarrow \int_2^3 x \ln x dx = \frac{x^2}{2} \ln x \Big|_2^3 - \frac{1}{2} \int_2^3 x dx = \frac{x^2}{2} \ln x \Big|_2^3 - \frac{x^2}{4} \Big|_2^3 = \frac{9}{2} \ln 3 - 2 \ln 2 - \frac{5}{4}.$$

Suy ra  $m + n + 2p = 0$ .

**Câu 158.** (Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2019) Biết  $\int_0^2 2x \ln(1+x) dx = a \ln b$ , với  $a, b \in \mathbb{N}^*$ ,  $b$  là số nguyên

tốt. Tính  $3a + 4b$ .

- A. 42.                      B. 21.                      C. 12.                      D. 32.

**Lời giải**

$$\text{Xét } I = \int_0^2 2x \ln(1+x) dx. \text{ Đặt } \begin{cases} u = \ln(1+x) \\ dv = 2x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{1}{1+x} dx \\ v = x^2 - 1 \end{cases}.$$

$$\text{Ta có: } I = (x^2 - 1) \ln(x+1) \Big|_0^2 - \int_0^2 \frac{x^2 - 1}{x+1} dx = 3 \ln 3 - \int_0^2 (x-1) dx = 3 \ln 3 - \left( \frac{x^2}{2} - x \right) \Big|_0^2 = 3 \ln 3.$$

Vậy  $a = 3, b = 3 \Rightarrow 3a + 4b = 21$ .

**Câu 159.** (Chuyên Quốc Học Huế 2019) Cho tích phân  $I = \int_1^2 \frac{\ln x}{x^2} dx = \frac{b}{c} + a \ln 2$  với  $a$  là số thực,  $b$  và  $c$  là

các số nguyên dương, đồng thời  $\frac{b}{c}$  là phân số tối giản. Tính giá trị của biểu thức  $P = 2a + 3b + c$ .

- A.  $P = 6$                       B.  $P = -6$                       C.  $P = 5$                       D.  $P = 4$

**Lời giải**

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = \ln x \\ dv = \frac{1}{x^2} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{1}{x} dx \\ v = -\frac{1}{x} \end{cases}$$

$$\text{Ta có } I = \left( \frac{-1}{x} \cdot \ln x \right) \Big|_1^2 + \int_1^2 \frac{1}{x^2} dx = \frac{-1}{2} \ln 2 - \frac{1}{x} \Big|_1^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \ln 2 \Rightarrow b = 1, c = 2, a = -\frac{1}{2}. \text{ Khi đó}$$

$$P = 2 \left( \frac{-1}{2} \right) + 3 \cdot 1 + 2 = 4.$$

**Câu 160.** Biết  $I = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{x}{\cos^2 x} dx = \frac{\sqrt{3}}{a} \pi - \ln b$ . Khi đó, giá trị của  $a^2 + b$  bằng

A. 11.

B. 7.

C. 13.

D. 9.

**Lời giải**

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = x \\ dv = \frac{1}{\cos^2 x} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = \tan x \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I &= x \tan x \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} - \int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan x dx = \frac{\pi}{3} \cdot \sqrt{3} - \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x dx}{\cos x} = \frac{\pi\sqrt{3}}{3} + \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{d(\cos x)}{\cos x} \\ &= \frac{\pi\sqrt{3}}{3} + \ln|\cos x| \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{\pi\sqrt{3}}{3} + \ln \frac{1}{2} - \ln 1 = \frac{\pi\sqrt{3}}{3} - \ln 2 \Rightarrow a = 3; b = 2. \text{ Vậy } a^2 + b = 11. \end{aligned}$$

**Câu 161.** Cho  $\int \ln(x^2 - x) dx = F(x)$ ,  $F(2) = 2 \ln 2 - 4$ . Khi đó  $I = \int_2^3 \left[ \frac{F(x) + 2x + \ln(x-1)}{x} \right] dx$  bằng

A.  $3 \ln 3 - 3$ .

B.  $3 \ln 3 - 2$ .

C.  $3 \ln 3 - 1$ .

D.  $3 \ln 3 - 4$

**Lời giải**

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = \ln(x^2 - x) \\ v' = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u' = \frac{2x-1}{x^2-x} \\ v = x \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } F(x) = \int \ln(x^2 - x) dx = x \ln(x^2 - x) - \int \frac{2x-1}{x-1} dx = x \ln(x^2 - x) - 2x - \ln|x-1| + C$$

$$F(2) = 2 \ln 2 - 4 \Rightarrow C = 0 \text{ suy ra } F(x) = x \ln(x^2 - x) - 2x - \ln|x-1|$$

$$\text{Khi đó: } I = \int_2^3 \left[ \frac{F(x) + 2x + \ln(x-1)}{x} \right] dx = \int_2^3 \ln(x^2 - x) dx = F(3) - F(2) = 3 \ln 3 - 2.$$

**Câu 162. (Chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên 2019)** Biết  $I = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{x}{\cos^2 x} dx = \frac{\sqrt{3}}{a} \pi - \ln b$ , với  $a, b$  là các số

nguyên dương. Tính giá trị của biểu thức  $T = a^2 + b$ .

A.  $T = 9$ .

B.  $T = 13$ .

C.  $T = 7$ .

D.  $T = 11$ .

**Lời giải**

$$\text{Xét } I = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{x}{\cos^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{3}} x \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx.$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = x \\ dv = \frac{1}{\cos^2 x} dx \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = \tan x \end{cases}$$

$$I = x \cdot \tan x \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} - \int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan x dx = x \cdot \tan x \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} + \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\cos x} d(\cos x) = \left[ x \tan x + \ln(\cos x) \right] \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \pi - \ln 2.$$

$$\text{Suy ra } \begin{cases} a = 3 \\ b = 2 \end{cases} \Rightarrow T = a^2 + b = 11.$$

**Câu 163.** □(Thpt Lê Quý Đôn Đà Nẵng 2019) Cho  $\int_1^2 \frac{\ln(1+2x)}{x^2} dx = \frac{a}{2} \ln 5 + b \ln 3 + c \ln 2$ , với  $a, b, c$  là

các số nguyên. Giá trị của  $a+2(b+c)$  là:

A. 0.

B. 9.

C. 3.

D. 5.

**Lời giải**

Áp dụng phương pháp tích phân từng phần:

$$\text{Đặt: } \begin{cases} u = \ln(1+2x) \\ dv = \frac{1}{x^2} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{2}{2x+1} dx \\ \text{chọn } v = -\frac{1}{x} - 2 = \frac{-(2x+1)}{x} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \int_1^2 \frac{\ln(1+2x)}{x^2} dx = \frac{-(2x+1)}{x} \cdot \ln(1+2x) \Big|_1^2 + \int_1^2 \frac{2}{x} dx$$

$$= \left( -\frac{5}{2} \ln 5 + 3 \ln 3 \right) + 2 \ln |x| \Big|_1^2$$

$$= \frac{-5}{2} \ln 5 + 3 \ln 3 + 2 \ln 2.$$

$$\Rightarrow a = -5, b = 3, c = 2.$$

$$\text{Vậy } a+2(b+c) = 5.$$

**Câu 164.** Cho  $\int_1^2 \frac{\ln(1+x)}{x^2} dx = a \ln 2 + b \ln 3$ , với  $a, b$  là các số hữu tỉ. Tính  $P = ab$ .

A.  $P = \frac{3}{2}$ .

B.  $P = 0$ .

C.  $P = \frac{-9}{2}$ .

D.  $P = -3$ .

**Lời giải**

$$\text{Ta có } I = \int_1^2 \frac{\ln(1+x)}{x^2} dx = a \ln 2 + b \ln 3.$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = \ln(1+x) \\ dv = \frac{1}{x^2} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{1}{1+x} dx \\ v = -\frac{1}{x} \end{cases}$$

$$\text{Khi đó } I = -\frac{1}{x} \ln(1+x) \Big|_1^2 + \int_1^2 \frac{1}{x(1+x)} dx = -\frac{1}{2} \ln 3 + \ln 2 + \int_1^2 \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{1+x} \right) dx$$

$$= -\frac{1}{2} \ln 3 + \ln 2 + \left( \ln \frac{x}{x+1} \right) \Big|_1^2 = -\frac{1}{2} \ln 3 + \ln 2 + 2 \ln 2 - \ln 3 = 3 \ln 2 - \frac{3}{2} \ln 3.$$

$$\text{Suy ra } a = 3, b = -\frac{3}{2}. \text{ Vậy } P = ab = \frac{-9}{2}.$$

**Câu 165.** (KTNL GV Bắc Giang 2019) Cho tích phân  $\int_0^1 (x-2)e^x dx = a + be$ , với  $a; b \in \mathbb{Z}$ . Tổng  $a + b$

bằng

A. 1.

B. -3.

C. 5.

D. -1.

**Lời giải**

Chọn A.



$$\text{Đặt } \begin{cases} u = x - 2 \\ dv = e^x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = e^x \end{cases} \Rightarrow \int_0^1 (x-2)e^x dx = (x-2)e^x \Big|_0^1 - \int_0^1 e^x dx = -e + 2 - e^x \Big|_0^1 = 3 - 2e = a + be$$

với  $a, b \in \mathbb{Z} \Rightarrow a = 3, b = -2 \Rightarrow a + b = 1$

**Câu 166. (Sở Phú Thọ 2019)** Cho  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\ln(\sin x + 2 \cos x)}{\cos^2 x} dx = a \ln 3 + b \ln 2 + c\pi$  với  $a, b, c$  là các số hữu tỉ.

Giá trị của  $abc$  bằng

**A.**  $\frac{15}{8}$

**B.**  $\frac{5}{8}$

**C.**  $\frac{5}{4}$

**D.**  $\frac{17}{8}$

**Lời giải**

**Chọn A**

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = \ln(\sin x + 2 \cos x) \Rightarrow du = \frac{\cos x - 2 \sin x}{\sin x + 2 \cos x} dx \\ dv = \frac{dx}{\cos^2 x} \Rightarrow v = \tan x + 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\ln(\sin x + 2 \cos x)}{\cos^2 x} dx = (\tan x + 2) \ln(\sin x + 2 \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x - 2 \sin x}{\cos x} dx$$

$$= 3 \ln \left( \frac{3\sqrt{2}}{2} \right) - 2 \ln 2 - \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 - 2 \tan x) dx = 3 \ln 3 - \frac{7}{2} \ln 2 - (x + 2 \ln |\cos x|) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$= 3 \ln 3 - \frac{7}{2} \ln 2 - \frac{\pi}{4} - 2 \ln \frac{\sqrt{2}}{2} = 3 \ln 3 - \frac{5}{2} \ln 2 - \frac{\pi}{4} \Rightarrow a = 3, b = -\frac{5}{2}, c = -\frac{1}{4}.$$

Vậy  $abc = 18$ .

**Câu 167. (Chuyên Thái Bình 2019)** Biết  $\int_{\frac{1}{12}}^{12} \left(1 + x - \frac{1}{x}\right) e^{\frac{x+1}{x}} dx = \frac{a}{b} e^{\frac{c}{d}}$  trong đó  $a, b, c, d$  là các số nguyên

dương và các phân số  $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}$  là tối giản. Tính  $bc - ad$ .

**A.** 12.

**B.** 1.

**C.** 24.

**D.** 64.

**Lời giải**

$$\text{Ta có: } I = \int_{\frac{1}{12}}^{12} \left[ x \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) + 1 \right] e^{\frac{x+1}{x}} dx = \int_{\frac{1}{12}}^{12} x \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) e^{\frac{x+1}{x}} dx + \int_{\frac{1}{12}}^{12} e^{\frac{x+1}{x}} dx.$$

$$\text{Đặt: } \begin{cases} u = x \\ dv = \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) e^{\frac{x+1}{x}} dx \end{cases} \rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = e^{\frac{x+1}{x}} \end{cases}.$$

$$\text{Khi đó: } I = \int_{\frac{1}{12}}^{12} x \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) e^{\frac{x+1}{x}} dx + \int_{\frac{1}{12}}^{12} e^{\frac{x+1}{x}} dx = x \cdot e^{\frac{x+1}{x}} \Big|_{\frac{1}{12}}^{12} - \int_{\frac{1}{12}}^{12} e^{\frac{x+1}{x}} dx + \int_{\frac{1}{12}}^{12} e^{\frac{x+1}{x}} dx$$

$$= 12e^{12+\frac{1}{12}} - \frac{1}{12}e^{12+\frac{1}{12}} = \frac{143}{12}e^{\frac{145}{12}}.$$

Vậy:  $a = 143; b = 12; c = 145; d = 12$ . Đó đó:  $bc - ad = 12 \cdot 145 - 143 \cdot 12 = 24$ .

**Câu 168. (THPT Yên Khánh A 2018)** Cho  $\int_0^2 \frac{x + \ln(x+1)}{(x+2)^2} dx = \frac{a}{b} + \frac{c}{d} \ln 3$  (với  $a, c \in \mathbb{Z}; b, d \in \mathbb{N}^*$ ;  $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}$  là các phân số tối giản). Tính  $P = (a+b)(c+d)$ .

A. 7.

B. -7.

C. 3.

D. -3.

**Lời giải**

$$\text{Ta có } \int_0^2 \frac{x + \ln(x+1)}{(x+2)^2} dx = \int_0^2 \frac{1}{x+2} dx - \int_0^2 \frac{2}{(x+2)^2} dx + \int_0^2 \frac{\ln(x+1)}{(x+2)^2} dx.$$

$$\int_0^2 \frac{1}{x+2} dx - \int_0^2 \frac{2}{(x+2)^2} dx = \left( \ln|x+2| + \frac{2}{x+2} \right) \Big|_0^2 = \ln 2 - \frac{1}{2}.$$

$$I = \int_0^2 \frac{\ln(x+1)}{(x+2)^2} dx.$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = \ln(x+1) \\ dv = \frac{1}{(x+2)^2} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{1}{x+1} dx \\ v = \frac{-1}{(x+2)} + 1 = \frac{x+1}{x+2} \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } I = \left( \frac{(x+1)\ln(x+1)}{(x+2)} \right) \Big|_0^2 - \int_0^2 \frac{1}{(x+2)} dx = \frac{3}{4} \ln 3 - \ln 2.$$

$$\text{Do đó } \int_0^2 \frac{x + \ln(x+1)}{(x+2)^2} dx = -\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \ln 3 \Rightarrow P = (-1+2)(3+4) = 7.$$

**Câu 169. (Đặng Thúc Hứa - Nghệ An - 2020)** Cho hàm số  $y = f(x)$  có  $f(1) = \frac{1}{2}$  và  $f'(x) = \frac{x}{(x+1)^2}$  với

$x > -1$ . Biết  $\int_1^2 f(x) dx = a \ln \frac{b}{c} - d$  với  $a, b, c, d$  là các số nguyên dương,  $b \leq 3$  và  $\frac{b}{c}$  tối giản. Khi đó

$a+b+c+d$  bằng

A. 8.

B. 5.

C. 6.

D. 10.

**Lời giải**

**Chọn D**

$$\text{Ta có } \int \frac{x}{(x+1)^2} dx = \int \left( \frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2} \right) dx = \ln(x+1) + \frac{1}{x+1} + C, \text{ với } C \text{ là hằng số tùy ý.}$$

$$\text{Do } f(1) = \frac{1}{2} \Rightarrow \ln 2 + \frac{1}{2} + C = \frac{1}{2} \Leftrightarrow C = -\ln 2.$$

Khi đó, ta có

$$\int_1^2 f(x) dx = \int_1^2 \left[ \ln(x+1) + \frac{1}{x+1} - \ln 2 \right] dx = \int_1^2 \ln(x+1) dx + \int_1^2 \frac{dx}{x+1} - \ln 2 \int_1^2 dx.$$

Xét  $I = \int_1^2 \ln(x+1) dx$ . Đặt  $\begin{cases} u = \ln(x+1) \\ dv = dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{dx}{x+1} \\ v = x \end{cases}$ , khi đó ta có

$$I = x \cdot \ln(x+1) \Big|_1^2 - \int_1^2 \frac{x dx}{x+1} = 2 \ln 3 - \ln 2 - \int_1^2 \frac{x dx}{x+1} = 2 \ln 3 - \ln 2 - \int_1^2 dx + \int_1^2 \frac{dx}{x+1} = 2 \ln 3 - \ln 2 - 1 + \int_1^2 \frac{dx}{x+1}$$

Khi đó,

$$\int_1^2 f(x) dx = 2 \ln 3 - \ln 2 - 1 + 2 \int_0^1 \frac{dx}{x+1} - \ln 2 \int_1^2 dx = 2 \ln 3 - \ln 2 - 1 + 2 \ln 3 - 2 \ln 2 - \ln 2 = 4 \ln \frac{3}{2} - 1.$$

$$\text{Suy ra } \begin{cases} a = 4 \\ b = 3 \\ c = 2 \\ d = 1 \end{cases} \Rightarrow a + b + c + d = 10.$$

**Câu 170.** (THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang 2023) Biết  $\int_0^1 xf'(x) dx = 5$  và  $f(1) = -1$ . Tính  $I = \int_0^1 f(x) dx$ .

A.  $I = 4$

B.  $I = -4$

C.  $I = 6$

D.  $I = -6$

**Lời giải**

**Chọn B**

$$I = \int_0^1 xf'(x) dx = 5. \text{ Đặt } \begin{cases} u = x \\ dv = f'(x) dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = f(x) \end{cases}$$

$$I = x \cdot f(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 f(x) dx \Rightarrow \int_0^1 f(x) dx = x \cdot f(x) \Big|_0^1 - 5 = -6.$$

**Câu 171.** (Sở Nghệ An 2023) Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm liên tục trên  $\mathbb{R}$ . Biết  $\int_1^e \frac{1-f(\ln x)}{x} dx = 2$

và  $f(1) = \frac{1}{3}$ . Tích phân  $\int_0^1 xf'(x) dx$  bằng

A.  $-\frac{2}{3}$ .

B.  $\frac{2e}{3}$ .

C.  $\frac{4}{3}$ .

D.  $\frac{2}{3}$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

$$\text{Ta có } \int_1^e \frac{1-f(\ln x)}{x} dx = \int_1^e \frac{1}{x} dx - \int_1^e \frac{f(\ln x)}{x} dx = \ln x \Big|_1^e - \int_1^e f(\ln x) d(\ln x) = 1 - \int_0^1 f(x) dx.$$

$$\text{Mặt khác } \int_1^e \frac{1-f(\ln x)}{x} dx = 2 \text{ suy ra } \int_0^1 f(x) dx = -1.$$

$$\text{Do đó } \int_0^1 xf'(x) dx = \int_0^1 x d(f(x)) = xf(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 f(x) dx = f(1) + 1 = \frac{4}{3}.$$

**Câu 172. (Sở Hưng Yên 22-23)** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  và  $f(4) = 2023, \int_0^4 f(x) dx = 4$ . Tích

phân  $\int_0^2 xf'(2x) dx$  bằng

**A.** 2022.

**B.** 2021.

**C.** 2019.

**D.** 4044.

**Lời giải**

**Chọn A**

Ta có

$$\begin{aligned} \int_0^2 xf'(2x) dx &= \frac{1}{4} \int_0^4 tf'(t) dt = \frac{1}{4} \int_0^4 xf'(x) dx = \frac{1}{4} \left[ xf(x) \Big|_0^4 - \int_0^4 f(x) dx \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[ 4 \cdot f(4) - \int_0^4 f(x) dx \right] = \frac{1}{4} [4 \cdot 2023 - 4] = 2022. \end{aligned}$$

**Câu 173. (Sở Hải Phòng - 2023)** Biết  $\int_2^5 (2x+1) \ln(x^2-1) dx = a \ln 3 + b \ln 2 - c$  với  $a, b, c$  là các số nguyên.

Khi đó  $a^2 + 2b - c^2$  bằng

**A.** 8.

**B.** 19.

**C.** 6.

**D.** 5.

**Lời giải**

**Chọn B**

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = \ln(x^2 - 1) \Rightarrow du = \frac{2x}{x^2 - 1} dx \\ dv = (2x + 1) dx \Rightarrow v = x^2 + x \end{cases}$$

$$\text{Khi đó } \int_2^5 (2x+1) \ln(x^2-1) dx = (x^2+x) \ln(x^2-1) \Big|_2^5 - \int_2^5 (x^2+x) \frac{2x}{x^2-1} dx$$

$$= 30 \ln 24 - 6 \ln 3 - 2 \int_2^5 \frac{x^2}{x-1} dx = 90 \ln 2 + 24 \ln 3 - 2 \int_2^5 \left( x+1 + \frac{1}{x-1} \right) dx$$

$$= 90 \ln 2 + 24 \ln 3 - 27 - 4 \ln 2 = 24 \ln 3 + 86 \ln 2 - 27 \Rightarrow a = 24, b = 86, c = 27 \Rightarrow a^2 + 2b - c^2 = 19.$$

**Câu 174. (SGD Bình Thuận - 2023)** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên khoảng  $(0; +\infty)$ . Biết  $e^x$  là một

nguyên hàm của hàm số  $f'(x) \ln x$  liên tục trên khoảng  $(0; +\infty)$  và  $f(2) = \frac{1}{\ln 2}$ . Giá trị của  $\int_1^2 \frac{f(x)}{x} dx$  bằng

**A.**  $1 + e^2 + e$ .

**B.**  $1 - e^2 - e$ .

**C.**  $1 + e^2 - e$ .

**D.**  $1 - e^2 + e$

**Lời giải**

**Chọn D**

$$\text{Đặt: } \begin{cases} u = f(x) \\ dv = \frac{1}{x} dx \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} du = f'(x) dx \\ v = \ln x \end{cases}$$

Ta có:

$$\int_1^2 \frac{f(x)}{x} dx = f(x) \ln x \Big|_1^2 - \int_1^2 f'(x) \ln x dx = f(2) \ln 2 - e^x \Big|_1^2 = \frac{1}{\ln 2} \cdot \ln 2 - (e^2 - e) = 1 - e^2 + e.$$

**Câu 175. (Sở Bà Rịa-Vũng Tàu-Năm 2023)** Cho  $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{x \sin x dx}{2 \cos^3 x} = a\pi + b\sqrt{3}$  với  $a, b$  là các số hữu tỷ. Giá trị

của  $a + b$  bằng

**Trang 68**

**A.**  $\frac{1}{12}$ .

**B.**  $\frac{7}{12}$ .

**C.**  $\frac{5}{6}$ .

**D.**  $-\frac{1}{6}$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

Ta có  $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{x \sin x}{2 \cos^3 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{x \tan x}{2 \cos^2 x} dx$ . Đặt  $\begin{cases} u = \frac{x}{2} \\ dv = \frac{\tan x}{\cos^2 x} dx = \tan x d(\tan x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{1}{2} dx \\ v = \frac{\tan^2 x}{2} \end{cases}$ .

Suy ra

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{x \tan x}{2 \cos^2 x} dx &= \frac{x}{4} \cdot \tan^2 x \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} - \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan^2 x dx \\ &= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left( \frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right) dx \\ &= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4} \left( \tan x - x \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4}. \end{aligned}$$

Do đó  $a = \frac{1}{3}$  và  $b = -\frac{1}{4}$ . Vậy giá trị của  $a + b = \frac{1}{12}$ .

**Câu 176. (Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - 2023)** Biết  $\int_0^1 (2x+3)e^x dx = a.e + b$  với  $a, b$  là các số nguyên.

Khẳng định nào sau đây đúng?

**A.**  $a + b = -1$ .

**B.**  $ab = 2$ .

**C.**  $2a + b = 5$ .

**D.**  $a - b = -1$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Xét tích phân  $\int_0^1 (2x+3)e^x dx = a.e + b$ ; đặt  $\begin{cases} u = 2x+3 \\ dv = e^x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = 2dx \\ v = e^x \end{cases}$ . Khi đó:

$$\int_0^1 (2x+3)e^x dx = (2x+3)e^x \Big|_0^1 - \int_0^1 2e^x dx = 5e - 3 - 2e^x \Big|_0^1 = 3e - 1.$$

Do đó  $a = 3$ ,  $b = -1$  nên  $2a + b = 5$ .

