

Họ tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 104

PHẦN I. (4,5 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18.

Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. Đúng mỗi câu được 0,25đ

Câu 1: Nhận định nào sau đây **đúng** về tRNA?

- A. Có đầu 5' liên kết với amino acid.
- B. Thành phần chính cấu trúc nên ribosome.
- C. Chỉ có cấu trúc mạch đơn.
- D. Mang bộ ba đôi mã khớp với bộ ba mã hoá (codon) trên mARN.

Câu 2: Cấp độ tổ chức sống cơ bản nhất cấu tạo nên các cơ thể sinh vật là

- A. cơ thể
- B. tế bào
- C. phân tử
- D. nguyên tử

Câu 3: Ý nào **không đúng** khi nói về vai trò của phân tử nước?

- A. Là môi trường của các phản ứng sinh hóa.
- B. Cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống.
- C. Là dung môi hòa tan nhiều chất cần thiết.
- D. Là thành phần cấu tạo nên tế bào.

Câu 4: Có một phân tử DNA có khối lượng bằng $75 \cdot 10^4$ đơn vị cacbon và tỉ lệ $\frac{A}{G} = \frac{3}{2}$ tự nhân đôi 3 lần.

Số lượng từng loại nucleotide môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi nói trên là

- A. G = C = 4000; A = T = 6000.
- B. G = C = 3500; A = T = 5250.
- C. G = C = 1500; A = T = 2250.
- D. G = C = 3250; A = T = 5500.

Câu 5: Nước chiếm bao nhiêu phần trăm khối lượng cơ thể con người

- A. 70%
- B. 60%
- C. 80%
- D. 50%

Câu 6: Thành phần cấu trúc của một nucleotide trong phân tử DNA là

- A. đường ribose; phosphate, nitrogenous base.
- B. adenine, uracil, guanine, cytosine.
- C. đường deoxyribose; phosphate, nitrogenous base.
- D. adenine, thymine, guanine, cytosine.

Câu 7: DNA là phân tử sinh học nằm trong cấu trúc nào của tế bào?

- A. Lưới nội chất
- B. Màng tế bào
- C. Bộ máy gônggi
- D. Nhân tế bào

Câu 8: Đường đôi Maltose được cấu tạo từ 2 phân tử đường đơn là

- A. Glucose + Galactose.
- B. Glucose + Fructose.
- C. Fructose + Fructose.
- D. Glucose + Glucose.

Câu 9: Loại đường là thành phần chính cấu tạo nên thành tế bào thực vật là

- A. glycogen
- B. tinh bột
- C. chitin
- D. cellulose

Câu 10: Một trong những nguyên tắc được thực hiện trong quá trình nhân đôi DNA là

- A. Bán bảo toàn
- B. Bổ sung A-G; T-C
- C. Bảo toàn
- D. Tổng hợp chiều 3' → 5'

Câu 11: Sơ đồ dưới đây thể hiện mã di truyền.

		Second Base							
		U	C	A	G	U	C	A	G
First Base	U	UUU Phe UUC UUA UUG Leu	UCU Ser UCC UCA UCG	UAU Tyr UAC UAA STOP UAG	UGU Cys UGC UGA — STOP UGG Trp	U	C	A	G
	C	CUU Leu CUC CUA CUG	CCU Pro CCC CCA CCG	CAU His CAC CAA Gln CAG	CGU Arg CGC CGA CGG	U	C	A	G
	A	AUU Ile AUC AUA AUG Met or Start	ACU Thr ACC ACA ACG	AAU Asn AAC AAA Lys AAG	AGU Ser AGC AGA Arg AGG	U	C	A	G
	G	GUU Val GUC GUA GUG	GCU Ala GCC GCA GCG	GAU Asp GAC GAA Glu GAG	GGU Gly GGC GGA GGG	U	C	A	G

Nhận định nào sau đây là đúng về đặc điểm của mã di truyền?

- A. Codon AUG không mã hóa amino acid.
- B. Mỗi codon có thể mã hóa cho nhiều amino acid.
- C. Sợi mRNA mã hóa protein sẽ luôn chứa các codon không mã hóa amino acid.
- D. Các codon gồm nhiều base khác nhau có thể mã hóa cho cùng một amino acid.

Câu 12: Nguyên tố có vai trò đặc biệt quan trọng trong tế bào, tạo nên sự đa dạng của các hợp chất hữu cơ là

- A. Carbon
- B. Oxygen
- C. Nitrogen
- D. Hydrogen

Câu 13: Nguyên tố vi lượng trong cơ thể sống không có đặc điểm nào sau đây?

- A. Là những nguyên tố có trong tự nhiên
- B. Chiếm tỉ lệ nhỏ hơn 0,01% khối lượng chất sống của cơ thể
- C. Tham gia vào cấu trúc bắt buộc của hệ enzyme trong tế bào
- D. Chỉ cần cho thực vật ở giai đoạn sinh trưởng

Câu 14: Sản phẩm có thể có của quá trình phiên mã DNA là gì?

- A. Chỉ có mRNA.
- B. mRNA và tRNA.
- C. mRNA, tRNA và rRNA.
- D. mRNA và rRNA.

Câu 15: Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố đa lượng?

- A. N
- B. Zn
- C. Fe
- D. Cu

Câu 16: Nội dung nào sau đây **không đúng** khi nói về học thuyết tế bào?

- A. Mọi tế bào đều có cấu trúc gồm màng sinh chất, tế bào chất và nhân
- B. Tế bào là đơn vị nhỏ nhất cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật
- C. Tế bào được sinh ra từ sự phân chia các tế bào có trước
- D. Tất cả các sinh vật đều được cấu tạo từ một hoặc nhiều tế bào

Câu 17: Quá trình nhân đôi DNA không có thành phần nào sau đây tham gia?

- A. Các nucleotide tự do
- B. DNA polimerase
- C. Amino acid
- D. Enzyme ligase

Câu 18: Liên kết được hình thành giữa nguyên tử hydrogen của phân tử nước này với nguyên tử oxygen của phân tử nước bên cạnh là

- A. liên kết hydrogen
- B. liên kết cộng hoá trị
- C. liên kết peptide
- D. liên kết phosphodiester

PHẦN II. (4,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. Trong một câu: đúng 1 ý được 0,1đ; đúng 2 ý được 0,25đ; đúng 3 ý được 0,5đ; đúng 4 ý được 1,0đ

Câu 1: Một gene có 1500 cặp nucleotide và số nucleotide loại G chiếm 20% tổng số nucleotide của gen. Mạch 1 của gene có 300 nucleotide loại T và số nucleotide loại C chiếm 25% tổng số nucleotide của mạch.

a) Mạch 2 của gene có $\frac{A}{G} = \frac{4}{5}$

b) Mạch 2 của gene có $\frac{A+C}{T+G} = \frac{7}{13}$

c) Mạch 1 của gene có $\frac{T+C}{A+G} = \frac{11}{9}$

d) Mạch 1 của gene có $\frac{A}{G} = \frac{8}{3}$

Câu 2: Khi nói về quá trình nhân đôi DNA, các kết luận dưới đây là đúng hay sai?

a) Trên mỗi phân tử DNA của sinh vật nhân sơ chỉ có một điểm khởi đầu nhân đôi DNA.

b) Sự nhân đôi của DNA ti thể diễn ra độc lập với sự nhân đôi của DNA trong nhân tế bào.

c) Enzyme DNA-polimerase làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử DNA và kéo dài mạch mới.

d) Tính theo chiều tháo xoắn, ở mạch khuôn có chiều 3' - 5' thì mạch mới được tổng hợp gián đoạn.

Câu 3: Từ 3 phân tử DNA được đánh dấu N¹⁵ ở cả 2 mạch đơn tiến hành quá trình nhân đôi trong môi trường chỉ có N¹⁴, tổng hợp được 96 phân tử DNA mạch kép. Các nhận định sau đây là đúng hay sai?


a) Có 3 phân tử DNA con có chứa N¹⁵.

b) Có tất cả 186 mạch đơn chứa N¹⁴.

c) Có tất cả 96 phân tử DNA chứa N¹⁴.

d) Có 6 phân tử DNA chứa cả N¹⁴ và N¹⁵.

Câu 4: Dưới đây là sơ đồ khái quát cấu trúc một gene ở sinh vật nhân sơ (a) và sinh vật nhân thực (b). Các nhận định sau đây là đúng hay sai?



a) Gene phân mảnh là gene có vùng mã hóa gồm các trình tự được dịch mã (exon) xen kẽ các đoạn không được dịch mã (intron).

b) Dựa vào cấu trúc vùng mã hóa, các gene được chia thành gene không phân mảnh và gene phân mảnh.

c) Một gene có cấu trúc gồm vùng điều hòa, vùng mã hóa và vùng kết thúc.

d) Gene phân mảnh có ở sinh vật nhân sơ và một số ít vi sinh vật cổ.

PHẦN III. (1,5 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Đúng 1 câu được 0,5đ

Câu 1: Một gene dài 425nm và có tổng số nucleotide loại A và nucleotide loại T chiếm 40% tổng số nucleotide của gene. Mạch 1 của gene có 220 nucleotide loại T và số nucleotide loại C chiếm 20% tổng số nucleotide của mạch. Theo lí thuyết, mạch 2 của gene có tổng số nucleotide loại C chiếm bao nhiêu phần trăm?

Câu 2: Trên một mạch của gene có 150A và 120T. Gene nói trên có 20%G. Số nucleotide loại C là bao nhiêu?

Câu 3: Có 8 phân tử DNA tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 112 mạch polynucleotide mới lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của mỗi phân tử DNA trên là bao nhiêu?

Câu 4: Một đoạn gene có trình tự nucleotide trên một chuỗi polynucleotide như sau:

3' – ATG - TAC - CGT - AGG - CCC - 5'

Tính số liên kết hydrogen của đoạn gene trên?

Câu 5: Một phân tử DNA có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử DNA này có tỉ lệ $\frac{A+T}{G+C} = \frac{1}{4}$ thì tỉ lệ nucleotide loại A của phân tử DNA này là bao nhiêu phần trăm?

Câu 6: Nếu nuôi cấy một tế bào *E. coli* có một phân tử DNA ở vùng nhân chỉ chứa N¹⁵ phóng xạ chưa nhân đôi trong môi trường chỉ có N¹⁴, quá trình phân chia của vi khuẩn tạo ra 8 tế bào con. Có bao nhiêu phân tử DNA ở vùng nhân của các *E. coli* có chứa N¹⁵ phóng xạ được tạo ra trong quá trình trên?

----- HẾT -----

- *Thí sinh không được sử dụng tài liệu;*
- *Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.*