

Họ và tên học sinh:

Lớp: SBD:

Mã đề thi
122

PHẦN I. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng.

Câu 1. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vector: $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} = k\overrightarrow{DG}$


A. $k=3$.

B. $k=\frac{1}{2}$.

C. $k=\frac{1}{3}$.

D. $k=2$.

Câu 2. Cho đồ thị hàm số



Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-3; 2)$.

B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-3; 3)$.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.

D. Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; 4)$.

Câu 3. Một chất điểm chuyển động theo quy luật $s(t) = -t^3 + 6t^2$ với t là thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động, $s(t)$ là quãng đường đi được trong khoảng thời gian t . Tính thời điểm t tại đó vận tốc đạt giá trị lớn nhất.

A. $\frac{4}{3}$ (s).

B. $\frac{8}{3}$ (s).

C. 0 (s).

D. 2 (s).

Câu 4. Cho hàm số $f(x) = (x+1)^4$. Tính $f''(2)$.

A. 27.

B. 81.

C. 96.

D. 108.

Câu 5. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 2x + 3}{2x + 1}$.

A. $y = 2x + 2$.

B. $y = x + 1$.

C. $y = 2x + 1$.

D. $y = 1 - x$.

Câu 6. Tính đạo hàm của hàm số $f(x) = -x^4 + 4x^3 - 3x^2 + 2x + 1$ tại điểm $x = -1$.

- A. $f'(-1)=14$. B. $f'(-1)=15$. C. $f'(-1)=24$. D. $f'(-1)=4$.

Câu 7. Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t)=t^2$, trong đó $t > 0$, t tính bằng giây và $s(t)$ tính bằng mét. Tính vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t=2$ giây.

- A. 4m/s. B. 5m/s. C. 2m/s. D. 3m/s.

Câu 8. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong $y=x^3$ tại điểm $(-1;-1)$.

- A. $y=3x+2$. B. $y=-1$. C. $y=3x-2$. D. $y=-3x-4$.

Câu 9. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\frac{2x+3}{x+2}$ trên đoạn $[-1;1]$. Tính $M+2m$?

- A. $\frac{17}{3}$. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{8}{3}$. D. $\frac{11}{3}$.

Câu 10. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD và G là trung điểm của MN . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

- A. $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 4\overrightarrow{MG}$ B. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GD}$
C. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = 0$ D. $\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN} = 0$

Câu 11. Một chất điểm chuyển động thẳng xác định bởi phương trình: $S=t^3-3t^2+5t+2$, trong đó t tính bằng giây và S tính bằng mét. Gia tốc của chuyển động khi $t=3$ là:

- A. $14(m/s^2)$. B. $12(m/s^2)$. C. $24(m/s^2)$. D. $17(m/s^2)$.

Câu 12. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2;3]$ có bảng biến thiên như hình vẽ:

x	-2	-1	1	3		
y'		+	0	-		+
y			1		-2	5

Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên

- A. $(-2;1)$. B. $[-2;-1]$. C. $(-1;1)$. D. $(-1;3)$.

PHẦN II. (4,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

$$y=f(x)=ax^4+bx^2+c(a \neq 0)$$

Câu 1. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$				
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$+\infty$		-4		-3		-4		$+\infty$

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

- a) Điểm cực đại của hàm số là $x=1$.
- b) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng -4 .
- c) Hàm số $y=|f(x)|$ có 5 cực trị.
- d) Hàm số $y=f(|x|)$ có 7 cực trị.

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{x+m}{x-1}$ (với m là tham số thực). Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

- a) Với $m=1$ thì $\min_{[2;4]} y = \frac{5}{4}$.
- b) Với $m=1$ thì $\max_{[2;4]} y = 3$.
- c) Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 5 trên đoạn $[2;4]$ khi $m = \frac{3}{4}$.
- d) Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng 5 trên đoạn $[2;4]$ khi $m = 11$.

Câu 3. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:


- a) $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AD'} + \overrightarrow{BB'}$.
- b) $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.
- c) $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{A'A}$.
- d) $\overrightarrow{BD'} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'}$.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x) = 2x^3$ có đồ thị (C) và điểm M thuộc (C) có hoành độ $x_0 = -2$. Khi đó xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- a) Hệ số góc của tiếp tuyến của (C) tại điểm M bằng 24
- b) Phương trình tiếp tuyến của (C) tại M đi qua điểm $A(0;32)$
- c) Phương trình tiếp tuyến của (C) tại M cắt đường thẳng $d: y = 23x$ tại điểm có hoành độ bằng -33
- d) Phương trình tiếp tuyến của (C) tại M vuông góc với đường thẳng $\Delta: y = -\frac{1}{24}x$

PHẦN III. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Câu 1. Có một tấm nhôm hình vuông cạnh $a=36\text{cm}$. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng $x(\text{cm})$ rồi gấp tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp. Tìm x để hình hộp nhận được có thể tích lớn nhất.



Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)$ và $f(x)>0, \forall x\in\mathbb{R}$. Biết hàm số $y=f'(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ và $f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{137}{16}$.

x	$-\infty$	-1	$\frac{1}{2}$	1	$+\infty$		
$f''(x)$		$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$f'(x)$							

Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m\in[-2024;2024]$ để hàm số $g(x)=e^{-x^2+4mx-5}\cdot f(x)$ đồng biến trên $\left(-1;\frac{1}{2}\right)$

Câu 3. Một chất điểm chịu tác động bởi 3 lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ có chung điểm đặt A và có giá vuông góc nhau từng đôi một. Biết cường độ của các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ lần lượt là $11\text{ N}, 9\text{ N}$ và 5 N . Tính cường độ của hợp lực tác động lên chất điểm. (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

$$f(x)=\begin{cases} \frac{\sqrt{4x^2+1}-1}{x} & \text{khi } x\neq 0 \\ 0 & \text{khi } x=0 \end{cases}$$
 Tính $f'(0)$.

Câu 4. Cho hàm số

Câu 5. Cho hàm số $f(x) = \frac{\cos x}{\sqrt{\cos 2x}}$. Số nghiệm của phương trình lượng giác $f'(x) = 0$ trên $(0; 2\pi)$ là bao nhiêu?

Câu 6. Cho hàm số $P(x) = ax^2 + bx + 3$ (a, b là hằng số). biết $P(1) = 3$ và $P''(1) = -2$. Tìm $a + 2b$

----- HẾT -----